

## Splenic Sequestration and Rbc Survival Time using $^{51}\text{Cr}$ labeled Rbc in Liver Cirrhosis.

C.S. Kee, D.C. Kim, Y.H. Park

Dept. of Int. Med., Catholic Medical College

각종 혈액 질환의 병태생리가 최근에 와서 여러가지 방사성 동위원소의 의학적 이용으로 규명되고 있어, 각종 질환에 수반되어 나타나는 빈혈의 원인도 차츰 규명되어가고 있다.

간질환 특히 간경변증에 빈혈이 등반되는 것은 오래 전부터 알려져 있으나 그 발생기전에 관하여는 어떤 가지의 원인만으로는 설명이 되지 않고 최근에 이르러 오랜 영양부족에 수반되는 염산이나 비타민 B<sub>12</sub> 등의 결핍, 적혈구 자체의 수명단축, 비장 기능항전에 의한 적혈구의 파괴증가 및 식도 정맥유의 파열 등에 의한 실혈 등으로 설명하고 있으나 아직도 불명한점이 많다.

저자들은 이러한 간경변증의 빈혈의 병태 및 발생기전을 좀더 체계적으로 규명하기 위하여  $^{51}\text{Cr}$ 을 이용하여 적혈구의 파괴과정, 적혈구의 수명, 적혈구량을 측정 관찰하여 약간의 지식을 얻었으므로 이에 보고 한다.

## 26. $^{113}\text{In}$ DTPA 를 사용한 正常人 Renogram 에 關한 研究

延世醫大 放射線科

徐廷鎬 · 崔培奎

### Normal Renogram using $^{113}\text{In}$ DTPA

C.H. Suh, Y.K. Cho

Dept. of Radiology, Yonsei University,  
College of Medicine

腎機能을 簡便하고 容易하게 檢查할 수 있는 方法으로 Renogram이 널리 利用되고 있다. 이에 使用되는 放射性同位元素는  $I^{131}$  Hippuran이 主로 利用되고 있으며 이는 大部分 腎細尿管으로 早速히 排泄되는 機能을 利用하여 腎機能을 簡單하게 測定 評價하고 있다. 또한  $I^{131}$  Diiodrast도 Renogram에 利用되나 이는 肝臟에 多少 蓄積되어 右腎에 적지 않은 影響을 미칠 뿐 더러 副作用도 있으므로 잘 利用되지 않고 있다.

最近 短半減期의 放射性同位元素로서 Generator System에 依하여 얻어지는 核種이 많이 開發되어 臨床에 利用하게 되었으며 그中 Indium $^{113m}$ 을 利用한 製劑는

各種 臟器의 走査用으로 簡便한 方法으로 調製하여 利用하여 多量을 投與하여 좋은 解像能을 얻고 被曝放射線量도 적으며 母核種인  $\text{Sn}^{113}$ 은 長半減期임으로 매우 經濟的이라는 點等으로 널리 普及되고 있다. Indium의 製劑中  $\text{In}^{113m}$  DTPA Chelate Complex는 腎臟의 腎絲膜體에서 主로 濾過 排泄됨으로 이를 利用하여 腎臟의 機能을 檢查할 수 있으리라고 보며 Hosain, Wagner는 動物實驗 및 臨床例를 通하여  $\text{In}^{113m}$  DTPA가  $I^{131}$  Hippuran과 怡似한 Renogram Pattern을 나타냄을 보았고  $\text{C}^{14}$  Inulin과 같이 主로 腎絲膜體에서 濾過 排泄되는 것을 立證하였다. 또한 Martinez-Villasenor와 Bush는  $I^{113m}$  DTPA가 Sod Iothalamate와 같이 腎絲膜體에서 濾過됨으로 G.F.R. 測定에도 利用될 수 있다고 하였다.

演者는 이들의 結果를 土台로 하여 Sn-In generator로부터 얻는  $I^{113m}$  DTPA를 正常人에 投與하여 Renogram을 施行하고 다음과 같은 成績을 얻었기에 報告하는 바이다.

$\text{In}^{113m}$  DPTA 投與한 正常人의 Renogram의 成績은 3 Component로 나누어 졌으며 이는  $I^{131}$  Hippuran을 使用하였을 때와 同一한 結果를 나타내나 다만 3rd segment에서 大部分의 境遇 緩慢한 曲線을 觀察 할 수 있었다. 이 segment의 變化는 腎絲膜體에서의 濾過가 遲延됨을 意味하며 이는  $I^{113m}$  DTPA가 Hippuran의 腎細尿管에서의 分泌보다 늦다는 것을 意味하는 것으로 解釋된다.

## 27. Scintillation Camera를 이용한

### 腎機能 檢查

서울의대 内과

김원동 · 노홍규 · 고창순 · 이문호

### Renal Function Test with Scintillation Camera

W.D. Kim, H.K. Noh, C.S. Koh, M.H. Lee

Dept. of Int. Med., College of Medicine, SNU

放射性 同位元素를 이용한 腎臟의 機能 및 形態에 관한 檢查는  $^{203}\text{Hg}$ -neohydrin을 이용한 Scintigraphy와  $^{131}\text{I}$ -Hippuran을 이용한 Renography로써 좋은 成績을 보여 주고 있음은 주지의 사실이다. 그러나, 實驗적으로 同一患者에게 이 兩者를 施行하기에는 長期間을 요함이며, 경제성도 문제점이 있다. Scinticamera를 이용한 연속적  $^{131}\text{I}$ -Hippuran Scintigraphy는 이 兩者를 동시에 만족시켜주는 장점이 있다.