

내원한 신장결석증이 의심되는 환자중 21명을 대상으로 renogram을 수술전후 및 시간 간격으로 시행하고 동시에 생화학적 검사, X선단순복부 활영상 및 신우조영법 소견상을 비교 검토하여 보고하는 바입니다.

#### 결과

1. Renogram 상에서의 이상상태는 수술후 약 1주부터 호전되기 시작하여 평균 약 1개월부터는 정상상태로 돌아오는 경향이었다.

2. 생화학적 검사소견이 거의 정상이었으며 renogram상의 신우기능과는 거의 관계가 없는 것으로 사료되며 1, 2례에서는 생화학적 검사소견이 비정상적으로 나타났으나 이런경우 발병된 시기부터 수술시까지 기간이 장시일에 걸쳐 치료되지 않았던 예였다.

3. 단순복부활영상에서 쉽게 결석의 위치 및 크기를 알 수 있으므로 신우조영술은 특별한 예를 제외하고는 필요로 하지 않는 것으로 생각된다.

4. 신결석의 진단은 시술이 간단한 renogram 및 단순복부활영술만으로 가능하다고 생각된다.

## 16. 急性腎不全에서의 Renogram

### Renogram in Acute Renal Failure

서울醫大 内科

趙善衍 · 金源東 · 李正相

高昌舜 · 李文鎮

演者들은 1971年 3月부터 1972年 4月까지 서울大學病院에 입원하여 腎生檢上 急性腎不全으로 確診된 12例에서 多尿期에 renogram을 연속적으로 실시하여 다음과 같은結果를 얻었기에 보고하는 바이다.

1) 多尿期 첫 10日동안의 renogram은 obstructive pattern을 보이는例와 정상 renogram으로 돌아오는 모양을 보이는例가 있었다.

2) Renogram 上 obstructive pattern인 오래 지속된例에서 그 臨床的 經過가 길고 예후가 불량했다.

3) 非貧尿性 急性腎不全(non-oliguric renal failure)의 2例에서는 renogram이 尿路閉鎖없는 obstructive pattern을 보였으며, 이는 急性腎不全으로 診斷하는데 決定的으로 도움이 되었다.

이상의 結果로서 renogram은 急性腎不全의 臨床的 經過 및 예후를 決定하는데 도움이 되며 특히 非貧尿性 急性腎不全의 早期診斷에 決定的인 도움이 될 것으로 고려된다.

## 17. 慢性腎不全에서의 Plasma Renin Activity 및 血力動學의 變化에 關한 研究

### Plasma Renin Activity & Hemodynamics in the Chronic Renal Failure

서울醫大 内科

金孝順 · 崔麗守 · 李正相 · 金道鎮

慢性腎不全에서의 血力動學의 變化 및 plasma renin activity에 關하여 많은 研究가 있으나 이에 대한 正確하고 實質的相關關係가 밝혀져 있지 않아, 이를 추구하기 위해 演者들은 1972年 6月부터 11月까지 서울大學病院 内科에 入院한 慢性腎不全患者에서 plasma renin activity, blood volume, cardiac output, peripheral vascular resistance, renal plasma flow 및 常用腎機能검사를 實施하였다.

Plasma renin activity는 J.N. Cchen et al의 bioassay法을 使用하였으며, renal plasma flow 및 cardiac output 및 plasma volume은 Razzak's氏法의 radioisotope를 利用한 方法으로 測定하여 다음과 같은 몇 가지 성적을 얻었기에 報告하는 바이다.

1. 正常對照群의 plasma renin activity는  $6.3 \pm 2.4$  ng/ml이었으며, plasma volume/kg  $49.5 \pm 2.4$  ml, cardiac output  $5,857 \pm 685$  ml/min, renal plasma flow  $582 \pm 60$  ml/min이었다.

2. 慢性腎不全患者 10例에서의 plasma renin activity는 正常對照群과 有義한 差가 없었으나 cardiac output은 上昇, total peripheral resistance은 増加하였으며, plasma volume은 增加하는 경향을 보였으나 腎血流量은 正常對照群에 比해 현저히 감소되었다.

## 18. 放射性膠質性金(Au<sup>198</sup>)을 利用한 骨盤淋巴腺 走査検査法

### Plasental Lymphnode Scanning with <sup>198</sup>Au-colloid

대구동산기독병원 방사선과

최송자 · 서철성

산부인과

서영옥

骨盤臟器 特히 子宮頸部癌 治療에 있어서 骨盤淋巴腺의 轉移 有無는 治療方針의 決定에 있어서 重大한 役割을 한다. 따라서 骨盤淋巴腺의 癌組織에 依한 侵