

지 않았던 판막환자 및 판막이식 수술후 환자에서는 尿中 ferritin 値가 247 ng/ml(77~383 ng/ml)로 증가하였고, 血清 ferritin 値의 84%(27.1~150%)로 증가하였다.

以上에서 정상인에 비해 임파선종환자, 혈액질환환자, 용혈성빈혈환자에서 尿中 ferritin 値가 증가함을 알 수 있겠고 血清 ferritin 値에 대한 尿中 ferritin 値는 용혈성 빈혈의 진단에 대한 예민한 방법이라 할 수 있다.

44. 妊婦 및 脇帶血清中 Human Chorionic Gonadotropin 動態에 關한 研究

國軍서울地區病院

姜淳範·洪基碩

Bruner(1951)가 生物學的 方法에 의하여 妊娠末期에서 胎兒의 級毛性 性腺刺戦 호르몬(Human Chorionic Gonadotropin)의 血清中 濃度가 妊婦의 경우보다 월씬 낮다는 報告를 하였다. 그後 gel filtration, 放射免疫測定法에 依하여 점차 낮은 血中濃度까지 测定이 가능하게 되었으나, HCG 구조상 類似한 腦下垂體性黃體形成호르몬(Human Luteinizing Hormone)과의 交叉反應 問문에 낮은 濃度의 血中濃度를 测定하는데는 難點이 많아, 그後 HCG 베타 亞單位 特異 放射免疫測定法의 開發로 보다 낮은 濃度의 純粹한 HCG를 测定할 수 있게 되었다.

胎兒와 妊婦間의 HCG 血中濃度의 차이는 그 合成場所인 胎盤의 syncytiotrophoblast에서 胎兒로 遷搬되는 過程에 있는 遮斷路(Barrier) 때문에 생각되며 胎盤의 syncytiotrophoblast는 妊婦血清과 직접連結되어 있어서 胎兒의 境遇보다 높을 것으로 기대된다. 비록 아주 微量의 HCG 가 胎兒의 循環에 들어가지만 分明히 胎兒가 HCG 分泌에 영향을 주는 것으로 보여진다.

演者들은 妊娠 第 38週에서 第 42週사이에 있는 41名의 妊婦와 여기에서 出生한 21名의 男兒와 20名의 女兒의 脇帶血清內 HCG 를 β -特異 放射免疫測定法을 利用하여 각各 测定하여 본 結果, 正常 男兒 分娩妊娠의 平均 血中濃度가 正常 女兒 分娩妊娠의 경우보다 낮은 數值를 보였으나, 男兒 및 女兒의 脇帶血中內 濃度의 差異는 다만 약간의 統系의 意義를 나타내었다. 한편 妊婦의 血清 HCG 値와 胎盤의 重量 및 胎兒의 體重間에는 有意한 相關關係를 보였으나 脇帶血清內

HCG 値와 사이에서는 有意한 相關關係를 發見할 수 없었다.

45. 脇帶血中內 Prolactin 値의 動態에 關한 研究

國軍서울地區病院

姜淳範·洪基碩

Prolactin의 分泌動態 및 그 生理的·病的意義에 關하여는 그 研究가 最近 10여년 사이에 많은 進展을 보여왔다. 그 중에서도 특히 pituitary tumor 와의 關聯性, 乳汁分泌開始와 그 維持에 關한 研究는 비교적 많이 알려져 있다. 그 이외에도 渗透壓調節과 成長促進等에 대한 廣範位한 作用에 對한 研究가 계속 發表되고 있다.

妊娠中 prolactin 은 妊娠進行에 따라 漸增하고 妊娠末期에서 最高에 達하며 產褥乳汁旺盛時期에서는 오히려 低下된다고 알려져 있다. 또한 胎兒血中內에서는 妊娠 第13週頃부터 證明되며 그후 점차 증가하여 滿期分婉時 最高에 이른다고 한다.

演者들은 妊娠 第18週부터 第43週까지의 產母 65名으로부터 分娩時 脇帶血을 각各 採取하여 血中內 prolactin 値를 放射免疫測定法을 利用하여 그 動態를 觀察하여 본 結果, 妊娠 第30週까지는 150 ng/ml를 넘지 못하나 妊娠 第36週以後에는 적어도 170 ng/ml以上 400 ng/ml 以內의 分布를 나타내었다. 한편 prolactin과 胎兒의 體重間에는 有意한 相關關係를 보이며, 또한 胎盤의 重量間에도 역시 統系의 有意性을 찾을 수 있었다.

Prolactin이 胎兒의 肺成熟에 關與한다는 報告들에 따르면 未熟分娩時 一定水準의 prolactin 値以上에서는 特發性 呼吸障礙症候群의 發生이 족다는 흥미있는 報告가 있는데 演者들의 경우에 몇몇에서 그러한 境遇를 볼 수 있었기에 이에 報告를 하는 바이다.

46. 胸腔滲出液內 CEA 测定의 診斷的 意義

서울醫大 內科

張然復·柳明姬·尹輝重
高昌舜·韓鏞微·李文鎬

胸腔滲出液의 原因診斷을 위해 이용되어 오던 胸膜組織檢查, 細胞學的檢查는 銳敏度, 取扱度가 낮아 良性, 惡性의 病變 진단에 도움이 되지 않는 경우가 많았