

## 24시간 혈압변동양상에 대한 고려홍삼의 효과

한기훈 · 김효수 · 손대원 · 오병희 · 이명복

박영배 · 최윤식 · 서정돈 · 이영우

서울대학교 의과대학 내과학교실

목 적 : 고혈압의 조절에 이상적인 약제는 그 효능과 함께 안정성과 유순도가 높은 약제라고 할수 있다. 본 연구는 고려 홍삼의 혈압강하효과 여부 및 그 안정성 및 순응도를 검증하기 위한것이다.

방 법 : 대상자는 총 34명으로서(M : F=17 : 17 mean age :  $58.8 \pm 8.8$ 세) 중등도 이하의 고혈압 환자 26명 및 백의고혈압 환자 8명으로 하였으며, 모든 기준의 약제를 최소한 4주 중단한 후 위약 1개월, 홍삼 2개월(1.5gram t.i.d.) 투여를 double-blind study로 시행하였다. 연구기간중 매 4주마다 외래측정혈압을 구하였고, 연구시작시점, 위약 투여후 및 홍삼 2개월 투여후에 24시간 혈압감시기(TM2421 A & D company)를 이용한 24시간 혈압측정을 실시하여 고려홍삼의 혈압 강하효과를 분석하였다. 이와 같이 주관적인 부작용을 4주마다 문진하였고 혈액검사를 연구 전후로 실시하여 약제의 부작용을 4주마다 문진하였고 혈액검사를 연구 전후로 실시하여 약제의 부작용여부를 분석하였다.

방 법 : 1) 총 대상자(n=34) 및 고혈압군(n=26)에서 위약 투여시에 비하여 홍삼의 투여후 수축기혈압의 유의한 하강이 관찰되었다( $146.1 \pm 14.1$  vs.  $140.1 \pm 12.2$ mmHg,  $p=0.015$ ).

2) 총 대상자 및 고혈압군에서 홍삼의 투여후 위약투여시에 비하여 이완기혈압이 하강하는 경향이 관찰되었다( $88.4 \pm 8.8$  vs.  $85.0 \pm 8.1$ mmHg,  $p=0.089$ ).

3) 총 대상자에서 홍삼의 투여로 맥박수의 유의한 하강이 관찰되었다( $72.1 \pm 6.4$  vs.  $67.1 \pm 7.4$ 회/분,  $p=0.048$ ).

4) 총 대상자 및 고혈압군에서 홍삼의 투여로 pressure load의 감소가 관찰되었다.

5) 이러한 소견(1)-(4))들은 혈압이 높은 주간에 집중하여 관찰되었다.

6) 홍삼의 유순도는 연구 3개월간 95.6%였으며, 상복부 불쾌감, 변비등의 불편감을 호소한 2명의 주관적증상의 발현이 관찰되었다.

결 론 : 고려홍삼은 높은 안정성과 순응도를 나타내며, 경도의 고혈압 환자에서 혈압강하효과를 기대할 수 있는 보조적 치료로서 가치가 있을 것으로 사료된다.