

꽃왕거미속(*Araniella*)의 1미기록종

김 주 펠

(동국대학교 응용생물학과, 한국거미연구소)

체장은 암컷이 6mm내외이고 수컷이 4mm내외인 소형 왕거미로 복부 등면에 3-4쌍의 검은 점이 있는 것을 특징으로 하여 과거에는 3쌍의 것을 *Araniella displicata*로 명명하였고 4쌍의 것을 *Araniella cucurbitina*로 명명하여 분류 同定하여 왔었다. 그러나 변이가 많아 이 2종의 구별이 확실치 못하여 歐美 등지에서도 다른 종으로 취급하거나 여러 亞種으로 나누거나 또는 통합하여 1종으로 취급하여 種 同定에 問題點이 많았다. 또한 일본의 Yaginuma(1986)는 自國產을 歐美종과 전혀 다른 종으로 취급하여 *Araniella displicata*와 *Araniella cucurbitino*를 동일종으로 통합하여 *Araniella* sp(A)로 하고 또 다른 한종을 *Araniella* sp(B)로하여 신종 후보로 예정하였다가 최근 Tanikawa(1995)에 의하여 복부등면에 4쌍의 검은 점이 있는 것을 *Araniella yaginumai* Tanikawa로 新種으로 記載 발표하였고 3쌍의 검은점이 있는 것을 *Araniella displicata*(Hentz, 1847)로 정정 발표하였다. 한국에서는 Paik, Namkung 그리고 Kim 등에 의하여 2종으로 분류되어 오다가 Namkung(1988)에 의하여 다시 통합하여 *Araniella* sp(A)로 정리해 왔다. 그러나 필자가 다시 자세히 관찰 조사 해본 결과 일본의 Tanikawa의 同定이 옳다고 생각되었기에 다시 재정리하여 記載보고 하는 바이다.