

전위된 견갑골 관절내 골절의 관혈적 정복 및 내고정술

Open Reduction and Internal Fixation of Displaced Intra-Articular Fractures of the Glenoid

김승기 김호태

가톨릭대학부속 의정부 성모병원 정형외과

견갑골의 골절은 비교적 흔치 않으며 보존적 방법으로 만족스럽게 치료되고 있다. 하지만 견갑골 골절시 동반되는 여러 손상으로 인하여 진단과 치료가 늦어져 회복 후에도 기능적인 측면에 영향을 미치게 된다. 인체의 여러 부위에 관절내 골절이 발생되며 전위된 골절일 경우 관혈적 정복과 내고정술이 필수적인데 대해서는 이견이 없으나 견갑골의 관절내 골절시 어떤 골절이 수술 대상이며 수술시 어떻게 접근해야 하는지는 명확한 방침이 없다. 저자들은 1993년 3월부터 1997년 2월까지 총 11례의 전위된 견갑골의 관절내 골절에 대하여 관혈적 정복 및 내고정술을 시행하고 이를 추적 조사하여 문헌고찰과 함께 보고하고자 한다. 대상은 남자 10명, 여자 1명이었으며 Idelberg의 분류상 Ia가 3례, II가 3례, III가 1례, IV가 1례, Va가 1례, Vc가 1례였다.