

P-22 치주 영역에서의 교정치료 증례

강병화* 김정혜 손성희

삼성의료원 치과 진료부 치주과

치아나 치주조직의 상실은 잔존치아를 이동시키고 부정교합을 야기 하게 되며 이러한 치열의 변화는 교합외상 등을 야기하여 잔존 치주조직의 파괴를 더욱 심화 시키게 된다. 또한 상.하악 전치부에 있어서의 이러한 변화는 환자에게 심미적 문제를 야기 하기도 한다.

치주 파괴와 관련된 치아의 병적 이동은 한개 혹은 여러개 치아에서 나타나게 되는데 그 양상은 spacing, rotation, tipping, proclination, posterior bite collapse 등으로 다양하며, 따라서 성인환자에 있어 교정치료는 교합 및 심미적, 치주적 결과의 향상을 위해 반드시 고려 되어져야할 치료의 도구로 그 중요성이 증대 되어가고 있다.

이에 본 임상 증례를 통해 치주 영역에서 행해 질수 있는 교정치료의 예를 정리해 보고자 한다.

증례 1. 심한 치주 파괴를 동반한 상악 전치부의 spacing, proclination, rotation된 증례

증례 2. 치아 동요를 동반한 하악 전치부 crowding 증례

증례 3. 상악 견치의 심미적 수복을 위한 forced eruption and crown lengthening procedure 증례

증례 4. 상실된 제1대구치 미수복으로 근심으로 경사된 하악 제2대구치의 molar uprighting 증례