

A737한국산 납줄개속 *Rhodeus* 어류 4종의 골격형태 비교

김인자^{*} · 김익수
전북대학교 자연과학대학 생물과학부

잉어과 Cyprinidae에 해당되는 한국산의 납자루아과 Acheilognathinae에는 납줄개속 *Rhodeus*, 납자루속 *Acheilognathus*와 큰납지리속 *Acanthorhodeus*으로 나뉜다. 한국산 납자루아과 어류의 계통분류학적 연구의 일환으로 납줄개속 어류의 두골, 척추골, 부속지 골격을 두명골격 표본을 제작하여 비교 논의하였다. 납자루아파는 미신경골과 오훼골공이 없는 공유 형질을 갖는다. 납줄개속은 제4 안하골이 축소되는 파생공유형질을 보인다. 각시붕어 *Rhodeus uyekii*와 흰줄납줄개 *R. ocellatus*는 안상관, 후두감각관과 안하관이 축소되는 공통 점을 갖고 있으며 *R. uyekii*는 전새개 감각관이 퇴화되어 나타나지 않았다. 떡납줄개 *R. notatus*는 주상악의 폭이 좁아 가늘고 전상악도 가늘다. 기저후두골 저작돌기 전연의 형태는 *R. uyekii*와 *R. notatus*에서는 돌기가 뾰족한 형태로 나타났다. 인두치의 형태는 *R. ocellatus* 와 납줄개 *R. sericeus*에서 전돌기가 뾰족하고 후완정이 두껍고 끌이 져있다. 새파수는 *R. uyekii*와 *R. notatus*에서는 5-8개로 적었고 *R. ocellatus*와 *R. sericeus*에서는 11-14개로 많게 나타났다. 등지느러미와 뒷지느러미 분기 기조의 수는 *R. ocellatus*가 11-12와 10-11로 많았다. 등지느러미 제3 불분지 기조는 *R. notatus*에서 극상으로 나타났다. 이러한 골격의 특징에서 *R. uyekii*와 *R. ocellatus*가 또 *R. notatus*와 *R. sericeus*가 더 가까운 것으로 나타났다.

A738*Microphysogobio tungtingensis uchidai*, a Junior Synonym of *Microphysogobio yaluensis* (Mori)

Ik-Soo Kim
Faculty of Biological Science, Chonbuk National University

Microphysogobio tungtingensis uchidai was originally described by Banarescu and Nalbant, 1973 based on 5 specimens from the Nakdong River of Kimhae-gun, Kyongsangnam-do, Korea. At that time *Microphysogobio* sp. *uchida* 1939 was regarded as synonym of the subspecies by Banarescu and Nalbant (1973). Through the investigation on the holotype (USNM 16227) and paratypes (USNM 204099) of *Microphysogobio tungtingensis uchidai* deposited in the National Museum of Natural History, U. S. A., I found that *Microphysogobio tungtingensis uchidai* was a junior synonym of *M. yaluensis* and differed from *Microphysogobio* sp. *uchida* based on the papillae of upper lip, mental pad at median part of lower lip and almost characters of the type specimens. *Microphysogobio* sp. *uchida* was recently described as a distinct species, *Microphysogobio jeoni* by Kim and Yang (1999).