

P-22 심하게 손상된 치열을 가진 환자의 치주보철적, 심미적 회복

김선혜

부산대학교 치과대학 치주학교실

급속 진행형 치주염으로 고통받는 환자들은 기능적, 심미적, 심리적 결함을 야기하는 많은 문제를 갖고 있다. 치아 상실부위, 몇 개 남은 과동요된 치아, 전치의 병적 이동이 종종 객관적인 소견이고, 주관적인 증상은 주로 저작 불편과 심미적 결손이다. 비외과적 치주치료를 완료한 후, 이 두 가지 주된 문제를 해결하기 위해, 치아 소이동과 cross-arch 고정성 보철물을 조심스럽게 고려해 볼 수 있다. 몇 개 남은 과동요된 치아가 가철성 의치에 의한 보철적 회복 가능성을 배제한다. 여기에서는 심하게 손상된 치열을 가진 급속 진행형 치주염 환자에 대해 여러 과에 걸친 기능적(보철적), 심미적(교정적) 처치이후, 5년간의 장기간의 성공적인 유지관리에 대해 보고한다. 지대치 주위 치주조직은 건강하나 감소된 치주조직에 대한 기준을 보여주었다. 최적의 기능시에도 bridge 동요도는 최소였고, 모든 환자는 만족스런 미소를 가지며 심미적 치료에 대해 매우 만족하였다.