

써 제2대구치의 절대적 압하에 의한 결과라는 증거가 불충분하다고 할 수 있다.

이에 본원에서는 정출된 구치를 절대적으로 입하시킬수 있는 molar intrusion arch를 개발하여 임상에 적용하고 있으며 이를 이용하여 상악 제2대구치의 intrusion과 동시에 구개축 경사를 얻고 하악 제2대구치도 적절한 장치를 적용하여 buccal uprighting을 하여 scissors-bite을 성공적으로 치료한 증례가 있어 이를 소개하고자 한다.

T-22
TABLE
CLINIC

I.C.C.(Invisible Canine Corrector)를 이용한 치험증례
이주영 · 유재현 · 장현주 · 이은희,
이주영치과

전치부 총생을 동반한 교정치료시 상악 견치가 순축 혹은 구개축으로 변위된 양상을 종종 관찰하게 된다. 이때 기존의 치료 mechanics는 약한 arch wire를 모든 치아에 연결하든지 아니면 심하게 변위된 치아만 제외하고 나머지 치아들을 우선 배열한 후 이들을 고정원으로 이용해서 변위된 견치를 배열시키는 방법이었다.

이러한 방법들은 인접한 고정원에 많은 부담을 주거나, 견치개선에 많은 시간이 소요되는 것이 종종 관찰되었다. 이에 연자는 구개부에 고정성 레진상을 이용하여 설측치료의 개념으로 변위된 견치를 정상 위치에 먼저 배열해 놓은 후, 그 다음에 전반적인 치아 배열을 도모하는 치료방법을 고안하게 되었다. 이 장치는 치료초기 상악전치부에 교정장치를 부착하지 않고도 견치 위치가 개선되는 심미적인 효과가 있기 때문에 이 새로운 장치를 I.C.C. (Invisible Canine Corrector) 라 부르기로 하였다.

이에 연자는 이 새로운 장치인 I.C.C.의 제작과정과 치료증례를 소개하고자 한다.

T-23
TABLE
CLINIC

설측 장치와 ceramic 장치에 따른 profile 변화에 관한 고찰
유종희
목동 예치파 병원

요즈음 성인들의 교정치료가 증가되면서 설측 장치를 많이 이용하게 된다. 성인에서 치아의 총생이 없고 입이 튀어나온 경우에 주로 4개의 소구치를 발치하여 치료를 하게 되는데, 이런 경우에 설측 장치를 이용한 경우와 보통의 ceramic bracket을 이용하여 치료를 한 경우에 상·하악 전치를 en-masse retraction 했을 경우에 상, 하악 전치의 이동량, 전치의 torque, incisor retraction 양을 비교하여 두가지 치료방법에 있어서 안모 변화의 정도를 알아보자 한다. 설측 장치를 하는 경우에 anchor loss가 적어 retraction이 많이 되는 것으로 알려져 있는데 이를 실제 환자에서 비교해보고자 한다.

T-24
TABLE
CLINIC

과도한 총생을 동반한 부정교합의 설측 교정치료 증례들
최연범
최연범치과

성인환자의 설측교정치료에 대한 요구가 점점 더 높아지는 가운데, 한국인의 경우 총생과 양악 전돌의 대한 수요가 대다수를 차지하고 있다.

심한 총생을 동반한 증례를 설측교정으로 치료한 경우, 처음부터 정확한 위치에 브라켓을 부착하기 어렵다. 따라서 여러 단계에 걸쳐 브라켓을 부착을 해야하기 때문에, 치료의 단계가 복잡해지며, 치료기간이 길어지게 된다. 특히 간접접착의 경우, 브라켓을 치아의 정확한 위치에 부착하기 위해서는 총생이 완전히 해소된 후, 부착을 해야 하며, 과도한 총생의 경우 브라켓 부착용 모형의 제작시 치아 설측면의 정확한 재현이 어렵기 때문에 총생의 해소 후 모형의 재제작이 필요 할 수도 있다. 이런 경우 치료단계가 복잡해지며 치료기간 역시 길어지게 된다. 직접법의 경