

퇴원후 암환자의 질병 간호 요구 (Demands of Illness in People with Cancer)

함미영(중앙대학교), 최경숙(중앙대학교), 은 영(경상대학교),
권인수(경상대학교), 류은정(건국대학교)

[연구목적] 본 연구는 퇴원 후 암환자가 질병에 대해 가지는 가장 흔한 요구들과 거의 원하지 않는 요구들을 확인하여 의료서비스 향상과 정부 차원의 의료비 감소를 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

[연구대상자] 연구대상은 서울소재 2개 대학부속병원과 경상남도 소재 1개 대학부속병원에 압으로 진단받고 내외과 병동에 입원한 후 퇴원을 하여 외래에서 추후관리를 받고 있는 성인 암환자 132명이다.

[연구도구] 본 연구에서 사용한 도구는 권인수와 은영(1998)이 암환자의 퇴원 후 w간호 요구에 대한 간호사의 지각을 기초로 하여 개발한 것으로 총 65문항으로 구성되어 있다. 그러나 본 연구에서는 예비조사에서 내적 일관성 신뢰도가 적은 항목을 제외한 총 55문항을 이용하여 암환자의 질병 간호요구를 사정하였다. 특히 도구의 문장은 환자가 읽기에 무리가 있을 것으로 판단되어 선행 연구(권인수와 은영, 1999; 김춘길, 1998; 양영희, 1997; 이은옥 등, 1994)와 간호학 교수 1인, 박사 과정 간호학과 학생 2인과의 상담을 통해 선행연구에서 사용된 도구를 바탕으로 수정하였다.

[연구분석방법] 연구 대상자의 일반적 특성은 빈도와 백분율로, 영역별 간호 요구 정도는 평균 및 표준편차로 그리고 대상자의 일반적 특성별 질병 간호 요구의 차이검정은 t-test와 분산분석(ANOVA)으로 검정하였다.

[연구결과]

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1. 본 연구의 대상자들이 퇴원 후 지각하는 질병간호요구는 정서적 영역이 3.55 ± 1.06 으로 가장 높았고, 신체적 영역이 $2.39 \pm .90$ 으로 가장 낮았다.
2. 대상자의 일반적 특성에 따른 질병간호요구 영역의 차이는 연령과 결혼상태가 모든 영역에서 유의한 차이가 있었다. 종교와 성별은 정보, 신체, 정서, 및 전체 영역에서 유의한 차이가 있었으며, 경제상태와 교육정도는 정보, 사회경제, 전체 영역에서 유의한 차이가 있었다.
3. 암환자들이 퇴원후에 가장 많이 원하는 질병간호요구는 정보영역으로 그 중 투약 및 통증관리에 대한 간호 요구도가 가장 높았다. 대상자들이 가장 원하지 않는 요구는 신체 영역의 간호였다.

[결론 및 제언] 암과 암치료는 환자의 진단후 결과에 영향을 미칠 수 있는 질병에 대한 간호요구들을 발생시킨다. 따라서 그들이 가장 원하는 요구들을 파악함으로써 그들의 요구에 따른 새롭고 창조적인 간호중재전략에 대해 과학적 접근을 할 수 있다. 그리고 간호사들은 암환자들의 간호요구와 관심에 적절히 설명을 할 수 있으리라 사료된다.