



는 고정원 준비과정이 대부분 생략되고, 환자의 협조에 크게 의존하지 않고도 술자의 의도대로 치료를 진행시킬 수 있어 치아의 이동이 단순하여지고 빠르게 진행된다. 또한 교정치료의 목표가 상, 하악 전방부 치아들의 이동에 만 국한된다면 골내고정원을 이용하여 후방부 치아는 교정치료에 포함시키지 않을 수도 있다. 생역학적으로 치아 이동을 유도하는 데에 문제가 없으며, 심미적으로도 수용되고, 간단한 방법으로 설치와 제거가 이루어지는 골내 고정원이 사용된다면, 이는 치아이동을 가장 단순하게 그리고 빠르게 진행되게 할 수 있을 것이다.

OP-23 구연

Micro-screw와 악교정 수술을 이용한 안모 비대칭 환자의 치험 예

고상덕
고상덕 치과의원

안모에 대한 관심이 점점 증가함에 따라, 측모뿐 아니라 정모에서의 균형잡힌 외모에 관심을 갖는 환자들이 늘어나고 있다. 안모 비대칭은 외상을 포함한 다양한 원인으로, 편측 하악과두의 과성장 또는 열성장으로 인하여 나타난다. 특히 사춘기를 지나서 안모의 비대칭이 현저하게 나타난다. 하악골의 비대칭적 성장에 대한 상악골의 보상 작용으로 얼굴 전체의 비대칭을 초래하는 경우가 많다. 코와 상악 및 하악이 심하게 틀어지며, 높이의 차이로 인해 상악과 하악의 교합 평면이 경사져 있고, 심지어는 안면의 크기도 차이가 난다. 성장기 아동에서는 myofunctional appliance나 distraction osteogenesis가 이용될 수 있지만, 성인에서의 심한 골격성 비대칭은 악교정 수술을 통해서 해결할 수 있다. 안모 비대칭 환자의 수술은 먼저 상악골의 재위치를 위한 Lefort I osteotomy를 시행하며, 이에 맞게 하악골을 Bilateral sagittal ramus osteotomy나 internal vertical ramus osteotomy를 필요한 부위에서 시행하여, 전위된 하악골을 정상 위치로 조정한다. 또한 턱 끝 부분의 횡적 또는 수직적 이동을 위한 하악골 하연 골 절단술을 추가 할 수 있다. 그러나 안면 비대칭 환자에서 항상 고려해야 하는 것이 상악의 수술 여부이다. 상악의 비대칭이 있으면 상악에 대한 수술을 하는것이 당연 하지만, 상악 구치부의 좌, 우 경사를 개선시키면 상악에 대한 수술을 피할 수 있다. 본 연제에서는 micro-screw를 이용해 편측 상악 구치부를 압하시켜 상악 구치부의 좌, 우 비대칭을 바로잡고, 하악에 대한 편약수술 만으로 양호한 결과를 얻었기에 보고 하고자 한다.

OP-24 구연

그래픽 프로그램을 이용한 프리젠테이션 제작기법

장봉규
수원 L & J 치과

최근 개인용 컴퓨터의 성능향상으로 인해 이전에는 사용할 수 없었던 3D 그래픽 프로그램을 쉽게 운용할 수 있게 되었다. 일반적으로 치료과정이나 수술과정을 설명하기 위해서 임상사진과 일러스트레이션등으로 프리젠테이션을 만든 경우에는 중간과정 부분의 생략으로 인해 전체적인 과정과 연속적인 과정을 설명하는데 한계가 있었다. 그리고 정해진 진행과정 중에 약간의 변화나 시점의 변화는 거의 불가능했다. 하지만 3D 그래픽 프로그램을 이용하면 이러한 문제들을 해결할 수 있다. 출판물인 경우에는 3D그림, LCD 프리젠테이션인 경우에는 3D 애니메이션과 마우스를 이용해서 원하는 각도의 시점으로 돌려가며 볼 수 있는 인터랙티브 3D를 이용하면 다양한 상황의 재현이 가능하므로 원하는 상황과 시점을 재현할 수 있다. 또 일단 3D 모델을 제작한 상태에서는 쉽게