

OP-21  
구 연

Jaw rotation in 2-jaw surgery for class III malocclusion: why & how

김병호  
웃는내일치과의원

성인의 골격성 III급 부정교합은 치열의 기능교합개선을 목표로 하는 적절한 수술 전후 교정치료와 하악전돌을 개선시키는 악교정수술을 통해 성공적으로 치료될 수 있다. 악교정수술은 안모의 심미적 조화를 얻기 위한 과정인데도 불구하고, 수술의 복잡성이나 위험도를 피하기 위해 상악악 양악 수술보다는 1-jaw surgery를 선호하는 경향이 있으며, 양악수술은 상악열성장이 심할 때, 혹은 하악전돌량이 과도하여 수술 후 안정성이 의심되는 경우에, 상악골을 전방이동 시키기 위해 선택하는 것으로 인식되어 왔다. 그러나 최선의 심미적 안모와 기능적 교합을 치료목표로 한다면, 많은 III급 부정교합의 증례에서 상악골 수술을 통해 교합평면 경사를 변화시키고 이에 맞추어 하악골을 후방이동시키는 치료계획이 필요하게 된다. 따라서 골격성 III급 부정교합의 수술교정치료시 상 하악골의 clockwise rotation을 적절하게 시행함으로써 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

1. 하악골의 clockwise rotation에 의해 하순보다 하악이부가 더 많이 후방이동함으로써 하악이부의 전돌감이 효과적으로 개선된다.
2. A-point의 전방이동이 많지 않음에도 불구하고 midface의 convexity가 개선된다.
3. Facial plane에 대한 상악전치의 치축이 개선되므로 비발치 치료의 가능성이 높아지고 치료기간이 단축된다.
4. 완만했던 상악교합평면이 전하방으로 경사를 이루게 되면서, 상악치열의 smile line이 하순의 curve와 조화를 이루게 된다.
5. Positive overjet을 갖는 하악전돌 증례에서 무리한 술전 교정치료과정을 최소화하면서 효과적인 안모개선을 얻을 수 있다. 본 연제에서는 class III 수술시의 treatment goal과 이를 위한 상악하악골의 수술계획 수립방법을 제시하며, 증례를 통해 clockwise jaw rotation의 효과를 알아보려고 한다.

OP-22  
구 연

ASOrthodontics의 수술 계획시 고려사항

윤태호  
강남제일치과의원  
미래교정연구회

아름다운 외모에 대한 관심이 증가하면서 교정치료를 위하여 내원하는 성인 환자의 비율이 점점 증가하고 있으며 특히 구순의 돌출을 주소로 내원하는 양악 전돌증 (bimaxillary protrusion) 환자가 늘어나고 있다. 심미성 손상을 주소로 내원하는 양악 전돌증 환자들의 안모의 빠른 심미성 개선과 치료 기간의 단축에 대한 욕구가 증가하면서 전방분절 골절단술 (anterior segmental osteotomy)과 술 후 교정을 통한 단계적 교정치료 (ASOrthodontics)는 양악 전돌증 환자에서 좋은 치료 결과를 얻을 수 있는 효과적인 치료 방법이다. 좋은 치료 결과를 얻기 위하여는 환자에게 적합한 수술 계획을 수립하여야 하는데 이때 고려하여야 할 여러 요소들을 각각의 증례를 통하여 알아 보고자 한다.

OP-23  
구 연

악교정수술을 위한 교정치료

김성식  
부산대 교정과

현대 사회에서는 교정치료의 목표가 양호한 교합 기능의 회복과 심미적인 치열의 형성을 넘어서서 전체 안면의 심미성과 사회성의 개선으로 확대되는 추세이다. 이는 교정치료 영역에 악교정수술이 도입됨으로써 실현 가능하게 되었으며, 더욱이 악교정수술을 동반한 교정치료는 보다 이상적인 치료와 더불어서 치료 기간의 단축도 가능하게 하였다. 악교정수술을 동반하는 교정치료는 각 악골의 이상적인 위치로 치아이동을 하는 치성보상의 해소를 목표로 한다. 그러나, 악교정수술을 동반하는 교정치료가 상당히 광범위하게 이루어지고 있는데 비해서 악교정수술을 위한 교정치료에 대한 정보는 그다지 많지 않은 편이다. 이에 본 발표에서는 다음과 같은 부분에 대해서 임상증례를 통해서 고찰하고자 한다.