
무지 종자골에 발생한 무혈성 골괴사증 - 증례 보고(3예) -

Avascular Necrosis of the Hallucal Sesamoid - Three Case Reports -

인제대학교 의과대학 부산백병원 정형외과학교실

곽희철 · 정훈재

저자들은 외상의 과거력 없이 전족부의 통증을 호소하며 본원에서 시행한 단순 방사선 및 컴퓨터 단층 촬영상 무지 종자골에 경화 소견이 보이는 3예에 대해 증례 보고하는 바이다. 이중 두 명의 환자에서 자기 공명영상촬영을 시행하였으며 T1과 T2 영상 모두에서 종자골에 저신호 강도를 나타내었다. 이는 골괴사증을 시사하는 소견이며, 종자골 절제술을 시행한 두 환자에서 병리학적으로도 골괴사에 합당한 소견이 관찰되었다. 족부의 병변 중 무지 종자골의 무혈성 골괴사증은 매우 드문 질환이다. 단순 방사선 및 자기 공명영상촬영을 시행함으로 전족부에 동통을 유발하는 다른 질환과 감별을 할 수 있다. 저자들은 무지 종자골의 무혈성 괴사 3예에 대한 증례 및 이의 치료 방법에 대해 보고하고자 한다.