

## 蘭科植物의 一新變種

李 永 榮

梨花女子大學校 藥學大學

LEE Yong No: On new Variety of Orchidaceae

(1957. 10. 17 受理)

1956年 8月 14日 伽倻山頂(1400) 附近에서 發見한 蘭科植物의 一種이 調査結果 新變種이라고 認定되어 다음과 같이 記載發表하는 바이다.

*Noettianthe cucullata* (L.) SCHLECHTER

var. *variegata* YONO NO LEE

多年 草本이며 키는 10~15cm, 2개의 종날 같은 球根과 수염뿌리가 있고 뿌리 밑중에서 나오는 잎은 2개가 180°로 마주나고 둥근물 또는 둥근꼴이고 폭이 1~1.2cm 길이가 1.5~4cm 이며 잎면에 자주빛의 점점으로 된 무늬가 있다.

꽃대에는 2~3개의 披針形의 작은 苞葉이 붙고 직경이 0.8~1cm가 되는 꽃이 *Noettianthe cucullata* (L.) SCHLETER 꽃에 담겨 淡紅紫色으로 5~10個 扁側性으로 달다.

각꽃은 花蓋가 5이고 外花蓋 3片은 알뜰이고 內花蓋는 긴 알뜰이며 靑색의 唇瓣꽃잎은 흰빛이고 자주빛의 斑點이 많이 있다.

우리말 이름 : 점박이 병아리 난초

採 集 : 1956年 8月 14日 慶南道伽倻山頂

*Noettianthe Schlechtcre* in Fadd, Bei etne Repert. IV, 91 (1919)

*Noettianthe cucullata* (L.) SCHLECHTER

var. *variegata* YONG-NO LEE

Perennial, 10-15 cm high. Roots are fibrous with two tubers. Two (2)

leaves, placed at the base of stem, are opposite, 180° in divergence, ovate oreliptical in their outline 1-1.2 cm in width, and 1.5-4 cm in length and have number of purple-colored spots.

Floral axis has two (2) or three (3) of small lanceolate leaves and five (5) to ten (10) flowers on one side of the axis, in similar inflorescence as that of *Noettianthe cucullata* (L.) Schleter.

Flowers are approximately 0.8 to 1 cm in diameter and light purpish red.

Each flower has five (5) perigons. Three (3) outer perigons are oval.

Two (2) inner perigons are elongate oval and pointed at the tip.

Tabellum is white and has a number of purple spots.

Korean name : Chum-baeki Byung-ari Nan-cho

Collected at : Mt. Ka Ya, Kyung Nam  
on 14th August, 1956

