

—犬學講座—

## 愛犬家의知識

서울 特別市獸醫師會 常務理事

李丙祥

첫째 강아지 키우기 新銅鑄家 (The Novice Breeder)

만일 당신이 애견가(愛犬家)로서 번식계(蕃殖界)에 가입(加入)하고 싶은 마음이 있으면 처음부터 잘 생각해야 한다. 그 이유(理由)는 양심적(良心的)인 번식가(蕃殖家)로서는 돈이 생긴다기보다 도 되어 경제적(經濟的)으로나 시간적(時間的)으로도 많은 소비(消費)를 안볼수 없기 때문이다.

우리들이 기르는 개의 번식기(蕃殖期)가 (約 18個月 ~ 20個月) 도라오거든 암개를 잘 보호(保護)하여야 하는데 이 기간(期間)은 약 3주일 계속 되는데 가장 적합(適合)한 시기(時期)는 죄가 흐르기 시작한날 부터 11~13일째 되는 날에 번식(蕃殖)을 시키고 암놈을 안전(安全)한 장소에서 보호(保護)하여야 한다.

한번 새끼를 냉기 시작하면 약 6개월마다 한번씩 새끼를 냉을 것이다.

매체로 교미(交尾)를 하기전에 암개의 음부(陰部)는 부풀어 오르며 완전히 교미기(交尾期)가 되면은 죄를 훌린다. 이렇게 1주일~10여일이 지나면 매체로 암개는 힘에 풀리고 그 음부(陰部)가 연분홍색이 되거든이 암개는 임신(妊娠) 준비를 완료(完了)한 것이다. 이 모든일은 약 3주일 안으로 끝나며 만일 번식(蕃殖)을 시켰다면 약 57일~63일에 분만(分娩)하게 될 것이다.

양심적(良心的)이요 현명(賢明)한 번식가(蕃殖家)는 셋째번 발정기(發情期)가 오거든 번식(蕃殖)을 시켜야 하며 또 일년에 한번이상 새끼를 냉게 하여서는 절대로 아니된다.

그 이유(理由)는 이와 같이 하지 않으면 암개의 생명이 짧아 질뿐만 아니라 약한 강아지를 산출(產出)해서 결국은 죽기 쉽다. 그리고 좋은 강아지를 번식(蕃殖)시키려면 암개의 축주(畜主)는 좋은 혈통(血統)을 가진 새끼의 축주(畜主)와 서로 합의(合意)하여 교미(交尾)를 시킨다.

이때에 새끼의 나이(年齡)는 만 24개월이 지난 개라야 한다.

더 자세한것은 weimaraner종(種)을 번식(蕃殖)해본 경험(經驗)이 많은 친구나 수의사(獸醫師)에게 문의 하여 지도를 받아 실패(失敗)없도록 하여야 한다.

만약 당신이 새끼를 받을수 있는 모든 요소(要素)가 완전히 결정되었으면 암개 주인 만이 편리하고 값이싼(交尾料金)새끼를 선택해 서는 안된다. 그 이유(理由)는 우리가 강아지를 얻기 위해서만 교미(交尾)를 시키는 것이 아니라 좋은 품종(品種)을 얻어야만 고가(高價)로 매매(賣買)할 수 있기 때문이다. 그러므로 새끼를 택(擇)할 때에는 먼저 우리가 이 견종(犬種)을 어떤 분야(分野)에 사용(使用)할 것인가를 결정(決定)한 후 우리가 원하는 분야(分野)에서 가장 보범적(模範的)이며 좋은 품종(品種)을 골라서 교미(交尾)를 시켜야 한다.

만일 혈통(血統)이 부정확(不正確)하거나 성질(性質)이 나쁘고 신체(身體)가 견전(健全)치 못한 새끼와는 절대로 교미(交尾)시켜서는 안된다.

우리가 새끼의 혈통(血統)을 논(論)할 때에는 먼저 암개의 혈통서(血統書)를 제시(提示)하여야 한다. 이때에 양심적(良心的)이요 정당(正當)한 번식가(蕃殖家)라면 그 암개와 짹 지을수 있는 조건(條件)을 완비(完備)해 있어야만 그 개를 사용(使用)할 수 있을 것이다.

하여튼 우리는 이 문제를 신중히 처리해야 하며 번식(蕃殖)에 사용(使用)하려면 반드시 수의사(獸醫師)에게 진찰(診察)를 받아야 그 개들이 전염성(傳染性)인 질환(疾患) 특히 Polyp 같은것은 없는지? 또 이 개의 신체(身體) 조직(組織)과 좋은 강아지를 낳을수 있는지 없는지를 알수 있을 것이다.

그리고 개의 나이가 8년~9년 되었을 때에도 암개는 강아지를 낳을수 있다는 기록은 있지만은 새끼를 받지 않는 것이 암개 자신은 꽤 좋은 일이다.

그러나 나이가 4~5년이 되도록 한번도 새끼를 난 경험이 없는 개를 접종을 시킬 때에는 반드시 수의사(獸醫師)에게 진찰(診察)을 받아야 한다.

또 새끼를 낳을 때도 난산(難產)이 되기 쉽기 때문에 미리 경험이 많은 수의사(獸醫師)의 손을 빌이는 것이 가장 안전한 방법이다.

개 전문가(專門家)의 대다수는 어떤 암캐라도 일단 새끼를 배스면 실패 없이 낳도록 하는 것이 암캐의 건강(健康)으로 좋은 것이라고 생각한다.

앞으로 우리가 암캐에게 어떤 치료를 선택해 줄 것인가 하는 방법(方法)에 있어서는 이 방면(方面)에 권위자(權威者)들은 최소한(最少限) 24개월은 되어야 사용할 수 있다고 말한다.

또 좋은 개로 증명(證明)된 치료를 사용할 것이며 만약에 암캐를 잘 돌보아줄 조건(條件)과 시간(時間)의 여유가 없거든 새끼를 받지 않은 것이 오히려 좋을 것이다.

그러나 좋은 강아지를 낳게 하고 또 잘 키울 수 있도록 하였다면 큰 자랑이 될 만한 일이며 따라서 전에 느껴보지 못한 통쾌감을 느낄 것이다.

어미개와 새끼개의 주의 할 점(看護)은 먼저 번식(蕃殖家)은 다산계(多產系)를 택하여 한배로 부터 될 수 있는 한 많은 새끼를 얻으려고 노력할 것이다.

하여튼 이 첫째번 산출(產出)은 번식자(蕃殖者)에게 많은 체험(體驗)과 교훈(教訓)을 줄 것이다.

1. 암캐의 짹을 선택해 주었다.
2. 새끼 낳기 전 즉 임신중(妊娠中)에 있어서의 간호에 대한 기초지식(基礎知識)을 가지게 되었다.
3. 문화인(文化人)으로서 암캐에게 대해서 수의사(獸醫師)에게 진찰(診察)을 받았다.

4. 암캐가 첫 번째 새끼를 낳을 때 수의사(獸醫師)를 볼여 안전(安產) 할 수 있었다.

어떤 생물(生物)이 듣지 출산(出產)하는 때에는 비밀(秘密)이 있는 것이다.

이와 같은 사실은 개의 세계(世界)에서 같이 살아 나아가며 개를 기르고 가르치는 체험을 갖지 않고는 개를 이해(理解) 할 수 없을 것이다.

그러므로 당신은 완전히 알지 못하고 조금만 아는 것은 항상 위험(危險)한 것임으로 모르는 것을 잘 아는 전문가(專門家)에게 배끼거나 또 잘 배워야 한다는 것을 필자(筆者)는 미리 경고(警告)하여 둔다.

다시 말하면 암캐가 새끼를 낳기 전에 사람이 해주워야 할 일이 무엇인가를 잘 알아 두어야 할 것이다.

물론 새끼를 낳은 암캐에게는 그 자신과 강아지의

힘을 높기 위하여 영양가 많은 음식을 준다는 것은 잘 알고 있으나 산모견(產母犬)은 대개 과식(過食)의 해(害)가 더 많다는 것을 잊어서는 아니된다. 개집은 즉 개의 산실(產室)은 weimaraner가 평소에 거처(居處) 하든 상자 보다 더 큰 집을 마련해 주어 새끼를 편히 낳을 수 있도록 해 주어야 한다.

만일 상자가 적으면 암캐에게 상처(傷處)를 줄 뿐만 아니라 강아지를 깔아 죽일 위험성(危險性)이 없지 않다.

개집(產室)은 약 2주일 전에 미리 준비하여 암캐로 하여금 이곳이 새끼 낳을 집이라는 인식(認識)을 갖도록 알려 주어야 한다.

특히 개집은 잘 보이고 숨기가 없는 곳에 놓아야 하며 강아지가 개집 구멍으로 나올 수 없게 상자의 밑에서 높이 약 6인치 정도 해 놓아야 한다.

강아지가 약 3주일이 지나면 넘쳐한 판자 하나를 준비하여 개집 구멍에 걸쳐 놓아서 강아지가 그 판자를 타고 미끄러져 마루로 내려 올 수 있도록 해 주어야 한다. weimaraner 종(種)은 대개 웬만한 것은 뛰어 넘는다. 개집은 따뜻하게 하여 주는 것은 좋으나 너무 뜨거운 것은 도리어 어미개가 불편을 느낀다. 더욱이 전구(電球) 같은 것을 사용하는 것은 좋지 않다.

그리고 암캐는 임신(妊娠) 전에 구충(驅蟲)을 완전(完全)히 해 주어야 하며 만일 그 시기를 놓쳤거든 임신(妊娠) 후 약 3주일쯤 해서 수의사(獸醫師)의 지시에 의하여 장충(腸虫)을 없애도록 해 주어야 한다.

만일 이 때를 놓치면 새끼들에게 큰 해(害)를 주어 2개월 미만의 강아지의 사망률(死亡率)의 약 70% 이상을 차지하고 있다고 필자(筆者)는 주장하고 싶다.

또 암캐가 새끼를 낳을 시기가 가까워 오면 암캐의 젖 가슴이 불려 젖이 나온다. 이 때에 수의사(獸醫師)에게 부탁하여 젖에 산(酸)이 있나 없나를 시험(試驗)해 볼 것이다.

강아지가 소위 원인(原因) 불명(不明)으로 산후(產後) 24시간 이내에 출는 것은 젖 속에 산(酸)이 섞여 있었기 때문이다.

개집은 항상 깨끗이 해주어 이미 개나 강아지의 냄새가 나지 않도록 해 주어야 한다.

암캐가 새끼를 낳을 징조가 보이거든 수의사(獸醫師)에게 도움을 받아야 할 것이며 따라서 다음과 같은 주의(注意) 사항(事項)을 잊어서는 아니된다.

“새끼 낳는 상자(產室)를 만들 때에는 세 구석(三面)

에 넓이 5인치 가량의 판장으로 높이 6인치 정도로「선반」을 만들어 놓는다. 그것은 암개가 강아지를 깔고 풍켜 죽이는 것을 막는 유일한 방법이다.

이 개가 새끼를 낳으려고 신음할 때에는 곧 수의사(獸醫師)에게 연락하여 도움을 받아야 할 것이다 만일 수의사(獸醫師)의 도움을 받을 수 없을 경우에 새로 낳은 강아지가 숨을 쉬지 않을 때에는 그것이 죽은 것이라고 버리지 말고 수건으로 강아지를 문질어주며 가끔 약하게 때려보라 때때로 이렇게 하여 강아지를 살리는 수가 많이 있다.

수의사(獸醫師)는 이러한 강아지가 낳으면 원 손으로 강아지의 등쪽을 불들고 오른 손으로 앞발을 앞뒤로 움직여 인공호흡(人工呼吸)을 시키고 강아지 몸뚱이를 따뜻하게( $70^{\circ}\text{F}$ ) 해주라고 할 것이다.

새끼 낳은 어미 개의 운동(運動)에 관하여 서는 개자신이 잘 알고 있기 때문에 자유롭게 내버려 두면 된다. 결국 강아지를 칠기우는 방법은 「공기를 잘 조절(調節)해 주고 깨끗하고 조용하며 행복하게」 해주는 것이다.

개를 깨끗히 하는 방법은 첫째는 잘개와 젖을 깨끗이 칠아주고 출걸을 매일 같이 해주는 것이다.

둘째 다른 사람(他人)에게 어미개나 새끼를 보여주지 말 것이다.

친척 친구들이 와서 떠들며 강아지를 만져서는 절대로 아니된다.

또 강아지가 젖을 떨 때까지는 어미개가 밖에 나아갔다가 들어오면 반드시 발과 온몸을 씻어 주어야 한다. 그 이유(理由)는 해로운 것을 발과 몸에 몰쳐다 풀려가 있기 때문이다.

어미 개가 한 일에 대해서는 항상 칭찬을 하여 주고 귀엽게 쓰다듬어야 한다.

그러나 중요한 규칙(規則)을 위반(違反)하여 불행(不幸)을 초래하지 않도록 세심한 주의가 필요하다.

따라서 조금이라도 원인(原因) 모를 병이 일어 나거든 돈이 아까워서 수의사(獸醫師)와 의논 할 것을 계획해 하다가는 불행한 결과를 초래 한다는 것을 잊어서는 아니된다.

#### 【젖을 떼임】 (離乳 Care of mother and Family)

강아지의 젖을 떼어려면 수의사(獸醫師)에게 진단을 받고 다음부터 어떤 음식(食品)을 줄 것인가를 지시(指示) 받아야 한다. 약 2주일 지나면 새끼수(數)가 많고 어미개의 체질에 따라서 젖이 부족(不足)한 경우가 있다. 이 때에 품질이 좋은 우유(牛乳)나 산양유(山羊乳) 같은 것으로 보충(補充)하여야 한다.

또 4주일이 지나면 차츰 새끼들의 젖을 빼야하기 때문에 처음 몇 일은 오우트밀 같은 묽은 죽을 해주면 된다.

날이 갈수록 강아지들은 어미개의 젖을 먹기보다 음식을 먹게 되는 것이다.

**【란소(卵巢)를 없애는 문제】 (The Spaying Question)** Weimaraner를 샀을 때 또는 그 개를 가졌을 때 그 개는 참으로 윤택이 흘리는 아름답고 씩씩한 회색 개이다.

이 개를 애완용으로 또는 집보는 개로 기를 생각이 있으면 란소(卵巢)를 빼어버리는 것도 좋은 점이 많이 있다고 본다. 그러나 란소(卵巢)를 빼어 버리지 않도록 새끼를 월치 앙는다면 일년에 두번식 오는 그 시기(時期)에 약 3주일만 숫개와 접촉할 기회를 주지 않도록 주의해서 들보아 주면 된다.

그러나 집에 그 개를 감시할 사람이 없으면 발정 기간중(發情期間中) 수의사(獸醫師)에게 맡겨두면 된다.

외국에서는 많은 개 소유자(所有者)들이 가장 안전한 예방책(防護法)으로 이 방법을 쓴다.

또 외국에서는 피임약(避妊藥)이 있어서 수많은 암개를 아무런 나쁜 부작용(副作用)이 없이 사용하고 있다.

그 밖에 정조대(貞操帶)를 사서 사용하여 좋은 성과(成果)를 얻우고 있다고 한다.

그러나 반드시 란소(卵巢)를 제거(除去) 하라고 할 때에는 기술이 좋고 경험이 많은 수의사(獸醫師)에게 문의 하여 가장 좋을 때에 수술(手術)을 하여야 한다.

**【늙은 개 돌보기】 (Care of the Aging pet)** Weimaraner 종도 다른 개들과 같이 성품이 아름답게 자라나도록 노력(努力)해야 한다.

일반적(一般的)인 문제는 사람이나 개나 별로 틀리는 점이 없다고 생각 한다. 그러므로 나쁜 습관(習慣)이나 나쁜 요소(要素)는 늙은 사람이나 늙은 개나 그의 젊잔한 품위(品位)나 인격(人格)을 해(害)치게 되는 것이다.

사실(事實)은 그 소유자(所有者)가 교양(教養) 있는 절진한 사람이라면 그 개도 그 주인을 닮은 것이다.

우리 나라 사람들은 늙은 개를 돌보지도 않고 무용(無用)한 것으로 생각하는 폐풍(弊風)이 있는 것은 심히 유감 스러운 일이다.

개가 늙었다는 단순(單純)한 이유(理由)로 낚잘관자게 내버려 두어서는 아니된다.

우리가 weimaraner 종(種)을 다른 품종(品種)과 비교(比較)해 보면 옛날에 이개는 다른 품종(品種)의 개

들은 난로(爐) 옆에서 낮잠을 절때 weimaraner 만은 주인과 같이 사냥(狩獵)하려 나아가 하로 종일 일을 한 사실(史實)을 가진 개이다.

더우기 「도위치」의 기록(記錄)을 믿는다면 『weimaraner는 가장 오래 사는 품종(品種)들에게 적당한 운동을 할 수 있는 기회(機會)를 주는 것은 항상 우리들에게 기쁨을 가져온다는 것이다』

그러면 늙은 개의 가슴, 심장(心臟)의 상태(狀態)에 대해서 말해 보고자 한다.

즉 걸 모양만 보고 많은 사람들이 어떻게 개의 심장(心臟)과 인간(人間)의 심장(心臟)이 비교(比較) 될 수 있느냐고 반문(反問)하는 사람도 있을 것이다.

그러나 개의 여러 가지 심장병(心臟病)이 인간(人間)의 심장병(心臟病)과 거의 같은 증상(症狀)을 나타내고 있다는 것이다.

그러나 대단히 소수(少數)의 소유자(所有者)들만이 늙은 개를 정기적(定期的)으로 건강진단(健康診斷)을 하므로서 이 병을 발견(發見)하기 쉬운 일은 아니다. 물론 심장병(心臟病)은 사람과 꼭 마찬가지로 늙은 개에게만 있는 것이 아니다.

젊은 사람들도 심장병(心臟病)으로 죽는 예(例)가 많다.

DR. James cutler는 말하기를 「심장병(心臟病)의 원인(原因)이 되는 것으로부터 경계(警戒)하라」

「개들을 살찌게하지 말라」 사람보다 더 심장(心臟)이 비대(肥大)해진다

이런 경우에는 살이 찌는 음식이나 가슴에 해로운 음식을 너무 많이 먹여서는 아니된다. 개는 사람보다도 더 심장(心臟)이 비대(肥大)해지는 것이다.

이런 경우에 음식을 조절(調節)하여야 한다. 또 나아가 먹을수록 일을 멀지켜야 한다. 몇 달 동안 집에서만 지내온 늙은 개를 벼란간 들이나 산에 다리고 가서 새나 토키 같은 것을 끊어 뛰어 다니게 하지 말어야 한다.

특히 이 점을 주의 하여야 하며 만일 개가 숨쉬는데(呼吸) 불편을 느끼면 곧 수의사(獸醫師)에게 보여야 한다. 오래 내버려 두면 고칠 수 없는 죽을 병이 된다는 것을 잊어서는 아니된다.

개가 늙어가면 그를 늙은 사람 같이 취급하여 잘 둘보아 주어야 한다.

그러나 버릇없이 물지 못하게 하여야 한다.

늙은 개의 능력(能力)을 막을 염려가 있으니까 그를 너무 약하게 취급(取扱)하거나 어린아이 같이 취급(取扱)하지 말어야 한다.

그 개가 이집에 한가족이라는 것을 잊어서는 아니된다.

따라서 그 개가 항상 필요(必要)하며 어떤 일이든지 유용(有用)하다는 것은 개로 하여금 인식(認識)하게 하여야 한다.

우리 인간(人間)과 우리가 기르는 개도 같이 늙어간다는 것은 어찌 할 수 없는 사실이나 우리는 건전(健全)하게 살수 있는 것과 같이 우리가 기르는 개도 건전(健全)하게 살수 있는 것이다.

그러면 우리의 개를 잘 길렀는가를 다시 한번 살펴보기로 하자

- ① 개의 나이와 능력(能力)에 맞는 충분(充分)한 운동(運動)이 없을 때
- ② 건강(健康)이 못할 때, 너무 많은 일을 시켰을 때
- ③ 목욕을 너무 많이 했을 때
- ④ 털과 몸의 조직(組織)을 솔질해 주지 않았을 때
- ⑤ 사람이 적을 때
- ⑥ 너무 버릇없이 길렀을 때
- ⑦ 개의 운동(運動)에 비해서 너무 많은 먹이를 주어 슬 때
- ⑧ 나쁜 먹이를 계속해 줄 때
- ⑨ 잡자리가 나쁠 때
- ⑩ 수의사(獸醫師)가 지시(指示)한 주의를 잘 지키지 않을 때

즉 돈벌이에 만 열중(熱中)하기 때문에 많은 사람과 개들이 죽어 나간다는 것을 잊어서는 아니된다.

위에서도 말한 바와 같이 개의 나이가 많다고 해서 낮잠만 자게 내버려 두지 말고 그의 생애(生涯)에 낙(樂)이 없을 때 까지 또는 병들어(老患) 회복(回復)할 수 없을 때 까지 살게 하여야 한다.

필자(筆者)는 과거(過去)에 한마리는 10년 만에 그 다음에는 15년 만에 늙어서 죽을 때까지 길렀었고 현재도 7년된 Spanier종(種)을 기르고 있다.

다시 말하면 수의사(獸醫師)가 이제는 더 살 희망(希望)이 없다고 말하면 그때는 그 개가 마음대로 하고 싶은 대로 내버려 두어야 한다.

그리고 음식을 잘 주고 주인을 보고 반가워 하거던 쓰다듬어 주어야 한다. 또 심장(心臟) 해(害)를 주는 독(毒)을 피하기 위하여 이빨을 닦아 주어야 한다.

또 적당한 운동을 시키고 수의사(獸醫師)에게 다리고 가서 음식의 이상파민(異常過敏)이나 Vitamin의 부족이 없는지 알아 보아야 한다.

【친교】(親交 Tribute to a Great Pal) 개는 병어리가 아니기 때문에 주인을 괴롭히는 모든 인간(人間)

들에 켜 있어서는 참으로 구합은 존재(存在)이라고 생각된다. 또 우리 인간(人間)의 종족(種族)이 근본적(根本的)으로 나쁜것이 없는 것과 마찬가지로 개에 있어서도 모든 품종(品種)이 같다라는 것이다. 개는 네 다리(四肢)를 가졌으며 먹기를 좋아하며 질병(疾病)에 걸리기도 하며 그들은 인간(人間)을 자신(自身)보다 우수(優秀)한 종류(種類)의 동물(動物)을 존경(尊敬)하고 있는 것이 사실이다.

작 품종(品種)의 개들은 고유(固有)한 역사(歷史)와 전통(傳統)과 특징(特徵)을 가졌기 때문에 우리는 같은 품종(品種) 안에서도 그 용도(用途)가 다른 여러 계열(系列)이 있다는 것을 알 수 있다. 또 우리가 발견(發見)할 수 있는 것은 한배에서 나온 여러 마리 새끼들사이에도 각각 차이(差異)가 있다는 것을 엿어서는 아니된다.

또 이 견종(犬種)은 짖는 소리가 어느 품종(品種) 보다도 크다는 것이다.

미국(美國)의 기록(記錄)을 보면 14마리의 weimaraner종이 짖어 내는 소리가 265 acnes 단을 진동(振動) 시켰는 것이다.

특히 Weimaraner 종(種)은 훌륭한 독립정신(獨立精神)을 갖고 있으며 그리고 각자는 그 고유(固有)의 특징(特徵)과 행동방법(行動方法)의 전부(全部)가 으로지 그 소유자(所有者)에게 복종(服從) 하는 것 뿐이다.

Weimaraner는 항상 새로운 것을 하려고 하며 재미 있는 착난도 잘 만들어 내는 것이다.

필자(筆者)가 현재 기르고 있는 두마리의 weimaraner종(種)은 제 마음 대로 방문을 열고 드나드는 재주를 가지고 있고 또 뛰어 넘기를 좋아한다.

어떤 개는 자동차(自動車) 핸들(handle)을 꽉 물고 비틀어 문을 여는 개도 있다.

미국의 Diana라는 개는 새벽 3시에 집을 나아간 주인(主人)이 440Yards 떠러진 곳에 사고(事故)가 일어난 것을 냅새를 맡고 따라가 도적으로 부터 그의 주인(主人)을 보호(保護)한 사실(事實)도 이 개이며 불타는 집에서 두 아이를 구해 내어 월계수(月桂樹) 상을 탄 것도 이 개이다. 이 견종(犬種)은 주인(主人)에게 충성(忠誠)하며 무엇이 던져 해 볼려고 시험해 보며 그의 주인(主人)이 어떠한 일을 하던지 그것을 성취시키려고 노력(勞力)하는 개이다.

그리고 이 견종(犬種)은 경주(競走)를 해서 이기려는 욕심을 가지고 있음으로 대단히 빠른 개이다.

이 개는 시속(時速) 38 miles의 속력(速力)으로 자동

차(自動車)를 앞서는데 이제는 자동차(自動車)가 따라올수 없는 정도로만 뛰지 그 이상 속력(速力)을 내지 않는데 그들은 마치 기록(記錄)을 수립(樹立) 할려고 뛰는 것보다 시합(試合)에서 승리(勝利) 하는 것으로 만족(滿足) 하는 육상(陸上) 선수(選手)들과 대단히 비슷하다.

또 이 견종(犬種)은 질서 있는 개임으로 그들이 모든 품종(品種)들과 같이 시합(試合)에서 승리(勝利)하지 못하는 중요(重要)한 이유(理由)는 Game에 규칙(規則)을 지키는 것이 그들의 의무(義務)라는 것을 알고 있고 그들의 고향인 「도위치」에서는 Game의 규칙(規則)을 위반(違反)하는 것을 싫어하는 사람들의 귀여운 동물(動物)이 된 것이다.

끝으로 weimaraner종(種)이 한국의 알맞는 견종(犬種)인가? 하는 질문에 필자(筆者)는 서슴치 않고 가장 적합(適合)한 견종(犬種) 중에 제일위(第一位)라고 대답한다.

그 이유(理由)는 필자(筆者)가 과거(過去) 30수년간 30여종(餘種) 수백마리의 견종(犬種)을 자신(自身)이 직접(直接) 사육번식(飼育蕃殖)하였고 또 훈련(訓練)을 거듭하여 따라서 수천(數千) 마리의 각종(各種) 개들과 벗하여 과학적(科學的) 관찰(觀察)과 수많은 체험(體驗)에서 특히 weimaraner종(種)에 대해서 알게 된 것은 제2차 대전(大戰) 이후이며 직접사육(直接飼育)하고 훈련(訓練)할 기회(機會)를 갖게 된 것은 불과(不過) 6년 밖에 안되어 친우(親友)의 후의(厚意)로서 약 10개월된 암개를 사육(飼育)할 기회(機會)를 갖게 되어 그 암개가 생후(生後) 2개월후 부터 번식(蕃殖)을 시작하여 첫째에 8마리(♀5 ♂3)을 낳어서 전부 8두를 무난히 길렀으며 둘째 배에는 9마리(♀7 ♂2)을 낳어서 다아 길렀으며 또 세째 배에는 8마리(♀6 ♂2)을 낳았으며 그 동안 그 첫째 새끼가 또 새끼를 8마리(♀5 ♂3)을 낳았다.

이와 같이 50여마리의 weimaraner종(種)을 번식(蕃殖)과 훈련(訓練) 해본 결과(結果) 또 모든 문헌(文獻)을 참고(參考) 종합(綜合)해본 오늘에 있어서 결론적(結論的)으로 말한다.

- 한국기후풍토(氣候風土)에 알맞는 견종(犬種)이다. 즉 weimaraner종 만은 Pointer Boxer Doberman Pinscher 같은 견종(犬種)이 살고 활동(活動) 할 수 없는 주위에서도 그 임무(任務)를 수행(遂行) 할에 조금도 지장(支障)이 없다.

- 한국 사람의 가족(家族)의 일원(一員)으로서 평소(平素)에 먹는 음식으로 발육성장(發育成長) 할 수

있다.

3. weimaraner종의 성질(性質)이 이지적(理智的)이고 용감무쌍(勇敢無雙)한 정력가(精力家)로 사물(事物)에 대한 변별능력(辨別能力)이 정확(正確)하여 판단력(判斷力)이 강(強)한 견종(犬種)임으로 모든면에 적용(適用)할 수 있다.

4. weimaraner종은 구충(驅虫)과 전염병(傳染病)에 대한 예방(豫防)만 철저히 한다면 질병(疾病)에 대한 저항력(抵抗力)이 가장 강(強)할 뿐더러 번식(蕃殖)도 잘된다.

5. weimaraner 종은 개 냄새가 없다는 것과 주인의 손을 할지 않은 훈련(訓練)이 된다.

다시 말하면 weimaraner종은 100수십년간 weimar 귀족사회(貴族社會)에서 개로 길러진 것이 아니라, 귀족(貴族)의 한사람으로서 한 집에서 한 방에서 침실(寢室)을 같이 하고 bed 만을 따로하고 같이 먹고 살아온 개인 민족 다른 견종(犬種)에서 볼수 없는 귀족적(貴族的)인 태성을 갖추고 있다.

#### Weimaraner의 표준

##### (The weimaraner Standard)

이標準은 1953年 12月8日 American Kennel club (A, K, C,)에서 認准된標準이다.

#### 「一般外貌」 General Appearance

全體의 均衡이 맞는 灰色빛 갈을 갖인 中型犬으로서 특히 이犬種은 野外에서 熱心히 活動할 수 있는 能力を 나타내어야 한다.

#### 「키(體高)」 Height

수개는 25~27 Inch

암개는 23~25 Inch

#### 「머리」 Head

適當히 길고 貴族의이다.

코끝으로부터 스톱(Stop)까지의 기리는 스톱(Stop)으로부터 後頭部까지의 길이와同一하다.

늘어진 입술은 힘찬 턱을 싸고 길어야 한다. 前面은完全히 直線이고 코 끝으로 갈수록 좁아져야 한다.

皮膚는 緊張되어있고 목은 곳장 뻗어야하며 適當히 길다. 表情은 親切하고 銳敏하며 智性的이다.

#### 「귀(耳)」 Ears

길고 小葉狀이고 若干 안으로 접하고 높이 불어 아래로 늘어져 있다.

귀는 코끝으로부터 약 2 Inch 가량의 距離를 두어야 한다.

#### 「눈(眼)」 Eyes

灰色 青灰色으로서 光線이 弱할 때에는 연한 琥珀色

으로 變한다. 또 興奮되어 눈알(瞳孔)이 커졌을때는 거의 黑色으로 變한다.

#### 「이(齒)」 Teeth

堅固하고 齒列이 고르다.

잘 發達된 턱(顎)은 適當히 咬合되어 그 差異가 1/16 Inch 이상이면 좋지 않다.

#### 「코(鼻)」 Nose

灰色이다.

「입술과 잇몸(唇)(齒齦) Lips and Gums 淡紅色 肉色이다.

#### 「몸(體構)」 Body

등(背)의 길이는 適當하고 特通한 直線이어야 하며 肩峰(Withers)으로 부터 若干 傾斜를 이루어야 한다. 가슴(胸部)은 充分히 發達되고 狹어야 한다.

어깨(肩部)은 特通하고 輕快하여야 한다.

늑골(肋骨)은 잘 솟아 나오고 깊어야 한다.

배(腹部)는 緊張氣가 있고 適當히 앞으로 축혀져야 한다.

가슴(胸深)Brisket은 팔굽치(Elbon) 까지 느려져야 한다.

털(Coat)은 短고 부드러운(Smooth) 灰色으로 부터 銀灰色에 이르기까지 潤澤하고 普通 머리와 귀에는若干 연한 빛이 되는수가 많다.

胸部에 있는 조고만 白斑點은 許容할 수 있으나 其他部分에 있어서는 안된다. 그러나 負傷으로 因한 白點은 無關하다.

#### 다리(脚) Legs

앞다리는 直線이고 強하여 팔굽치(Elbow)로 부터 地面까지의 距離는 팔굽치(Elbow)로부터 肩峰(wither-s)까지의 距離와 同一하다.

뒷다리(後肢)는 充分히 角形을 이룬 뒷 무릎 關節과 飛節은 直線이다.

#### 발(Feet)

堅固하고 물해치기(webbed)를 가지고 있으며 빌통은 아-취形으로 되어 短고 灰色 또는 琥珀色이다.

상지(上趾)(Dewclaws)은 前肢에만 任意로 許容된다.

꼬리(尾)는 短게 자른다. 完全히 成熟한 後에는 굵은 便보다 가-는 傾向을 갖고 約 6 Inch 가량되며 自身과 健全한 品性을 表現한다.

#### 「거름거리(步容)(Gait)

거름 거리는 不自然하게 보이나 뛰는 動作은 自然스러워야 한다.

부복(覆伏)姿勢는 特 圓滑한 調和를 表示한다.

後方으로 부터 보여질 때는 뒷다리와 앞다리는 평행하여야 한다.

侧面으로 부터 보여질 때에는 등(背線)은 튼튼하고均一하여야 한다.

#### 품성「品性」(Temperament)

이犬種은 銳敏하고 慶이 없고 友好的이며 服從心이 強하다.

#### 가장重大한缺點 (Very Serious Faults)

長毛 또는 短灰色으로 부터 銀灰色까지 보다 더 검은 빛은 劣性體質을 表示하는 것이다.

胸部以上의 白點은 許容치 않는다.

눈빛은 灰色 靑灰色 또는 琥珀色 以外에 다른 빛은 許容치 않는다.

黑點을 가진 주등이(吻). 짜르지 않은 꼬리(尾). 神經質. 恐怖症을 가진 것도 同一하다.

#### 重大한缺點 (Serious Faults)

너무 번약한 體姿. 다리(腳) 牛飛節(Couhocks) 즉 처지고 흔들리는 등(背) 내려붙은 턱(顎) 鼻鍾이 뾰족한 것 짧은귀(耳) 白點中의 黃色이 섞인 것 體少한 것.

#### 缺點 Faults


웃개 模樣으로 보이는 암개(牝犬) 암개같이 보이는 웃개(牡犬) 지나친 筋肉質 고르지 못한 이(齒) 지나치게 길거나 지나치게 짧은 등(背) 缺點있는 被毛 특(頸)이 지나치게 짧거나 또는 짧은 것 발금치가 지나치게 오무리지든가 또는 벌려진 것 다리가 안쪽으로 벌려진 것.

#### 些少한 缺點 (Minor Faults)

꼬리가 너무 길거나 너무 짧은 것.

핑크(Pink)빛의 코 全部가 너무 큰 것은 重大한 缺點으로는 生覺되지 않은다.

다만 正確한 體格과 活動能力이 確信되는限 容許한다. (끝)



犬體의 各部名稱

1. Nose-鼻; 코.
2. Muzzle-鼻面
3. Stop-스톱; 頸段.
4. Fore head-額; 이마
5. Cheek-腮; 頰
6. Occiput-後頭
7. Ear-耳; 耳
8. Arch or Crest-(頸背의 隆起); withers-지甲
9. withers-지甲
10. Rump or Croup-臀 또는 尾; 불기
11. Tail-尾; 꼬리
12. Lips or Flews-唇; 獵犬들의 들어진 입술
13. Shoulder-肩; 어깨
14. Point of Shoulder-肩端
15. Brisket-胸; 가슴(前胸)
16. Elbow-肘; 팔꿈치
17. Forearm-前膊
18. Knee-膝; (앞무릎)
19. pastern-繫部;
20. Paw-足; 발
21. Chest-胸; 가슴
22. Point of Rump-臀端
23. Stifle-後膝關節; (뒷 무릎)
24. Hock-飛節;
25. Dewclaws-(上指)
26. Legs-脚