

<臨 床>

不妊症에 對한 診斷과 治療方針

趙 忠 鎬

一時的으로 또는 持續的으로 繁殖의 障害를 招來하거나 또는 繁殖을 停止하게 된 것을 一般的으로 不妊症이라고 할 수 있다.

個體의 遺傳의 異常이라든가 紡養障害 全身的疾病 그리고 生殖器管의 異常과 疾病 또한 各種의 荷物分泌의 失調 및 交尾의 失宣等은 모두가 繁殖을 障害시킬 수 있는 原因이 될 수 있으며 飼養管理의 不良, 環境, 年令, 季節等도 繁殖機能에 크게 關係된다고 할 수 있다.

一般的으로 다음의 몇 가지 事項은 家畜에 있어서 不妊症으로 取扱여도 좋을 것이다. 即

(1) 家畜이 繁殖年令에 到達되었는데도 또는 分娩後 一定한 時日을 經過하였는데도 不拘하고 卵巢의 活動이 없으며 無發情 또는 異常發情을 나타내므로서 交尾나 或은 人工授精을 하지 못하게 되는것.

(2) 發情이 發現됨으로서 交尾 또는 人工授精은 시킬 수 있으나 子宮이라든가 또는 其他の 異常 및 疾病으로 말미암아 受胎되지 않는것.

(3) 臨床의로 別로 認定될만한 疾病이 없는데도 不拘하고 3回以上 授精을 시켜도 受胎되지 않는 所謂 低受胎牛 Repeat breeder.

(4) 受精卵 또는 胎兒가 早期에 死滅되여 吸收되었거나 或은 사람의 눈에 띠기 힘들만한 早期流產等도 一般的으로 不受胎로서 取扱될 수 있다. 또한 妊娠經過中 어떠한 原因에 依해서 胎兒가 死亡하게 되거나 또는 母體의 異常으로 因하여 流產을 이르키게 되는것 또는 子宮內에서 死胎兒가 浸漬되거나 미아라 變性으로 되는것.

(5) 分娩直前이라든가 經過中에 胎兒의 死亡을招來하거나 또는 難產을 하게 되는것, 또한 分娩後 胎盤의 停滯을 일으키게 되며 母體에서 異常이 認定되는것. 子宮의 恢復이 不充分한것.

(6) 仔動物의 發育이 不良하거나 起立不能으로 되는것, 또는 哺乳不能이라든가 其他 여러가지

條件으로서 生後 30日以內에 鑿死되는것.

(7) 牧畜에 있어서의 交尾欲減退 또는 消失, 陰基의 異常으로 因한 交尾 및 射精의 障碍를 招來하게 되는것.

(8) 精子의 異常, 死滅, 無精子 또는 精液의 異常이 있는것, 等일 것이다.

1. 不妊症의 原因

1. 牧畜에 있어서의 原因

(1) 繁殖年令이 되었음에도 不拘하고 發情을 全然 나타내지 않거나 또는 微弱한것, 發情周期가 아주 不規則한것, 或은 發情이 異常의으로 오래 持續되는것에 있어서는 卵巢의 發育不全, 卵巢機能의 減退 또는 停止를 나타내고 있는 것으로서 卵子의 排出이 이루워지지 않으므로서 繁殖不能이 된다. 이와같은 경우에는 卵胞가 發育成熟되지 못하거나 또는 卵胞囊腫을 形成하게 되는 것 이 많다.

(2) 生殖器管의 老天의 畸形, 卵管, 子宮頸管의 狹窄, 閉鎖 그리고 難產等으로 因한 產道의 損傷 및 異常 瘢痕形成等으로 因한 異常分泌物의 潤滑尿膜 等은 모두가 精子의 游走進入을 遮斷하게 되거나 妨害하게 되며 或은 그 活力を 減少 또는 죽이게 될으로서 精子와 卵子하고의 受精을 障碍하게 된다고 본다.

(3) 受精卵은 卵管을 下降하여 數日後에 가서 子宮에 到達하게 되는것인데 子宮內에 異常分泌物이 潤滑되거나 또는 粘膜面의 卵子着床變化가 不充分할 경우에는 受精卵의 着床은 防害되어 또는 着床은 되여 妊娠은 成立된다 하더라도 早期에 死滅되거나 流產되는 것이 있다고 본다. 子宮內膜의 變化는 子宮가타르 等과 같은 炎症性의 것 뿐만 아니라 瘢痕組織血行障礙 等에 依하는 수도 있으며 子宮의 發育不全 等은 妊娠을 繼續시키기가 極히 困難하다고 본다.

## 2. 흔문性 原因

牡畜에서 精丸홀몬의 分泌가 不足하게 될 때는 副生殖器管의 發育不完全을 招來시킴으로써 交尾欲을喪失하게 되여 繁殖不能을 나타낸다.

牝畜이 繁殖年令에 到達될 것 같으면 卵巢에서 卵胞의 發育 排卵을 일으키게 되고 黃體를 形成하게 되며 二次的으로 卵胞홀몬의 作用에 依하여 發情을 나타내게 되는 同時에 子宮粘膜의 充血과 肿脹을 이르킨다고 할 수 있다.

黃體홀몬은 子宮腺의 發育, 子宮粘膜의 增殖을 이르키고 受精卵의 着床 및 發育을 도와주며 妊娠을 持續시킨다고 볼 수 있다.

이와같은 경우 卵巢의 發育不完全 或은 機能減退等을 招來하게 될 때는 卵胞의 發育停止를 이르켜 無發情 또는 異常發情을 나타내게 되고 卵胞홀몬과 黃體홀몬의 分泌異常은 子宮粘膜에 있어서의 受精卵의 着床과 發育을 障碍하게 된다. 黃體가 異常의으로 長期間 存在하게 될 때는 黃體홀몬의 分泌가 持續됨으로서 卵胞의 發育은 抑制되며 따라서 發情을 나타내지 못한다. 그러나 妊娠中에 있어서의 黃體홀몬의 不足은 妊娠의 繼續을 不可能하게 하여 流產을 이르키게 된다고 볼 수 있다. 이와같이 암수動物의 生殖器管의 機能은 精丸홀몬 및 卵胞홀몬 그리고 黃體홀몬 等의 作用에 依하여 正常의으로 이루워진다고 할 수 있다. 따라서 이들 홀몬의 分泌가 過多할 경우라든가 또는 不足하게 될 경우에는 各種의 異常을 나타내게 된다고 할 수 있다. 精丸 및 卵巢의 正常의 機能은 이것을 支配하게 되는 大腦下垂體 前葉홀몬의 適當한 分泌刺激에 依해서 調整되고 維持되는 것이다.

前葉性홀몬中의 卵胞刺激홀몬(F.S.H) 黃體形成홀몬(L.H.) 및 黃體化홀몬(乳汁分粘홀몬)(L.T.H.)의 分泌不足 또는 亢進或은 精丸홀몬 또는 卵胞홀몬과의 相互關係의 強弱, 失調 等에 依하여 精丸 및 卵巢의 機能은 때로는 減弱되며 때로는 異常의으로 刺戟되고 卵巢의 異常의 刺戟은 多數의 卵胞를 發育시키게 됨으로서 持續性發情, 卵胞囊腫 等을 發生시킬 때가 있다. 이와같이 精丸홀몬 및 卵胞홀몬 그리고 또한 黃體홀몬 나아가서는 下垂體前葉性홀몬의 分泌異常 亢進 等에 依해서, 그리고 副腎皮質 및 甲狀腺의 機能卵胞

홀몬의 不活化等 또한 肝臟機能도 關係되어 이것들의 相互關係에 어려한 失調를 招來하게 될 때에 있어서는 繁殖의 障碍를 나타내게 되는 것이다.

## 3. 榮養障害에 依한 原因

榮養狀態의 良否는 몸의 發育, 内臟器管의 機能과 密接한 關係를 갖게 되며 繁殖能力에 많은 影響을 주게 된다. 榮養의 增進, 健康의 維持는 生殖腺의 機能을 旺盛하게 한다.

榮養不足, 減退가 持續될 때는 母體를 維持하기 위한 手段으로서 胎兒의 雖死를 일으켜 流產되는 수가 많으며, 肥大됨으로써 脂肪分이 異常의으로 沈着될 때는 繁殖能力를 低下시킨다. 卵巢의 脂肪過剩沈着은 卵巢機能을 減退弱化시킨다. 牡畜에서도 異常의肥大는 精子의 生成이妨害되고 性欲을 減退시킨다.

## 4. 微生物에 依한 原因

소 또는 양의 브르셀라症 Brucellosis, 胎兒弧菌性流產 Vibriosis, 렙토스파이라症 Leptospiriosis, 트리코모나스症 Trichomoniasis, 또한 말의 傳染性流產菌 等은 모두가 子宮疾病을 일으키거나 또는 胎兒의 雖死를 招來시킴으로써 不妊娠, 流產의 原因이 된다.

Brucellosis 또는 말의 流產菌 같은 것은 牡畜에서도 感染됨으로써 精丸, 副精丸 等에 炎症을 일으키고 交配에 依하여 또는 人工授精을 通하여 牡畜으로 傳播시킨다. 소의 顆粒性腹炎, 말의 嬌疹도 交配를 通하여 感染傳播시켜 繁殖障礙를 일으킨다.

## 5. 解剖學의 異常으로 因한 原因

先天의으로 發生되는 生殖器官의 解剖學의 畸形 또는 機能의 異常은 그 種類程度에 따라서 受胎困難을 일으키게 되거나 또는 처음부터 絶對의 인 繁殖不能으로 되는 것이 있다.

即 소의 異性雙兒 Free-martin, 雌雄同體 Hermaphroditismus, 그리고 山羊에서의 間性 Intersexuality 等은 代表의인 것이다.

말에서 間或 볼 수 있는 潛在性精丸(陰精)도 精子의 生成에 異常을 가져 오므로서 繁殖能力를喪失시키며, 子宮頸의 閉塞, 子宮의 缺損, 處女膜의 遺殘症은 모두가 繁殖障碍를 일으키는 原因이 된다.

## 6. 牡畜에 起因되는 原因

睾丸의 發育不全, 機能減退, 精子形成機能의 異常等에 依한 精液의 異常, 精子의 缺陷, 生存率, 活力의 不良等은 授精不良, 繁殖不能을 招來시키며 또한 生殖器管, 精液中에 病原菌 또는 트리코모나스와 같은 原虫이 存在할때는 精液과 같이 牝畜의 子宮內로 進入되어 子宮內膜炎等을 發生시킴으로써 不妊의 原因이 된다.

副生殖器의 異常은 精液中에 異常分泌物을 添加시켜 精子의 生存과 運動을 妨害하며, 精管의 閉塞等은 精液의 射出을 不能케 한다.

睾丸의 發育異常, 豚母分泌異常 等은 交配欲을 減退, 微弱, 射精不能을 招來하게 되며, 또한 陰莖의 異常, 畸形, 彎曲 그리고 麻痺에 依한 勃起, 交配, 射精의 不能은 모두가 繁殖을 障害시킨다.

## 2. 生殖器 疾病에 對한 檢查와 診斷

### 1. 生殖器官의 檢查

牝畜에서의 生殖器官의 異常이나 疾病은 一般的으로 子宮, 또는 膜 等에서 分泌되는 異常分泌物이 外部로 漏出되는 것에 있어서만이 容易하게 發見할 수 있다고 보나 卵巢에 疾病이 있을 경우에는 無發情, 異常發情 等이 계속될 때 비로소 疑心을 갖게 될 程度이며, 때로는 交尾, 人工授精等을 여러번 反復함에도 受胎되지 못할 경우, 異常이 있다는것을 疑心하게 될 程度일 것이다.

따라서 連續的으로 受胎되지 않는것, 流產 또는 難產을 일으킨것, 또는 처음으로 繁殖시키고자 할 경우에는 繁殖의 能力이라든가, 生殖器管의 異常 및 疾病의 有無에 對하여 반드시 檢查를 하여야 될 것이다.

種牲의 繁殖能力이 不良한것에 있어서는 大部分이 交尾시킨 牝畜의 發情狀況이라든가 繁殖成積等에 依하여 알 수 있으며 繁殖能力이 不良한 것은 그 미치는 影響이 크기 때문에 種牲을 選定, 購買하게 될 때는 細密한 여러가지의 檢查를 하여야만 될 것이다.

### 2. 生殖器管의 異常과 疾病에 對한 診斷

不妊症의 原因은 複雜한 同時に 가지 각색임으로써 發見하기에도 困難할 경우가 많다고 본다. 따라서 不妊症을 診斷함에 있어서도 여러 角度로서 診斷하지 않으면 안될 것이다.

(1) 間診一間診은 不妊의 原因과 疾病의 部位 및 症狀 그리고 新舊의 程度를 알기 為하여 또한 診斷治療의 方法과 順序等을 計劃하는데 있어서서 參考가 되며 아주 有益할 것이다. 畜主로부터 또는 管理者로부터 告白를 聽取하여야 될 事項은一般的으로 다음과 같다.

그러나 때로는 畜主라 하여도 잘못 記憶하고 있을 경우도 있으니 만큼 그 全部를 絶對的으로 信用할 必要는 없다고 보겠다.

年齡一繁殖을 對象으로 하는 診斷이라든가, 治療等을 하게 될 경우에는 繁殖年齡範圍內의 것이라야 되며, 특히 血統ability이 좋은것 等은 繁殖年齡이 훨씬 넘었다 하더라도 繁殖에 利用될 때도 있다.

產地一外國으로부터 輸入하여 繁殖用으로 할 경우에는 氣候라든가 風土가 때로는 甚하게 달라지므로서, 또는 飼養管理에 있어서도 急作스러운 變化를 가져오게 됨으로써 암, 수, 動物이 다같이 生理的變調를 나타내여 當初에는 繁殖의 成績이 不良할 경우가 많다고 본다.

繁殖經歷一分娩回數라든가 最後의 分娩月日等에 依해서도 一般的으로 異常의 有無, 疾病의 程度, 新舊等을 判斷할 수 있다. 또한 流產을 이르친것에 對해서는 그 回數, 時期 및 原因等을 고려해서 次後の 流產防止等을 講究하여야 될 것이다. 難產은 一般的으로 子宮, 頸管, 膜 等의 異常으로 因하여 發生될 경우도 있으며 때로는 難產으로 말미암아 產道에다 損傷을 남기게 되는 수도 있다.

交尾 또는 人工授精의 方法에 있어서 그 方法이나 技術 또는 時期等이 適合치 못함으로써 健康한 것이 受胎되지 못할 경우가 있다고 본다.

發情周期 및 發情의 持續一確實한 發情이 規則的으로 그리고 周期的으로 잘 反復되고 있는지 그리고 發情持續의 長短 或은 發情의 強弱等은 卵巢機能의 狀態라든가 永久黃體, 卵巢囊腫의 有無等이 判定될 것이다.

最近의 交尾, 人工授精의 有無와 交尾月日一이미 交尾 또는 人工授精을 한것에 對해서는 일단 妊娠診斷을 하여 보는것을 原則으로하여 妊否를 確認하여야 되며, 萬一 이것이 妊娠되지 않았을 때에는 仔細한 檢查를 하여야 한다.

을 경우에 있어서 만이 檢查를 하는것이 좋을 것이다. 妊娠動物에 있어서는 流產을 일으킬 念慮가 있을뿐만 아니라 診療의 必要性이 거의 없기 때문이다. 그러나 때로는 畜主가 妊娠되지 않는 것으로 믿고 있는 것이라 할지라도 妊娠되어 있는例도 많을 것이다.

一般的的検査—外觀的으로는 外貌, 體格, 體形, 元氣, 눈, 귀의 運動, 被毛의 光澤, 繁養狀態 및 살집等을 觀察하면 될 것이다.

種類, 品種에 따라서 또한 年齡에 比할때 體格이 유난히 적은것, 幼若, 發育이 不良한것, 또는 꼬리밑이 우뚝 솟아 나고 그兩側이 우뚝하게 陷沒되어 있거나 또는 肛門部가 陷沒되어 있으며 老衰하게 보이는것, 等은 모두가 生殖器管에 있어서도 어떠한 異常이 存在하고 있을 것이며 따라서 繁殖은 不良하고 恢復에 있어서도 相當한 時日이 要하게 될 것이다.

牡畜의 머리라든가 목, 또는 앞가슴, 等이 強大하게 보이며 그 모양이 마치 牡畜의 모양과 비슷하게 보이는 것에 있어서는一般的으로 卵巢나 子宮의 發育不良을 招來하고 있거나 또는 脣門의 分泌異常 等에서 나타난다고도 할 수 있으며 卵胞囊腫, 永久黃體 等이 長期間 存在하고 있을 경우에도 볼 수 있는 事實일 것이다. 이미 體形의 異常을 일으키고 있는 것은一般的으로 恢復될 可望性은 거의 없다고 보아도 좋을 것이다.

살집이라든가 繁養狀態는 適當한것이 좋을 것이며 肥滿되어 있는것은 卵巢의 機能이 不充分한 것이 많다고도 볼 수 있으며 飼料의 給與狀況이나 運動의 狀態하고도 關連해서 考慮하는것도 좋다고 生覺된다.

(3) 生殖器管의 檢查—問診, 그리고一般的的検査에 있어서 檢查의 目標와 順序에 따라서 膽檢査, 粘液의 肉眼的, 顯微鏡的検査, 그리고 또한 直腸検査, 子宮洗滌法 等을 適切히 適用하게 되며 나아가서는 卵管의 疾病検査라든가 頸管粘液의 精子受容性的検査, 또는 子宮組織의 檢查 등을 行하게 되는 수도 있을 것이다. 牡畜에 있어서는 交尾欲의 狀態, 睾丸, 副睏丸, 精管의 觸診, 精液, 精子의 肉眼的, 顯微鏡的検査等을 할 수 있으며 直腸検査로서 精管膨大部, 精囊腺, 前立腺

等을 觸診하여 主로 그 發育狀態를 檢查하게 된다. 各生殖器官의 狀態라든가 또는 異常, 疾病의 有無, 程度, 等은一般的으로 以上과 같은 檢查로서 알 수 있으나 1回의 檢查로서 그 判定이 困難하다고 여겨질때는 數日間의 間隔을 두고서再次 檢查하여 먼저번의 것과 比較 決定하는 것이 좋다고 하겠다.

檢査에 利用되는 모든器具, 器機, 또한 術者の 手指의 消毒等은 特히 嚴重히 하여야 되며 檢查로 因한 疾病의 感染 또는 悪化 等을 招來시카는 일이 없도록 特別한 注意가 必要할 것이다.

### 3. 診斷의 決定

診斷의 決定은 各部分을 詳細하게 檢查한 然後 綜合的 判断에 依해서 그리고 疾病의 部位, 狀態 및 原因, 誘因等을 明白히 하여 가지고서 決定지어야 될 것이다. 診斷을 話에 있어서 어느한 뿐만한 變化를 發見하게 될 경우에는 一般的으로 그것이 不妊症의 主因으로서 生覺하게 되는 것이 普通이라 하겠지만서도 때로는 그 本來의 原因이 英雄하게도 다른 곳에 存在할 때도 있을 것이며 比較的 輕한 症狀을 나타낸다 하더라도 그것이 二重三重으로 合併됨으로서 不妊을 일으키는 수도 많다고 보겠다.

本來의 不妊原因을 究明짓지 못하게 될 때에는 診斷, 治療, 處置, 等은 그 方向이 全然 달라지게 되니만큼 治療에 있어서도 自然 無益한것이 될 것이며 오히려 有害의인 것이 될 경우도 있다고 하겠다. 一般的으로 볼때 不妊의 原因은 반듯이 生殖器管의 異常이라든가 疾病에만 있는 것으로 알고서 때때로 誤診을 하게되는 일이 있을 것이다. 그러나 無發情, 發情微弱 等에 있어서는 繁養不良, 衰弱, 等에 起因되는 수가 많으며 또한 子宮, 경管 等의 疾病, 또는 分娩後의 子宮의 恢復等도 繁養不良과 關係되는 일이 많다고 할 수 있으니 만큼, 繁養狀態, 管理狀態 等에 對해서도 注意할必要가 있다고 본다.

### 3. 生殖器管의 異常 또는 疾病에 對한 治療의 方針

一般的으로 볼때 大部分의 畜主들은 症狀이라든가 異常狀態의 消退等만을 바라고 있는것이 아

나라 그 家畜에 있어서 受胎와 分娩을 热望하고 있다는 事實을 考慮하여 治療를 함께 있어서도 第一段階로서는 勿論 症狀과 異常의 消退恢復에 있치만서도 終局에 가서는 受胎를 시켜주는데 그 目標를 두지 않으면 안될 것이며 또한 自信을 가지고서 處置를 하여야 될 것이다.

治療에 있어서는 그 原因과 症狀에 따라서 外科的 處置라든가, 흘물劑의 利用 또는 化學藥品, 抗生物質等을 應用할 必要가 있다든가 其他 各種의 方法이 있겠으나 모두가 治療를 實施함에 있어서는 漫然하게 할 것이 아니라 現症의 豫後에 對한 判斷을 決定짓지 않으면 안될 것이다. 適切한 治療 處置와 아울러서 畜主에 對한 指導와 飼養管理 等에도 注意가 必要하며 適當한 運動, 使役日光浴等을 行하는 것도 좋을 것이며 皮膚, 被毛, 四肢의 손질, 또한 畜舍의 清潔乾燥等에 對한 指導를 하여 줌으로써 患畜의 榮養을 良好하게 하여주고 健康을 增進시켜 주는 일도 治療效果를 順調롭게 하여주는 意味에서 大端히 重要한 일이라 하겠다.

### 1. 治療의 計劃

治療를 實施함에 있어서는 一定한 計劃 밑에서 症狀의 經過를 觀察하면서 治療를 進行하여야 되며 그 處置의 良否判斷이 내려지기도 前에 治療法을 함부로 變更하는 일이 없어야 될 것이다.

無計劃의 으로 또한 治療를 덮어놓고 자주 反復하거나, 또는 各種의 藥品을 함부로 亂用한다는 것은 病部位를 오히려 過度하게 刺戟하게 되며 治癒機轉을 混亂케 하는 結果 밖에 되지 않을 것이다. 大部分의 畜主에 있어서는 症狀이 어느 程度輕快해지고 또한 發情도 있게될 것 같으면 그 疾病이 아직 完全하게 治療되지 못하고 있는데도 不拘하고 함부로 交尾 또는 人工授精을 시키는

일이 종종 있다고 본다. 그러나 子宮內膜炎 같은 경우일 때 交尾 또는 精液注入 等에 刺戟은 恢復期에 들어가고 있는 子宮을 다시 惡化시키는 結果가 될 것이며 이제까지의 治療도 無効로 만들게 될 것이다. 따라서 治療가 繼續되고 있는 期間中에는 萬一에 發情이 있다 하여도 絶對로 交尾를 시켜서는 안된다는 點을 畜主에게 잘 說明하여 줄 必要가 있다고 본다.

最近 우리나라에서도 家畜에 對하여 卵胞흘물이라든가 黃體흘물, 또는 前葉性흘물, 또는 H.C.G. (Human chorionic Gonadotropin), P.M.S (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) 또는 其他의 흘물劑가 應用되고 있으며 좋은 效果도 보고는 있는 形便인것 같으나 흘물劑를 應用함에 있어서는 各흘물劑에 對한 性質과 作用을 잘 理解하고 理論에 맞는 使用法을 適用하여야 될 줄 안다. 漫然하게 使用한다는 것은 適切한 效果를期待하기는 困難하겠だ. 흘물劑의 選定, 投與時期, 用量과 使用回數, 間隔等은 效果에 對하여甚한 差異를 나타내게 될 것이다. 過剩하게 使用할 때는 오히려 逆效果를 나타내게 되며 各種의 异常과 障碍를 招來하게 될 것이다. 또한 生殖生理에 關한 基礎的知識의 不足은 흘물治療에 있어서 失敗의 한 原因이 될 것이다.

### 3. 治癒의 判定

疾病의 症狀이 消退되고 機能이 恢復될 때는一般的으로 疾病이 治癒된 것으로 볼 수 있으나 不妊症의 治療와 處置의 目的是 交尾 또는 人工授精으로서 受胎시키는데 있으며 나아가서는 流產되지 않고서 正常的인 仔畜을 分娩시키므로서 비로서 完全한 治癒로 볼 수 있을 것이다.

<筆者=서울農業大學醫學科·教授>

발(축)전  
강남가축병원  
경기도 강화군 공수의사  
원장 유인용  
경기도 강화군 길상면 온수리 510