


닭의 기생충병 도해 (5)

(닭의 각종 외부기생충의 발육환과 억제)

김 영 섭

(서울농업대학 교수)



I. 닭진드기

이 진드기는 야간에 닭으로부터 흡혈하며 산란은 계사의 판자 사이, 축축하고 불결한 장소이며, 알은 약 2일이면 부화된다. 산란계에서는 산란율이 떨어진다.

II. 닭벼룩

닭의 육수, 뺨, 눈 주위에 기생되며 알은 피양이 생긴 곳에 산란한다.

III. 닭몸이

닭 전신에 기생되며 특히 병아리에 피해가 크다.

IV. 큰닭몸이

닭다리 비늘 속에서 기생하며 염증을 일으킨다. 소위 석회각(石灰脚)의 원인이 된다(V).

VI. 깃털진드기

닭 깃털의 경(莖) 속에 들어가 기생하므로 탈우증(脫羽症)을 일으킨다. 이 진드기는 우모(羽毛)를 먹는 나쁜 습관(식우증)이 있다. 날개의 큰 우모는 떨어진다.

VII. 닭 날개이

닭 날개에 기생되며, 날개의 작은 깃털가지에 알을 낳는다.

(구제법은 「가금의 내외부 기생충 구충」을 참고하시기 바랍니다)