

전 강 상 담 실

담당의사 박 인 규
 <한국기생충박멸협회 부설의원>

특차 여러분의 많은 이용을 바랍니다. 기생충질환 예방 및 치료에 관한 문의 이외에도 일반질환에 대한 문의도 환영합니다. 의료계 권위자와 상담하여 지도해 드리겠습니다.

<문의> 선처하실런지 가슴조이면서 이런 부탁을 드려봅니다.

유아에서 부터 성년까지 어린이에 대한 각종 “예방접종” 시기, 약명, 등등을 실어 주셨으면 합니다. (전북 정읍군 최 귀연)

<진료> 출생에서 부터 성인에 이르기까지의 기간에서도 그 사망율이 가장 높은 시기인 영유아기 특히 신생아의 보건의 중요함으로 출생후 1세까지는 매월 한번씩 2세까지는 3개월에 한번씩 6세까지는 6개월에 한번 정도로 보건소나 병원에서 건강상담을 받아야 하며 상담시에는 전신진찰과 여러가지 검사를 하여 발육상태 영양상태를 관찰지도하고 각종 이상과 질병을 조기에 발견하고 각자에 필요한 예방접종을 실시하여야 하겠습니다.

※ <어린이 예방 접종>

예방약명	전염병명	접종 시기	주 의 사 항	비 고
E.C.G	결핵	제 1 : 기생후 1개월 이내 추가 6세	접종중에 환자가 있을 경우에는 생후 1주내에 B.C.G 접종을 한다. 만일 그 접종을 할려면 반드시 튜벨크린 반응을 실시해야한다.	튜벨크린 반응 검사 결과 : - : B.C.G 접종 + : X-ray 촬영
Small pox	천연두	제 1기 : 생후 6 개월 제 2기 : 6세 제 3기 : 12세	중두 접종후 2주 경과 해도 반응이 없으면 재접종해야 한다.	
D.P.T	디프테리아 백일해 파상풍	1회 : 2개월 2회 : 3 " 3회 : 4 " 추가 : 3세	1개월 간격으로 0.5cc씩 3회 접종해야 한다. 만일 1회 혹은 2회 접종한 다음 증지한다면 하등 효과가 없다.	열이 있거나 신체상의 이상이 있으면 피하도록 한다.
Sabin vaccine	소아마비	1회 : 생후 2-10개월 2회 : 6주후	I, II, III형 혼합 백신을 소정량 경구 투여한다.	Salk vaccine 접종후에도 투여 할 수 있다