

# 家畜의 秋季 飼養管理 要点 (10~12月)

登 錄 部

## 1. 一般事項

날씨가 선선, 상쾌하여 家畜飼養에는 알맞은 때라 하겠다.

하지만 晝夜別 氣溫의 差가 심해지고 給與 粗飼料의 質이 低下됨으로써 應分의 對策이 講究되어야 한다.

또한 서서히 닦아서는 겨울철의 飼養에 對處 畜舍施設, 農機構, 草地 等 補完, 點檢이 있어야 하겠으며 營養均衡과 健康維持를 爲한 飼料對策이 隨伴되어야 하겠다.

## 2. 韓牛, 肉牛, 乳牛.

放牧이 中止되며 乾草와 Silage의 給與를 點增시키며 粗飼料 質低下에 依한 營養은 農厚사료로 補充해준다.

食慾 旺盛에 依한 過肥는 農厚飼料 조절과 계획성있는 運動으로 避해야 하며 이슬, 맑은 풀이나 低質, 變質된 乾草는 食체와 高糖증의 原因이 되니 먹이지 않도록 注意해야 한다.

牧草地의 풀베기는 10月 中旬까지는 完了해야 하고 地力保存과 越冬對策으로 糞, 카리를 적당량 施肥해준다.

라이그라스, 청예호밀등 畜裏作 作物은 늦어도 10月 下旬까지는 播種을 完了하고 冬害防止를 爲하여 깊은 排水路는 설치해 두어야 한다.

特記하고 싶은 것은 農家副産物의 最大限 利用이라 하겠다.

고구마, 糠類를 利用한 薯糠飼料의 製造, 고구마 넝쿨, 호박, 콩각지 기타 무배추 잎의 殘物 利用은 여름철 青刈飼料 對用으로 훌륭한 多汁飼料라 하겠다.

11月 들어오면서 부터는 放寒設備를 해야 한다.

畜舍內 溫度는 12~15℃라 適溫으로서 이의 維持, 保存도 重要하지만 適當한 換氣와 함께 셋바람(맞바람)의 流入을 막아주어야 한다.

適當한 運動과 皮膚 손질은 牛舍의 청결, 適溫維持만큼이나 重要하다.

갈짚은 正期的이고 規則的으로 갈아주어야 하는바 牛舍內의 濕氣를 除去시켜주고 또한 찬바다으로 부터의 斷熱作用도 있어 環境에의 安樂感을 갖게 한다.

飼料給餌의 變化는 서서히 順序的으로 하고 過肥를 避하고 加급적 多汁飼料를 確保, 給與에 充實하고 安樂한 畜舍環境 造成은 물론, 대낮의 따뜻한 햇빛 밑에서의 運動과 皮膚손질로 추위에 對한 低抗力을 길러두어야 한다.

12月 들어서면서 부터는 營養補給에 各별한 關心을 써야 한다.

특히 비타민 및 패분, 골분은 不足함이 없도록 充分量을 給與해야 하는바 腐蹄病 予防과 産後 여러가지 疾病 予防에 絶대적인 原因이 된다.

## 3. 돼지

食慾 旺盛에 依한 過肥는 絶對 금물이다.

妊娠 末期에는 適正量의 營養 補強이 必要하며 哺乳豚의 경우 不良豚은 早期離乳를 實施, 健康회복을 도운다.

子豚의 경우 生後 2週경에는 補助飼料를 給與하고 子豚下痢에 對處해두어야 한다.

子豚의 加溫과 生後 45日以上, 12~15kg의 體重時 離乳를 斷行하고 離乳後 어미飼料는 절반정도로 減量, 給與한다.

갈짚, 녹사료, 패분, 골분, 給與은 以上과 같고 12月 들어서서는 10% 增의 農厚飼料 給與와 了豚舍의 20℃ 維持도 있어서는 안된다.

自	登錄의 意味 .....	1	高能力牛紹介 .....	3
次	家畜의 秋季飼養管理 要点 .....	2	協會 消息 .....	5