

이60
후歲

老人 98% 가 胃炎 : 唯一 한 診斷法 은 組織 生 檢

위대시령전자를
한다면 노령총
의 약 80%가 위대
영통을 가진
것으로 추측되며 X-선전자까지
할경우 국면의
거의 20%가 만성
위염증이란다.
이와같이 만성위염은 아주많은
사람에게서 발견되며 때문에 위
병의 밖에가깝고 위와 장폐의 3
분의 1을 넘어리라는
추측이다.

그豫防과 治療對策 어떻게 해야하나

내시경의 소견에 따라 표충성의 염증, 위축성 위염 및 비후성 위염으로 분류된다. 여기에서 병리 조직학적 으로는 비후성 위염과 신경 위절화로 분류한다.

표충성 위염은 위 절막의 표면이 만연히 평평화가 있는 것을 말한다. 또 비후성 위염은 위의 절막이 부터 움직이는 것, 위축성 위염은 반응성이 있는 위 절막이 떨어지는 것을 말한다.

이들의 특색인 표충성 위염의 전형은 위 절막이 박상으로 빨갛게 변하고 부종상이며, 특히 절약이 부족되어 있다는 것이다. 비후성 위염의 전형은 밸브로 저항력이 충강하여 부드러운 타입을 갖는다. 아 좋은 듯한 구획적인 모양(凹弓)을 나타낸다. 위축성 위염은 위선이 저절로 떨어져 절막이 떨어지고 보기 흥한 빛깔로 변색되기도 있다.

그리고 대체로 절막 하여 가는 절막이나 보세관과 같이 허자하게 투시되어 보인다.

즉 암의 두 가지는 열증이 비교적 가볍고 열증이 절약에 만족하지 않아 정되어거나 절약이 비후하게 되어 있다. 이때는 위의 작용도 함께 진되어 있는 상태이며 위의 분비기가 많기 때문에 과산성 위액이 다른

王症狀은 트림·구토時신맛의 쪽은 냄새가 特徵的
우선 絶食, 관장등 實施하여 腸內容物제거시켜야
노년층 胃內視검사하면 80%가 胃에 炎症 갖고 있어
가장 重要한原因是 食事시간不規則서起因한 不攝生

진 우점의『만성질환증후群』를
그래서 급성위염을 외치하지
하고 방치한다거나 그에 되
이되면 만성위염으로 끌어간다.
사실 그러한 예가 많아 있다.
노년층에 비교적 많아 이만
위염인 워치 워치 증후군에서
이 진단이 확실하게 되면 더욱
위생검사에서 확진된다. 이 때
진행이 설해지면 X-선에서도
독이 가능하게 된다. 그러나 일상
적으로 X-선 투시 소견은 정부
으로 나오게 되는 경우가 대부분
이다.

가벼운것은 식이요법과 적절
내복약으로 비교적 쉽게 낫지만
우해가는 것은 2~3년부터 5
이상, 어떤 경우에는 10년 이상
가는 경우가 있다. 그래서 이런
우왕천히 위장병 노이로제가
기도 한다. 이런 사람들은 병
도 여러곳을 찾아다니기도 일반
으로 X-선 소견상 정상이기
문에 그대마다 「당신의 위장
X-선상 정상으로 절차 신경
에서 온것이니 아무걱정말고
드러운 죽이나 며고 신경성
장출에 대한 치료나 밟으시면
게 될것입니다」라는 말을 들
고 작이라고 한다.

- ◇.... 위염은 대단히 흔한 질환이네....◇
- ◇....보고된 바에 의하면 소아기에는....◇
- ◇....28%정도로부터 60세이후의 노인....◇
- ◇....에게는 거의 98%까지 달한다고....◇
- ◇....한다. 위염은 보통 특별한 증상....◇
- ◇....이 없으며 따라서 임상적의의는....◇
- ◇....대부분 합병증이 출혈, 종양, 소스....◇
- ◇....화 및 영양장애가 있을때에 존재....◇
- ◇....한다. 원인은 환자에 따라서 분....◇
- ◇....명한 경우도 있으나 많은사람에....◇

- ◇···· 있어서는 그원인이 규명되어 있어····◇
- ◇····지 않다. 이위염은 위절박에 국한····◇
- ◇····되어 있어서 X-선검사로는 발····◇
- ◇····견되지 않는다. 위경검사단독으로····◇
- ◇····도 급성위염이나 위축성 위염은····◇
- ◇····확진할수있으나 믿을수있는 유일····◇
- ◇····한 진단법은 조직생검에 의한방····◇
- ◇····법이다. 위염은 일반적으로 급성····◇
- ◇····위염과 만성위염으로 분류한다. ·····◇

고
불리다.
후자는 **별종이** 삼성부회 오금
이 점마다 그 아래조직이 위를
덮은 상태가 되었으나 이 **점우회**
의작을 통해 면통이 양하고 유통이
분비도 감소하여 저산 **면통**
산상태가 되기 때문에 저산상우로
이라고 불리기도 한다.

① 병원균이 부착되었는 음식물을 (부적식품 침성독)이나 독물 (**毒物**)에 의해서 일어나는 **증상**을 **급성위염**이라 한다. 이 경우의 증세는 장에 미치게 되어 끈 급성장염까지 유발시킬 수도 있다.


成人의 胃腸疾患

<1>

장에 미처계되면 설사 복불을이어 으킨다. 이러한 경우를 군성위자연이라고 말하고 있다.

로운
국방부에
위험한
장이었
습니다.

80년은 세계 금연의 해



동일의약공업(주)

TEL) 445) 3141・447) 3101~2