

Vinyl House 栽培者에 대한 “House 病”的 實態調查

(第一報)

馬山殿療院

緒論

Vinly House 栽培의 營農方法이 우리나라에
普及된 것은 約 15年前인 1967年度頃이며 現在
는 많은 農家에서 Vinyl House 栽培를 하고 있
는 實情이다.

Vinly House 栽培時期는 農閑期인 11月에서 부터 다음해 4月까지 設置栽培하고 있으며, Vinyl House 는 겨울철 栽培用이기 때문에 外部溫度와 内部溫度의 差가 激甚하고 Vinyl House 内部는 高溫이며 濕氣가 많고 換氣가 잘 되지 않고 또 内部가 狹少해서 作業하는 姿勢가 많은 疲勞를 招來하기 때문에 Vinyl House 栽培者들의 健康上危害를 주는 問題點이 若起되고 있는 實情이다.

最近 日本 農村醫學會에서 報告된 바에 의하면 多年間 Vinyl House 栽培를 한 農夫들에 있어서 여러가지 自覺症狀을 呼訴하는 農民을 對象으로 調査한 結果 Vinyl House 를 栽培하므로서 發生하는 여러가지 症狀들을 總括해서 “하우스病”이라 命名報告한 바 있다.

調查對象 與 方法

1. 調查對象

우리나라에서 가장 Vinyl House 栽培를 많이

하고 있는 慶南 金海郡 一帶(鴨洛面斗 大渚面)을 調査對象地域으로 選定하였으며 對象者는 總 150名으로서 男子 63名(42%) 女子 87名이었다.

2. 調查方法

設問과 間診에 의해서 實施하였으며 그 内容은 다음과 같다.

表 1. Vinyl House 栽培期間

年數 区分	1~ 5年						10年 以上		計
	6〃	7〃	8〃	9〃	10〃				
人員	81	12	9	13	3	29	3	150	
%	54	8	6	9	2	19	2	100%	

表 2. 栽培作物의 種類

區分	種類				計
	蔬菜類	果實類	茎	計	
人員	99	45	6	150	
%	66	30	4	100%	

表 3 作業時間(1回)

區分	時間	回数別の割合				計	
		1時間	2回	3回	4回		
人 員		16	50	38	30	16	150
%		11	34	25	20	10	100%

表 4 出入回數(1日)

區分	回數	1回	2回	3回	4回	5回以上	計
	人員	1	30	53	41	25	150
比率	0.7	20	35	27.3	17	100%	

表 5. 農藥撒布回數(1個月)

回數 區分	1回	2〃	3〃	4〃	4回以上	計
人員	10	19	41	57	23	150
比率	7	13	27	38	15	100%

表 6. 農藥撒布時 “마스크” 着用與否

着用與否 區分	着用한다	着用안한다	計
人員	43	107	150
比率	29	71	100%

表 7. 農藥撒布後 沐浴與否

沐浴與否 區分	沐浴을한다	沐浴을안한다	計
人員	29	121	150
比率	19	81	100%

表 8. 農藥撒布後 出入時間

時間 區分	1 時間 経過後	2 時間 〃	3 時間 〃	4 時間 〃	計
人員	59	22	42	27	150
比率	39	15	28	18	100%

表 9. 自覺症狀

症狀 區分	發汗	腰痛	眩氣症	頭痛	몸이 무겁다	呼吸困難	驅吐
人員	147	138	129	124	121	117	67
比率	98	92	86	83	81	78	44

* 症狀別 人員數는 重複됨.

表 10. 이려한 症狀은 해를 거듭할수록

느낌 degree 區分	심해진다	언제나 같다	차츰나온 것같다	計
人員	81	61	8	150
比率	54	41	5	100%

表 11. 症狀을 느낄때는 어떤 措置를 취하는지?

措置 內容 區分	病院에 간다	약을사 먹는다	집에서 쉰다	계속일 한다	計
人員	1	51	57	41	150
比率	1	34	38	27	100%

表 12. 作業後 Vinyl House 内에서 休息與否

休息 與否 區分	땀을 닦고 쉬 었다	즉시 나온다	計
人員	26	124	150
比率	17	83	100%

表 13. Vinyl House 內部溫度

時間 溫度	AM9~12時	PM12~3時	PM3 ~6時
溫度	19°~23°C	30°~32°C	23°~24°C

結論

1. Vinyl House 栽培者들의 呼訴하는 自覺症狀은 頭痛・腰痛・眩氣症・몸이 무겁다. 감기에 잘 걸린다. 呼吸困難, 肩部通. 땀이 많이 난다는 것이다,

2. 이려한 症狀이 생기는 原因은 :

① Vinyl House 內部가 덥고 습기가 많기 때문.
② 換氣가 잘 되지 않는 Vinyl House 內部에서의 農藥撒布와 狹少한 House 內部에서의 作業姿勢가 疲勞를 招來하기 때문에이라 생각되며,

3. Vinyl House 栽培者は 休息을 取해야 할 農閑期에 勞動을 하기 때문에 오는 過勞도 이러한 症狀을 誘發하는 重要한 原因이 된다고 생각된다.

4. 이러한 症狀들의 發生을 最大限으로 줄이기 위해서는 農藥撒布後에는 充分한 換氣를 시켜서 內部에 殘留農藥이 完全히 散어진 다음 들어가서 作業도록 한다.

5. 冬節期에는 House 內部와 外部에 溫度差가甚해서 作業後 外部로 나올 때는 補助室에서 10~15分間 休息을 取하여 外氣溫度에 充分히 通應을 시킨後에 나오도록 한다.

6. Vinyl House 를 보다 大型化하고 換氣窓을 可及的 많이 設置토록 해야 되며

7. 이러한 自覺症狀을 느낄 때는 不必要한 投藥보다 充分한 安定과 4~5l/min 의 酸素供給만으로도 이러한 症狀을相當히 輕減(또는 解消) 시킬 수 있었다는 것을 報告한다.