


진정제 왕국기 사용에 따른 문제점

- 진정제 사용에 따른 문제점
- Chloral hydrate 사용에 따른 문제점
- 수면제 사용에 따른 문제점
- chloridiazepoxide 사용에 따른 문제점
- benzodiazepine 사용에 따른 문제점
- sedative-hypnotic 사용에 따른 문제점



김광일 漢陽醫大교수·醫博

의존성 예방위해 가능한 限 소량을 짧은기간동안부득이할때만사용해야

의존성의 위험성

진정제를 장기간 사용할 경우 의존성이 생길 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다.

의존성의 예방

의존성을 예방하기 위해서는 가능한 한 소량을 짧은 기간 동안만 사용해야 한다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다.

진정제 장기使用하게 되면 의존성·금단증상에대응이 커

진정제를 장기간 사용하면 의존성이 생기고, 금단증상이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다.

진정제 장기使用하게 되면 의존성·금단증상에대응이 커

진정제를 장기간 사용하면 의존성이 생기고, 금단증상이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다. 의존성이 생기면 약을 끊을 때 심각한 부작용이 발생할 수 있다.

진정제 왕국기 사용에 따른 문제점

진정제 사용에 따른 문제점은 다양하다. Chloral hydrate, 수면제, chloridiazepoxide, benzodiazepine, sedative-hypnotic 등 다양한 약물이 사용되면서 발생하는 문제점을 살펴본다.

본지에서는 진정제 사용에 따른 문제점을 다룬다. 의존성, 금단증상, 부작용 등 다양한 문제를 다룬다. 의존성, 금단증상, 부작용 등 다양한 문제를 다룬다.