


冠狀動脈硬化性心臟疾患 狹心症과 心筋梗塞症의 予防·治療

成人病중에서도 癌·腦卒中·心筋梗塞症등이
가장 높은 死亡率을 보이는 世界적인問題疾患

○... 冠狀動脈의 粥樣硬化은 成人의 死亡原因의 第一位를 차지하고 있다. 미국의 경우 1970년 사망자의 25%가 이 질환으로 인한 것이며, 1975년에는 30%로 증가하였다. 일본의 경우 1970년 사망자의 20%가 이 질환으로 인한 것이며, 1975년에는 35%로 증가하였다. 미국의 경우 1970년 사망자의 25%가 이 질환으로 인한 것이며, 1975년에는 30%로 증가하였다. 일본의 경우 1970년 사망자의 20%가 이 질환으로 인한 것이며, 1975년에는 35%로 증가하였다.

나날이 증가하는 추세에 있는 성인병
과거 20년간, 癌, 腦卒中, 心筋梗塞症은 成人病의 三大 疾病으로 인정되어 왔으며, 그 死亡率은 成人病의 3/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.



柳 東 俊
慶熙醫大교수·醫博
成人病예방협회公報理事

動脈硬化症
動脈硬化은 動脈의 管腔이 좁아지고, 動脈의 壁이 두꺼워지고, 動脈의 彈力性이 감소하는 것을 말한다. 이 질환은 冠狀動脈, 腦動脈, 腎動脈 등에 발생하며, 그 결과로 冠狀動脈硬化性心臟疾患, 腦卒中, 腎臟病 등이 발생한다.

心筋梗塞
心筋梗塞은 冠狀動脈의 粥樣硬化에 의해 冠狀動脈의 管腔이 좁아져서, 心筋에 血液의 공급이 부족하여 발생하는 질환이다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

40세 이상 死亡原因중 35% 차지
40세 이상의 成人病 死亡原因中 35%가 心筋梗塞에 의한 것으로 알려져 있다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

狹心症은 冠狀動脈의 硬化性病變으로

心筋에 공급하는 血行지장으로 心筋의 貧血을 초래

冠狀動脈硬化性(心筋) 疾患
冠狀動脈硬化性(心筋) 疾患은 冠狀動脈의 粥樣硬化에 의해 冠狀動脈의 管腔이 좁아져서, 心筋에 血液의 공급이 부족하여 발생하는 질환이다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

狭心症

冠狀動脈의 粥樣硬化에 의해 冠狀動脈의 管腔이 좁아져서, 心筋에 血液의 공급이 부족하여 발생하는 질환이다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

心筋梗塞症


冠狀動脈의 粥樣硬化에 의해 冠狀動脈의 管腔이 좁아져서, 心筋에 血液의 공급이 부족하여 발생하는 질환이다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

冠狀動脈의 粥樣硬化에 의해 冠狀動脈의 管腔이 좁아져서, 心筋에 血液의 공급이 부족하여 발생하는 질환이다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

冠狀動脈의 粥樣硬化에 의해 冠狀動脈의 管腔이 좁아져서, 心筋에 血液의 공급이 부족하여 발생하는 질환이다. 이 질환은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다. 이 중 心筋梗塞症은 成人病의 1/4에 달하는 것으로 알려져 있다.

*콜레스테롤(過脂肪) 經減劑의 出現으로 成人病治療의 革新을 맞이했습니다!

다량의 지방분을 섭취하면 혈액 내에 과량의 지방(콜레스테롤)이 축적되어 점차로 혈관벽에 침착되어서, 고혈압, 동맥경화, 관부전증, 심근경색증, 협심증 등의 성인병을 유발하게 됩니다. 리파놀캡슐은 콜레스테롤을 경감제로서 상기 질환의 근본적인 치료는 물론, 예방약으로서 구미각국에서 크게 각광을 받고 있는 신약입니다.



과지방혈증·동맥경화증 치료제
리파놀 캡슐
푸로세토펴 제제

효능·효과
● 단순지방장해: 과콜레스테롤혈증, 과트리글리세라이드혈증, 혼합 과지방혈증
● 과지방혈증을 수반한 동맥경화증의 증후군: 노혈관 부전증, 협심증, 심근경색, 협심증, 동맥성고혈압, 말초혈관 질환.
● 과지방혈증을 수반한 당뇨병의 백관장해.

용법·용량
대인 1회 1캡슐 1일 3회 식후 복용함. 투중증인 경우에는 1일 5캡슐을 복용함. (값 60캡슐 16,500원)

태극약품
서울특별시 도봉구 창동 681
TEL : 992-1336-1337

이 약은 약사에게 진료받고 의사에게