











<p>①</p> 	<p>②</p> <p>모돈이 임신후</p> <ul style="list-style-type: none"> • 109 일째 분만사료이동 • 112-116일째 - 1.8kg/일 • 분만일 - 1.0 " • " 1일후 - 1.8 " • " 2 " - 2.0 " • " 3 " - 2.2 " • " 4 " - 2.4 " 	<p>③</p> 
<p>태어난 자돈의 30%는 분만후 첫4일 이내에 죽는다. 모돈을 잘관리하면 15%까지 줄일수있다.</p>	<p>사료급여는 분만 2일전부터 분만후4일 4이카 제일 중요하다.</p>	<p>새끼 돼지는 대략 20분간격으로 태어나야 정상이다. 만약 1시간이상소요되면 이상이 있다.</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>분만돈은 최종새끼돼지출산후3시간 이내에 완전정결상태를유지해야 한다. 자궁염의 원인이 된다.</p>	<p>분만후 하루에 2번이상 모돈의 유두상태를 점검하라. 단단하게 열어나면 유두출혈이다.</p>	<p>자궁염이나 유두에 이러한 이상이 있으면 수의사의 자사에 따라 옥시토신이나 페니실린을 투여하라.</p>
<p>⑦</p> 	<p>⑧</p> 	<p>⑨</p>  <p>철분급여돈 철분결핍돈</p>
<p>새끼 돼지는 초유를 반드시 먹여야 한다. 이것은 새끼 돼지의 저항력을 키워준다.</p>	<p>분만당일, 배짖음소독하고, 송곳니를 자르고, 필요하면 꼬리도 잘라준다.</p>	<p>첫 2일간 유량이 부족시 철분을 급여해야 한다. 부족시 철이 거칠고 설사를하여 죽게된다.</p>
<p>⑩</p> 	<p>⑪</p> 	<p>⑫</p> <p>그러나,</p> 
<p>모돈으로부터 떨어져 있을때 모돈이 중요하다. 첫4일간 28°C-30°C 유지</p>	<p>사료는 하루에 2회 모돈에게 급여하여 신선한 사료를 주고 급수는 항상 맑은 상태로 주어야함</p>	<p>모돈은 너무덥지않도록 주의해야 한다 (17°C). 너무더우면 사료를 먹지않거나, 변비게될된다.</p>