

캡  
페  
인  
精神障礙 환자가 늘고 있다  
— 어떻게 관리하면 좋을까 —

◆…는 것으로 본다. 어떤 심리적인자가 신체적 장애를 일으키거나 또는 이미 존재하고 있던…◆  
◆…신체적 장애를 악화시키는 경우를 말한다. 이때 일어나는 신체장애는 기능장애나 또는…◆  
◆…더 나아가서 기질적 장애까지 일으키는 경우도 있다. 이전에는 몇몇군의 질환에 국한…◆  
◆…하여 정신신체장애라는 용어를 사용하여 왔으나 최근 모든 질환에 대해 심리적…◆  
◆…사회적, 생물학적 요소와의 관계를 지칭하는 정신신체장애의 용어를 불리는 것이 잘못된…◆  
◆…것은 아니라는 견해이다. 여기서는 흔히 얘기하는 성인병질환 중 소화성궤양, 과민성대…◆  
◆…장군, 궤양성대장염, 당뇨병, 본태성 고혈압에 대해 정신신체 의학적 측면에서 논의하려…◆  
◆…한다.

치료할 땐 心理·社會的 인면 고려해야

스트레스와 환경 조절 필요  
교육症狀學의 인치료效果

### 소화성궤양

소화성궤양은 위장관계에서도 정신신체장애 중에서 가장 흔한 질환으로 위궤양과 십이지장궤양을 함께 일컫는다. 이중 특히 십이지장궤양이 감정요소와 밀접한 관계가 있다고 한다. 십이지장궤양의 가장 뚜렷한 증상은 심외부에 국한되어 있는 통통이며 이는 대체로 식사하고 1시간내지 3시간후에 통통이 일어나며 음식을 섭취하거나 알카리를 섭취하면 통통이 완화되고, 이 통통은 흔히 밥늦게 심하게 일어나며 주기적으로 호흡과 악화를 되풀이하는 만성경과를 밟게 되는 것이다. 최근 식생활의 변화, 정신적 스트레스의 증대 등으로 십이지장궤양이 상당히 증가하는 경향을 보이고 있다. 이 질환에 대한 연구로서 정신생리학적, 생리학적 연구, 정신분석학적 연구 등으로 규명하려고 시도하였지만 아직 논란의 여지가 되고 있는 실정이다.

일반적으로 십이지장궤양의 생기는 기전은 심리적 원인과 신체적 원인이 모두 작용한다는 것인데 흔히 유전적 요소, 대인 관계에서의 만성적 갈등, 사회적 스트레스를 말하고 있다.

정신역동학적 인면을 보면 구강적 욕구조절에 기인하는 끊

### 對人관계에서 만성적 갈등과 사회적 스트레스解消를

일없는 사랑과 보호욕에 대한 소아적 추구이며, 성인의 의존 심에 대한 갈등이 특징이라하겠다.

이들의 성격유형은 무의식적인 의존적 욕구를 과잉보상하여 매우 적극적이고 애심적인 성격, 수동적이고 의존적이며 비활동적인 성격, 그리고 의존적인 욕구를 무분별한 행동화로 나타내는 성격형 등으로 구분할 수 있겠다.

치료적인 면에서는 일차적으로 내과적 치료가 선행되어야 하지만, 무의식적 심리적 갈등이나 성격상의 적응 문제 등을 해결하기 위해 정신치료를 병용함으로써 정도로 재발이나 악화를 방지해 줄 수가 있다.

과민성대장증후군 증후군

장증후군, 경련성 대장염, 점

소화성궤양은 無意識的 심리갈등과 性格上 적응위해 精神치료 병용  
과민성大腸증후군은 신경질 히스테리 神經쇠약 不安등이 特徵

궤양성大腸炎은 苦痛완화후 自我능력보호와 지지적인 精神치료  
당뇨병은 식이요법과 인슐린, 항우울제 투여하면 糖尿감소효과

액성 대장염, 신경성 설사 등과 같이 여러 가지 병명으로 불리워진 이 질환은 설사와 변비가 교대로 나타나거나, 설사와 복부경련이 보이며 때로는 대량의 점액이 묻어나오고, 아주 가는 대변을 보이기도 한다. 성별을 보면 여자가 남자보다 2배가량 많고, 연령으로 볼 때 20세와 60세에 걸쳐 분포되어 있고, 특히 남자는 50대에 몰려 있고, 여자는 30세와 60세사이에 고루 분포 되어 있다. 발생은 갑자기 발병하는 경우도 있고, 또 서서히 발병하면서 만성적이고 재발하는 경과를 밟기도 한다. 서양통계로는 위장장애를 호소하면서 내과를 찾는 사람들의 20%내지 50%가 이 증후군이라고 보고한다. 우리나라로 요즈음 상당히 증가하는 추세가 분명하다.

이 증후군의 원인 및 생리학적인 면에 대해 이해가 불충분한 실정이나 심리적 요소와 밀접한 관계가 있다는 추론이다. 이들의 심리적 특징은 신경질적 히스테리적, 신경증적, 건강염려증적, 신경쇠약증적 불안 또는 우울증적 특징 등을 보인다. 또한 증상의 시작이나 악화는 대체적으로 심리적으로 부담스런 뚜렷한 생활변화와 관련이 있다. 정신역동학적 개념에서 보면 증후군의 변비증은 고집이라는 심리뿐 아니라, 능동적이고 단호한 결심이라는 심리와 관계가 있고, 설사는 공격적인 충동과 무능하고 무력한 심리상태와 관계가 있다는 것이다.

치료로서는 환자의 고통을 잘 이해하고 환자와 함께 그 고

통을 해결해 나가려는 마음자세가 되어있음을 주지하고 확신시키는 것이 급선무다. 즉 병력뿐만 아니라 집안환경, 성장과정, 인간관계 등 즉 심리적, 사회적인 면으로 환자를 이해해야겠다. 또한 불안과 우울정서가 농후할 때, 항불안약물 및 항우울제약물이 효과를 보는 경우도 있다. 요약하면 교육 (education), 증상학적 치료 (symptom management), 스트레스 및 환경조절 (stress & environmental management), 이 필요로 하겠다.

### 궤양성 대장염

대장의 점막과 점막하조직을 침범하는 병으로 점막울혈과 발성점산출혈이 있고 나서 궤양이 일어나게 된다. 처음 나타나는 증상은 배변 후에 선혈이나 오며, 나중에는 배변이 잦아지고 또 둑어지며 좀 더 많은 점액과 혈액이 섞여 나오게 된다. 또한 경련성 복통이 수반되기도 한다.

발병은 대개 30대와 50대가 제일 많고, 여성은 남성보다 약간 많고, 도시인과 경제, 사회적 지위가 높을수록 많다고 보고되고 있다. 병리생리학적 기전에 대해서 여러 가지 요소들이 연구되고 있으나 아직도 논란의 대상이 되고 있다.

기족력이 있어 유전적 요소가 있음이 추정되고, 또한 정신적 인요소가 증상을 유발 또는 악화시킨다는 것이다. 즉 중요한 인물과의 사별, 이별, 배신 등이나 그위협, 신체나 지위의 손상이나 자신의 능력에 벽찬부

담 그리고 실망감 등이 관계된다.

즉 적절한 감정반응이 미숙하고, 양가적인 대인관계도 진실한 관계를 이루어지지 못하고, 억압된 적개감이나 상실 등에 우울반응이 일어나고, 이후 우울증은 대장의 점막과 점막하조직의 출혈장애까지 일으키게 된다. 이 궤양성 대장염 환자의 인격특성을 보면 대다수가 강박적 성격기반에, 점서면에서는 지나친 억제, 지나친 도덕관 그리고 우유부단들과 같은 성격특징을 보인다. 치료는 우선 내과적으로 환자의 고통을 완화시키면서 정신파적으로는 환자의 약한 자아 능력을 보호하여 적절한 치료관계를 이루는 지지적인 정신치료가 효과적이라 하겠다.

### 成人病 질환 중심으로

精神  
的  
の  
心  
理  
的  
な  
疾  
患  
の  
中  
心  
に  
よ  
る



(사진은 記事 특정 사실과 관련없음)



郭 東 日

〈고려醫大〉  
神經精神科 교수

도를 하는 경우도 있어 조심스러게 관찰해야 한다. 따라서 내과적 치료에 만전을 기할 뿐 아니라 정신파적 치료도 동시에 해주어야 할 것이다.

### 본태성 고혈압

혈압의 상승은 특정 질환이나 포도당대사장애이며, 실명, 만성 신부전증, 말초성 및 자율신경계의 신경질환, 뇌졸증, 심근경색증, 말초혈관장애 등의 많은 합병증을 갖는 질환이라 하겠다. 완벽하게 체계화된 연구는 없지만, 심리적 사회적 요소가 이 질환을 촉발시키거나, 악화시키는 중요한 역할을 한다는 점이다.

이를테면 정상군과 비교해 보면 당뇨병 환자군이 가족구성원의 상실에 대한 기왕력이 더 높다는 사실, 또한 주요 생활 사건이 이질환을 촉발시킨다는 연구 보고들이 있다. 또한 감정적 문제는 직접적으로 keton 치의 생성이나 인슐린의 농도를 증가시키는 등의 생리적 변화로 케톤 (keton) 증이나 당뇨성 혼수 그리고 저혈당 등을 유발하여 뇌손상 등을 가져오며, 간접적으로 신경의 변화로 적절한 치료를 거부하는 일이다.

즉 당뇨병에 대한 감정적인 영향에 대한 많은 학자들의 연구 결과를 보면 당뇨병의 발병은 대상상실과 비통 및 우울증과 같은 심리적 부담스러운 생활경험과 밀접한 관계가 있다는 것이다.

이 당뇨병 환자들의 성격적 특성은 아직도 확실히 규명되지 못한 실정에 있다. 당뇨병의 치료는 우선 식이요법과 인슐린 치료를 철저히 하여야 하고, 우울증이 있는 당뇨병 환자는 항우울제로 치료하면 당뇨가 감소한다. 또한 자살기 바람직 하겠다.

때로 심한 불안이나 긴장감 우울증이 수반될 경우 정운제 및 항우울제를 동시에 투여하는 것이 바람직 하겠다.