

【서 론】 정서장애란 어떤기간 우울하  
◆…거나, 들뜨는 기분의 장애가 주로 나  
◆…타나는 일련의 정신장애로서 저조한기  
◆…분이 있는 상태를 조증이라고한다. 여  
◆…기서 우울이란 자신의 내적인 요인에  
◆…의해 지배되는 감정반응이며, 흔히 어  
◆…떤 대상의 상실시 나타나는 슬픔과는  
◆…그 뜻을 달리한다. 정서장애의 기록은  
◆…「히포크라테스」가 우울증과 조증으로  
◆…구별하여 의학적으로 기술하였고 1851  
◆…년 프랑스 정신과 의학자 Falret 와  
◆…Baillarger 에 의해 우울증과 조증은  
◆…한 사람에게서 상호교대로 나타날 수  
◆…있다는 사실이 확인되었고, 1899년 독

일의 Kraepelin 이 조울증이라 병명…◆  
하였다. 1959년 Leonhard 가 처음으…◆  
로 조울증을 주기적으로 우울증만 나…◆  
타나는 단극성 우울증과, 주기적으로 우…◆  
울증과, 조증이 교대되는 양극성 우울…◆  
증의 두 가지를 시사한 바 있으며 이 두…◆  
형태는 유전학적 특징, 병전인격, 생화학…◆  
적 소견, 생리학적 요인, 그리고 약물학적 특…◆  
성이 전혀 다르다는 사실이 밝혀지고…◆  
있다. 예전에는 조울병과 구분하여 경…◆  
년기 우울증을 정서장애에 포함시켰으…◆  
나 점차 경년기 우울증을 단극성 우…◆  
울증에 포함시키는 경향이 있으며 최근…◆  
근의 진단기준에서는 그 병명이 삭제됐다.◆

타나고 끊임없이 자살과 죽음을  
생각하고 피해망상이 생기는 수도 있다. 머리회전이 잘  
안된다고 호소하는 사람도 있다. 가끔 짜증애는 환자보다  
는 짜증이 자주 일어나기도 한다. 행동도 둔해지고 동작이 없  
고, 외부 자극에 반응이 없는 경우다.

고적 현실적인 내용의 경우가 많다. 드물게 환자이 있을 수 있으나 대개는 짜증이며, 과대망상과 일치하고 있다. 심하면 홍분되어 짜증과 더불어 선망상태도 나타난다. 지나친 의욕, 행동과다가 특징이다. 종종 일을 저질러 형사 사건을 일으

캡  
페  
인精神障礙症 환자가 늘고 있다  
— 어떻게 관리하면 좋은가 —

기도 한다. 성욕이 활진되기도 해서 방탕해지는 수가 많다.

## 경과 및 예후

대체로 주기성을 띠고 나타나는 것이 특징이지만 환자의 4분의 1은 평생에 한번만 발병하고 있다. 이 경우 우울증으

로 나타나는 것이 통례이고, 증상이 실하면 산후 또는 신체적 질환과 병행해서 나타나는 경우가 많다. 사춘기와 중년기에 한번씩 발병하는 수도 있으나 대부분 4년내지 10년의 전강한 시기를 가지면서 발병한다. 다른 종류의 정신병에 비해 예후가 좋다. 환자의 4/5는 일단 완전히 회복되고, 만성화의 경과를 막는 경우는 1/10정도이다. 자주 발병이 반복되는 경우에도 지능, 정서, 짜증의 변화가 거의 없고, 인격의 외래를 가져오는 경우는 극히 드물다.

## 치료대책

언제나 자살의 가능성을 염두에 두고 자살의 방지와 신체적 치약을 치료해주는 것이 급선무이다. 될수있는 한 따뜻하면서도 진지하게 해주고자 상한 설명이 필요하다. 항우울제로 치료해준다.

조증기의 치료목표는 조증증상으로 인한 자신과 가족 그리고 사회의 피해를 방지하기 위해 입원치료를 요한다. 부드럽고 설득력 있게 대하여, 약물은 Lithium salt 가 기본적이다. 이 경우도 정신치료는 무의미하다. 단지 치료관계 협상을 위한 정신치료적인 의사의 태도가 중요하다고 본다.



廷圭月

<梨花醫大>  
神經精神科 교수

## 분류 및 원인

가장 최근의 미국 진단 기준인 DSM-III에서는 정서장애를 크게 세가지로 나누고 있다. 첫째 주요 정동장애로서 이 것은 다시 양극성 장애와 주요 우울증이고 두번째가 기타 특수 정동장애, 세번째가 비전형 정동장애이다. 정신분열증의 경우와 마찬가지로 주요 정동장애의 근본적인 원인을 아직은 충분히 밝혀내지 못하고 있다. 지금까지 논의되고 있는 생리학적, 생화학적, 혹은 심인성 원인들은 때때로 원인인지 결과인지 분명치 않을 때가 있고, 설명 밝혀진 경우라도, 모호해서 곤란을 야기하는 수도 있다. 양극성 우울은 X-link 된 우성유전, 단극성 우울에는 그런 양상을 볼 수 없다는 연구가 있으나 확실한 결과가 아니므로 단정지울 수는 없다. 최근에는 생화학적 유전학이 대두되어 우울증에서는 뇌의 Catecholamine의 양이 적어지고 조증에서는 증가된다는 보고가 있다.

심리적 요인으로, 정신분석학에서 지적하는 우울증의 요인은 모든 외부의 가치를 내향시키는 기재로 설명된다. 즉 우

## 情緒장애환자

조울증

우울기

自殺 가능 성 열두에 두고 治療 대책을  
따뜻하게 진지하게 說明 해줘야  
설득력 있게 대하고 藥劑로  
리튬 投與

조증기  
설득력 있게 대하고  
리튬 投與

가정에서는 폭군으로, 직장에선 안하무인격  
자기 마음대로하고 화를 잘내며 能力과 대평가하나 結論 없어

울증의 어린시절은 성인의 가치를 내향시켜 자기의 것으로 만들어나가는 것이고 그것이 잘 안될 때 죄책감이 생김과 동시에 책임감이 강한 강박성 성격이 된다. 강박성 성격에 일어나는 죄책감, 그것이 곧 우울증에 대한 보상성 반응으로 이해된다.

## 증상(症狀)

주요 정동장애의 증상은 크게 우울상태와 조증상태로 나누어 설명하는 것이 편리하다. 우울하고 저조된 우울증상 정서상태가 주축이 되어 일어나는 일련의 정신증상으로 우울상태만이 간헐적으로 나타나는 경우도 있고 조증과 상조 교대로 나타나는 경우도 있다. 초기에는 정서적 공감이 없어지고 현실감이 소실되며 기분이 좋지 않고 일상일에 관심이 없어지고 생기가 없고 자신이 어딘가 예전과는 다른 목식 같은 사람으로 느껴진다. 진행되면 무표정하고 희망이 없다. 침체된 기분이고 평소 침던 일도 어렵게 느껴지고 자신감이 없다. 아침에 더욱 심하고 저녁이면 가벼워진다. 좀더 심해지면 무능력감, 열등의식, 절망감, 허무감이 생기고 삶의 의미를 상실하고 그결과 자살의욕과 자살기도가 생긴다. 사고장애로 건강 열려증이 심해지면 신체망상, 빈곤망상, 허무망상 등이 나

된다. 자살은 회복기에 가장 위험한 징후이다. 우울증에서의 신체증상은 표면에 잘 드러나는 것이어서 병원을 찾는 중요한 이유가 되기도 한다. 식욕부진, 변비, 소화불량, 체중감소, 피로, 불면증이 있고 그밖에 두통, 권태감, 압박감, 월경불순, 성욕감퇴 등이 있다.

조증상태는 우울증과는 정반대로 둘 뜨고 유쾌하고 자신만만한 기분을 주축으로 하는 정신활동의 변화를 말하며 우울증보다는 그립도가 적다. 대개 환자 자신에 의해 오는 것이 아니라 조증이 심해져서 야기되는 사업의 실패, 낭비, 경제파탄 등으로 주위 사람에 의해 병원에 오는 경우가 많다. 초기에는 평소보다 소명랑해진 것 같은 인상을 받지만 점차 활동량이 많아지고 가정에서는 폭군으로 군림 직장에서는 안하무인격이고 자기 뜻대로 하고, 화를 잘 내고, 늘 자신감에 차 있고 자신의 능력을 과대평가하고 자존심이 커지며 거만한 사람이 된다. 사고의 흐름이 빠르고, 말도 빨라지고 결론이 없다. 과대관념, 과대망상이 특징인데 자신이 지위가 높아질 것이라는 확신을 갖는다. 피해망상이 있기도 하나 정신분열증에서처럼 비논리적인 경우는 아니고 비



휴대용 혈당측정기는 환자 및 일반인이 병원에 가는 번거로움이 없이 가정, 직장 및 여행 중 본인 스스로 혈당치를 측정하고 당뇨병을 치료하는데 필요한 소형 혈당측정기입니다.

## 특징 :

- 한방울의 혈액(血液)으로 측정(測定) 됩니다.
- 측정범위 : 0~1,000mg/dl  
물로 닦을 필요가 없음
- 날짜, 회수, 혈당치가 동시 100회까지 기억 재생됨
- 검사 비용이 적게 들고, 간편한 휴대가 됩니다.
- 검사 시험지(Strip)을 냉장고 보관이 아닌 실온 보관으로 변질될 우려가 없음.

제조원 : DIC Kyoto DAIICHI

판매원 : 정우양행

서울시중구충무로 3가 24-14 (경북빌딩 101호)

전화 : 276-0277

276-0278

## ※ 당뇨신문

“소망” 구독을

원하시는 분은

아래 주소로

연락바랍니다.

보내실 곳 : “대한당뇨협회”

서울시중구충무로 3가 24-14

경북빌딩 101호

TEL : 265-9822