

## 東洋醫學과 獸醫針醫學 (13)

徐 斗 錫\*

### 3. 豬의 疾病別 針治療

豚에 발생하는 疾病中에서 몇 종류의 疾病을 지적하여 經穴의 適應症과 針治療의 方法을 記述한다.

1) 交尾慾을 상실한 牡豚：百會와 開風에 毫針을 사용해서 刺針한다.

2) 肛門脫：交巢에 刺針하고 置針하여 脱肛部位를 整復한 즉시 蓮花를 火針으로 上下, 左右 4 개소를 2~5mm의 깊이로 速刺針한다.

3) 發情異常으로 인한 不妊症：百會와 開風에 毫針 또는 円利針을 刺針하고 左右로 15회씩 捻轉(回轉)하고 약 10분간 置針한다.

4) 감기：山根, 太陽, 血印, 尾尖 등을 主穴로 선정하고 大椎, 蘇氣, 百會, 涌泉, 適水 등을 補助穴로 선정하여 毫針 또는 円利針을 사용해서 刺針한다.

5) 热射病과 日射病：天門, 血印, 太陽, 山根, 尾尖 등을 主穴로 선정하고 大椎, 涌泉, 適水, 尾本 등을 補助穴로 선정해서 寬針을 刺針하고 濕血한다.

6) 消化不良：六脈, 脾俞, 玉堂, 鼻梁 등을 主穴로 선정하고 山根, 血印, 尾幹, 尾尖 등을 補助穴로 선정하여 毫針 또는 円利針을 사용해서 刺針한다.

7) 乳房炎：陽明, 帶脈, 斷血, 海門 등을 主穴로 선정하고 涌泉, 適水, 尾尖 등을 小寬針을

사용해서 濕血한다.

8) 仔豚白痢：交巢, 足三里, 百會, 玉堂, 血印 등을 主穴로 선정한 다음에 山根, 大椎, 蘇氣, 尾尖 등을 補助穴로 선정하고 円利針 또는 毫針을 사용해서 刺針한다. 百會는 退針한 직후에 灸를 施術한다.

9) 胃腸炎：百會, 斷血, 六脈 등을 主穴로 선정하고 山根과 血印을 補助穴로 선정하여 毫針 또는 円利針을 사용해서 刺針한다.

10) 下痢：足三里(后三里), 六脈, 百會, 交巢 등을 主穴로 선정하고 玉堂, 血印, 曲尺 등을 補助穴로 선정하여 毫針 또는 円利針을 사용해서 刺針하는데 交巢는 退針직후에 灸를 施術한다.

11) 產後起立不能：三台, 蘇氣, 腎門, 百會 등을 主穴로 선정하고 寸子, 追風, 涌泉, 適水, 耳根 등을 補助穴로 선정하여 毫針 또는 円利針을 사용해서 刺針하는데 主穴은 退針 직후에 灸를 施術한다.

12) 不妊症, 子宮弛緩, 卵巢囊腫, 傳染性 胃腸炎：雁翅와 百會 그리고 交巢에 電針治療法을 施術한다.

### 4. 豬의 主要經穴別 主要疾病的 針治療

主要 經穴別의 經穴位置와 刺針 및 灸의 方法 그리고 經穴別 適應症을 다음과 같이 도표로 記述한다.

\* 全南大學校 農科大學 獸醫學科

돼지의 主要經穴別 針治療方法 및 主要適應症

No.	經穴名	經穴의 위치	刺針方法	適應症
1	天門	兩耳의 後部를 直線으로 연결시킨 假想線의 中央點 임. 1穴임.	円利針 또는 毫針을 斜下方 으 로 1.0~1.5cm 刺針하거나 火針 을 施術함.	眩氣病, 腦充血, 간질病 痙攣.
2	血印	兩耳尖部의 背側에 있는 靜脈 위 임. 左右 각각 1穴임.	耳靜脈을 怒張시키고 寬針으로 靜 脈에 刺針하여 鴻血함.	熱射病, 日射病, 감기, 急性肺炎, 熱性疾病, 飼 料中毒, 下痢.
3	耳尖	兩耳의 尖端部임. 左右 각각 1穴임.	耳根部를 강하게 압박하여 耳尖 부를 充血시키고 寬針 또는 三稜 針을 耳尖端部에 刺針하여 鴻血함.	熱性疾病, 急性飼料中毒, Shock.
4	卡耳	兩耳背側中央의 耳靜脈 内側에서 血管이 없는 部位임. 左右 각각 1穴임.	耳靜脈이 없는 부위에서 寬針을 耳軟骨에 刺入하여 皮下織을 分 離하고 空洞을 만든 다음에 그空 洞内에 刺戟性藥液을 注入함.	감기, 炎症性疾病, 熱性 疾病, 円毒症, 喘息.
5	太陽	外眼角 後方의 凹部임. 左右 각각 1穴임.	眼의 後方을 마찰하여 靜脈을 怒 張시킨 다음에 寬針을 45° 각도 로 0.5cm 刺針하고 鴻血함.	結膜炎, 腦炎, 감기, 熱 性疾病.
6	晴明 (晴靈)	內眼角 下方의 凹部임. 左右 각 각 1穴임.	마찰하여 靜脈을 怒張시킨 다음 에 圓利針 또는 毫針을 外眼側 에 向해서 0.5~1.0cm 刺針하고 鴻血함.	감기, 結膜炎.
7	山根	鼻背側과 털이 난 부위와의 경계 부에 있는 凹部의 正中線部位임. 1穴임.	寬針으로 速刺針하여 鴻血함.	眩氣症, 腹痛, 腦充血, 顏面痙攣, 顏面筋炎, 热 射病, 消化不良, 기침.
8	人中	鼻尖端部임. 1穴임.	三稜針 또는 圓利針으로 0.5~ 1.0cm 刺針하여 少量鴻血함.	Shock
9	鼻梁	兩鼻孔과 正中線이 交叉하는 부 위임. 1穴임.	위와 같음.	急性鼻炎, 감기, 食慾不 振, 熱性疾病, Shock.
10	玉堂	口腔硬口蓋의 第2,3口蓋皺壁 正 中線에서 左右 1cm부위임. 左右 각각 1穴임.	開口器를 사용해서 開口하여 硬 口蓋皺壁을 充血시킨 다음에 硬 口蓋皺壁의 穗起部를 寬針으로 0.5 ~1.0cm 斜刺針해서 鴻血한 즉시 食鹽으로 마찰함.	口內炎, 消化不良, 胃腸 炎, 肺炎, 肺充血, 熱性 疾病.
11	鎮口	兩側口角 後方의 1.5cm 부위임. 左右 각각 1穴임.	口角後方의 凹부 左右 2개소를 圓利針을 사용하여 水平으로 1.0 ~1.5cm 刺針한다. 毫針을 사용해 도 좋음.	頰部의 肿脹, 顏面 神經 麻痺, 牙關緊急.
12	牙關	兩口角의 後方에서 下頏의 最後 臼齒가 있는 부위, 즉 口角後方 의 咬筋前緣의 凹部임.	圓利針을 斜後方으로 1.0~1.5cm 刺針하거나 毫針을 사용해서 刺 針함. 灸를 施術하기도 함.	顏面神經麻痺, 牙關緊急, 耳下腺腫, 頰部의 肿脹.

No.	經穴名	經穴의 위치	刺針方法	適應症
13	耳根	耳根部下方의 凹부위 즉 耳根部의 後下方에 있는 凹部인데 耳를 前後로 움직이면 잘 나타난다. 左右 각각 1穴임.	円利針 또는 毫針을 사용하여 斜下向으로 0.6~1.0cm 刺針함.	감기, 热性疾病, 우울증, 日射病, 热射病.
14	鎮喉	第一氣管輪의 兩側 凹부위 즉 氣管正下方에서 第一氣管輪의 兩側 凹부임. 左右 각각 1穴임.	毫針 또는 圓利針을 사용하여 水平으로 1.5~2.0cm 刺針함.	咽喉炎, 咽喉頭麻痺.
15	七星 (曲尺)	前肢의 腕關節後 内側에 작은 黑點이 5~7개 있는데 그의 正中部 임. 左右 각각 1穴임.	前肢를 잡아올린 다음에 毫針 또는 圓利針을 사용하여 0.6~0.9cm 刺針함.	飼料中毒, 筋炎, 腕關節腫脹 및 疼痛.
16	寸子	各肢의 副蹄의 약간 上부의 凹部 즉 四肢副蹄의 약간 上方인 第一指(趾)骨 後方에 있는 凹부임. 四肢에 각각 1穴임.	各肢를 개별적으로 잡아 올리고 寬針을 사용해서 0.9~1.5cm 刺針하여 少量 鴻血함.	全身의 筋炎, 四肢 關節捻轉, 球節炎, 蹄葉炎.
17	湧泉	蹄冠의 上부에 있는 凹部에서 血管이 있는 부위임 (前肢에 있음). 左右 前肢에 각각 1穴임.	寬針 또는 三稜針을 刺針하여 鴻血함.	前肢球節炎, 蹄葉炎, 飼料中毒, 热射病, 強心解熱을 目的함.
18	滴水	後肢의 蹄冠上部에 있는 凹部에서 血管이 있는 부위임. 左右 後肢에 각각 1穴임.	위와 같음.	後肢球節炎, 蹄葉炎, 飼料中毒, 热射病, 強心解熱을 目的함.
19	苦子 (八字)	四肢蹄冠 兩側方의 蹄와 皮膚와의 경계부 즉 蹄冠과 皮膚와의 경계부위에서 血管이 있는 부위임. 四肢에 각각 1穴임.	四肢를 개별적으로 잡아 올리고 寬針을 사용해서 0.5cm정도 刺針하여 少量 鴻血함.	四肢筋炎, 關節捻挫 (四肢), 热射病, 감기, 飼料中毒, 四肢의 疼痛性疾患.
20	後三里 (足三里)	膝蓋骨 後下方의 凹部 즉 長腓骨筋溝의 위에서 胫骨과 腓骨 小突起와의 사이에 있는 下方의 凹부임. 左右 각각 1穴임.	円利針 또는 毫針으로 内側에 向하여 1.0~1.5cm 깊이로 刺針하거나 3~5분간의 灸를 施術함.	消化不良, 腹痛, 下痢, 後肢筋의 炎症性疾患.
21	追風	飛節前內方에 있는 凹부임. 左右 각각 1穴임.	円利針 또는 毫針을 水平으로 0.5~0.8cm 刺針하거나 小寬針을 刺針하여 鴻血함.	後肢關節炎, 胃腸炎.
22	大椎	第7頸椎 棘狀突起와 第1胸棘狀突起와의 사이에 있는 凹부임. 1穴임.	毫針 또는 圓利針을 垂直으로 1.8~4.5cm 刺針하거나 火針 또는 灸를 施術함.	감기, 胃脹炎, 간질病, 鼻炎, 鼻出血, 肺炎.
23	三台	第2,3胸椎 棘狀突起의 사이에 있는 凹부임. 1穴임.	위와 같음.	前肢筋炎, 前肢挫傷.
24	身柱	第3,4胸椎 棘狀突起사이에서 正中線上의 凹부임. 1穴임.	위와 같음.	腦炎, 감기, 氣管支炎.

No.	經穴名	經穴의 위치	刺針方法	適應症
25	蘇氣	第4,5胸椎棘狀突起사이에서 正中線上의 凹部에 1穴이 있고 肋骨을 後方으로부터 세어서 第7,9肋間에서 背正中線으로부터 下方으로 左右 각각 13cm 부위에서 3穴씩 있음. 즉 正中線上의 1穴과 좌우 각각 3穴, 7穴임.	背部에 위치한 1穴은 白針을 前下方에 向하여 2.5cm 刺針하고 左右兩側에 위치한 6개의 經穴은 白針으로 內側에 向한 경사 각도로 1.5cm 刺針함.	肺炎, 喘息, 憎기, 心臟衰弱, 기침.
26	靈台	第5,6胸椎棘狀突起 사이에서 正中線上의 凹부임. 1穴임.	白針을 사용하여 前下方에 向해서 刺針함.	角甲部筋炎, 角甲神經痛, 角甲上神經麻痺.
27	六脈	腰椎橫突起의 水平線과 뒤로부터 세어서 1~3肋間이 交叉하는 부위임. 左右 각각 3穴임.	白針을 1.5~2.4cm 깊이로 內下方에 向해서 刺針함.	胃腸炎, 筋炎, 憎기, 변비.
28	斷血	最後 胸椎骨 棘狀突起와 第1腰椎棘狀突起와의 사이에 1穴이 있고 第1腰椎棘狀突起와 뒤로부터 세어서 第1,2胸椎棘狀突起의 사이의 正中線上의 凹부위에 1穴씩 있음. 3穴임.	白針을 垂直으로 1.5cm 刺針하거나 小寬針으로 1.5cm 刺針하여 鴻血함.	去勢後出血, 鼻出血, 血尿, 血便, 腹痛, 生殖器의 帶痛性疾患.
29	腎門	百會로부터 前方으로 세번째의 正中線上의 凹부임. 1穴임.	위와 같음.	腰部筋炎, 閉尿, 膀胱炎, 腎炎.
30	百會	第6腰椎棘狀突起와 第1仙椎棘狀突起와의 사이에 있는 凹部 즉 後軀十字部의 中央部임. 1穴임.	白針을 垂直으로 3.0cm 刺針하거나 5분간의 灸 또는 水針을 施術한다.	發情促進, 腰麻痺, 腰筋炎, 後肢運動障害, 泌尿生殖器系統疾患, 脱肛, 斷血과 配合하면 内部生殖器의 帶痛性疾患.
31	六眼	百會의 後方에서 第1,2,3仙椎棘狀突起가 있는 背正中線의 兩側으로 약 6cm 떨어진 부위임. 左右 각각 1穴임.	白針을 內下方으로 向하여 약 3cm 刺針함.	後軀 및 後肢筋炎, 腰神經痛, 腎炎, 膀胱炎.
32	開風	百會의 後方으로 두번째의 凹부 즉 百會와 尾根과의 中間部임. 1穴임.	白針을 垂直으로 0.9~1.5cm 刺針함.	胃脹炎, 泌尿生殖器系統疾患, 後肢筋炎.
33	膻中	胸骨下 正中線과 兩前肢와의 假想線上의 交叉點임. 1穴임.	白針을 前斜方으로 0.6~1.0cm 刺針하거나 灸를 3~5분간 施術함.	氣管支炎, 肺炎, 기침, 喘息.
34	海門	腋에서 兩側으로 3cm 떨어진 부위임. 左右 각각 1穴임.	白針을 內側으로 0.6~0.9cm 斜刺針함.	閉尿, 下腹部浮腫, 仔豚下痢.
35	陽明	最後 1,2對의 乳頭基部에서 外側方으로 1.5cm 떨어진 부위임. 左右 각각 2穴임.	白針을 內側에 向하여 0.6~0.9cm 斜刺針함.	乳房炎, 閉尿.

No.	經穴名	經穴의 위치	刺針方法	適應症
36	肺俞	右側 肋間을 뒤로부터 세어서 第6肋間의 右側 橫突起肋骨窩에서 下方 10.5cm부위, 즉 뒤로부터 세어서 第6肋間의 右側과 寬關節 과의 水平線이 交叉하는 부위임. 1穴임.	白針을 下方으로 向하여 2.4cm斜刺針하거나 灸를 3~5분간 施術함.	氣管支炎, 肺炎, 鼻炎, 喘息, 기침.
37	尾根	第4仙椎 棘狀突起와 第1尾椎棘狀突起와의 사이에 있는 正中線 上의 凹部임. 즉 꼬리를 잡아 흔들어서 움직이는 첫번째의 관절부위임. 1穴임.	白針을 前下斜方으로 0.7~1.5cm刺針함.	後軀筋炎, 감기, 消化不良, 便秘.
38	尾本	尾腹面의 尾起始部로부터 正中線 上에 1.5cm부위의 血管위임. 1穴임.	寬針을 血管에 速刺針하여 少量 鴻血함.	後軀筋炎, 热射病, 热性疾患, 腹痛.
39	尾尖	꼬리의 末端部임. 1穴임.	寬針을 刺針하고 十字形으로 切開하여 鴻血함.	감기, 筋炎, 斜料中毒, 腹痛, 腦充血, 肺炎, 食慾不振, 眩氣症, 热性疾患.
40	交巢	肛門上部의 上尾腹部의 凹部, 즉 꼬리를 불잡고 위로 올리면 肛門 위의 上尾根部에 凹이 형성된 부위임. 1穴임.	꼬리를 水平으로 잡아 당기고 꼬리와 水平으로 白針 또는 火針을 1.5~3.0cm 刺針함.	변비, 睡脹, 腸管疾患, 下痢.
41	蓮花	直腸과 肛門括約筋의 接續部임. 1穴임.	洗滌한 다음에 施術한다. 水腫이 있을 때는 刺針하여 放水하고 피사조직을 제거한다. 白針을 3.0 cm 깊이로 여러차례 刺針하고 植物性 油脂를 발라준다.	脱肛

※거리의 表示와 刺針의 길이 및 깊이는 中等體軀을 基準해서 表示하였음.

= 계속함(다음에는 개의 電針麻痺를 계재함) =