傘下支部動靜

慶北支部管下 록생회

86년 1월 31일 군위군 사무소장 (박원섭) 主管으로 月例록생회 개최 (中央本部 총무부장 참석)

• 분사무소와 중앙공판장 유대강화 및 신의증대 도모.

• 생약시세표의 정확성 강조

• 생약재수입에 대한 협조 요망.

忠北支部管下 록생회

86년 1월 31일 청주시사무소장 (우명규) 주관으로 定例會 召集 (中央本部會長 初途巡訪次 參席)

강원도支部管下 록생회

86년 2월 15일 철원군사무소장 (박영임) 주관으로 月例會召集 (中央本部 총무부장 참석)

• 영농새마을사업과 생약협회간의 유대협조강화

• 중앙회의 생약생산 농민을 위한 정책적 뒷받침 강조.

慶南支部管下 록생회

86년 2월 3일 自體 동 심회를 조직하고 첫번째 모임을 가졌다. (고성군 무소장 主管으로)

藥이 되는 꽃들

重藥=十藥(삼백초, 좁약, 어성초, 약모밀)

毒을 함뿟으로 모은다는 뜻에서 日語로 毒溜(도구다메)로 부른것이 語尾의 變化로 「도구다미」로 傳해지고 있다하며 莖葉을 乾燥한 것을 十藥 또는 重藥이라고 부르고 있다.

어느 옥이던 같은 것이며, 十藥이라고 한 것은 「말」이 病에 걸렸을 때 이를 使用하면 열가지 종류의 藥効가 있다고 하여 부르게 된 것이며 重藥이라고 한것은 그만큼 重要한 効果를 나타낸다는 뜻이라고 한다.

옛날로부터 有名한 民間藥으로서 아주 고약한 냄새가 나며 이成分이 制菌作用을 한다는 報告가 있었고 其用法을 化學的으로 첨부하게 되었다고 한다.

重藥의 생즙을 여드름, 慢性鼻炎, 축농증등의 환부에 하루 수회씩 바르게 되면 그 効果가 좋고, 면도 뒤의 피부상처, 구두로 인한 물집등에도 이 생즙을 바르고 딱딱한 처두면 매우 효과가 좋다고 한다.

꽃피는 계절에 莖葉을 채집하여 햇빛에 잘 말리면 냄새가 없어진다고 하며, 삶아서 脚氣病, 急性腎炎, 임신부의 부음, 動脈硬化의 豫防, 高血壓症, 胎毒에 依한 각종 부스럼등에 널리 쓰이고 있다고 한다.

또한 根莖은 데쳐서 먹기도 한다. 最近 三百草(重藥 또는 十藥)에 對한 栽培希望者가 늘고 있으며 乾材品에 對한 價格도 相當한 線에서 去來되고 있는 것도 이러한 연유에서 비롯된 것이라고 할 수 있겠다. 〈편집부〉

86 春季 播種을 爲한… 藥草種子·種苗·種根을

多數 確保하고 栽培 初心者들에게 需要希望者 및 時라도 來訪 및 書面 또는 電話 上으로 相談하여 주신다면 最善을 다하여 求得協調 및 栽培技術 便宜를 提供하겠아오니 많이 活用하여 주시기 바랍니다.

1986년 2월 15일

中央共販場 種苗部 白

生藥報 원고提出 要望

本報讀者여러분에게 보다 알차고 充實한 內容을 제보하기 위하여 다음과 같이 本報원고를 수집하오니 뜻있으신 分에게서는 많이 參與하여 주시기 바랍니다.

1、다 음

1、生藥材의 栽培 體驗記 ※特히 冊子등에 수록되어 있는 理論과 차이나는 點을 부록으로 특기하실것.

2、自然生에 對한 채집과 현황

※휘귀品種 특별기고환영.

3、野生하는 民間藥에 對한 紹介

4、生藥材의 取扱 過程이나 流通上의 문제點 및 유념할 事項.

5、其他 敎育、講習、會議등의 기록 및 사진등

사단법인 한국생약협회 사무국 白

고추·마늘 과잉생산 우려

농협 主産地단협 需給안정협의회 强化

농협은 고추·마늘·양파등 양념채소류가 연 2년간 비교적 값이 안정됐기 때문에 올해 재배면적이 급증할 것에 대비 전국 6백43개 주산지단협을 중심으로 연중 계속 수급안정협의회를 개최, 과잉생산 또는 흉수출하 대한 대책을수립, 시행키로 했다.

농협은 또 양파·마늘·고추등 86년산 양념채소류 값을 안정시키기 위해 전년 동기 대비 출하 및 수매사업을 펼치기로 했다. 농협은 올해 전체 양념류생산량의 22%에 달하는 17만5천t에 대하여는 협동출하반 중심의 공동출하를 적극 유도하고 19%수준인 15만1천t은 농협자체수매 및 정부비축수매사업을 적극 펼치기로 했다.

농협은 올해 생산 예상량의 41% 수준인 32만6천t에 대해 공동출하 및 수매사업을 펼치기로 했다.

'86 第2次 理事會 召集公告

根據=定款第14條에 의거 다음과 같이 第2次 理事會를 召集하오니 필히 參席하시기 바람.

〈다 음〉

1、日時=1986年 2月 27日 14時

2、場所=協會長室

3、議案=第17次(86年度)定期總會에 부의할 事項 審議 및 준비.

1986년 2월 15일

協會長 朴萬鍾

連載 栽培敎室

新規會員을 爲하여

제충국 (除蟲菊)

1、性 狀

유럽 原産의 여러해살이 풀이다. 키는 30~60cm로서 꽃줄기가 자란다. 꽃은 5~6월경 흰꽃의 頭狀花가 피며 잎은 어겨 붙고 잎 표면에는 綠色, 이면은 白綠色의 깃털로 갈라져 있으며 줄기와 잎에 잔털이 많이 있다. 밭 주위에 심으면 벌레의 피해가 적으며 花壇에서 觀賞하여도 좋고 초여름의 生花로서 즐길 수 있다.

○生藥名=除虫菊花

○成 分=Pyrethrin I、Pyrethrin II

○効 用=모기, 빈대 파리 등의 殺虫藥으로 쓰이며 農業用 殺虫劑로서 粉末 또는 石油乳劑로 하여 사용한다.

2、栽培法

1、栽培適地

따뜻하고 건조한 氣候를 좋아한다. 우리나라 氣候的 특징으로 보아 4~6월 사이가 비가 적고 乾燥期이므로 5~6월의 開花期에 안성맞춤의 天惠的 좋은 條件이라 하겠다.

특히 우리나라에있어서는 濟州道、全羅南北道、慶尙南北道 등지에서 재배하는 것이 유리하며, 中北部 地方에서는 耐寒性이 약해서 越冬時 얼어 죽는 것이 많다. 따라서 開花期가 늦어 中部地方에서는 개화시에 장마의 피해를 입기 쉽다. 土質은 排水가 잘 되는 適濕한 砂質壤土, 埴質壤土, 壤土, 壤土등에 적당하며 開墾地, 河川 및 강변의 砂質壤土에서도 생육이 잘 되지만 粘質土나 過濕하거나 가뭄을 타는 땅에서는 생육이 나쁘고 꽃의 收量, 品質이 좋지 않다.

2、採種 및 繁殖

除虫菊의 繁殖은 分株法과 播種으로 할 수 있는데 주로 씨뿌림에 의하여 번식하고 있다.

播種은 開花후 약 3주일 정도 지나서 할 수 있다. 보통 花梗이 따 노란빛이 된 것은 陰乾 調製한다. 播種한 種子는 긴 모꼴이 나쁘고 긴 네모꼴에 가까운 것이 發芽率이 좋다고 한다.

특히 파종할 포기는 生育初期에 窒素質肥料를 주고 花芽形成期에 들어서는 주로 칼리 및 인산질 肥料를 施用하므로써 충실한종자를 얻을 수 있다.

本圃 10a에 심을수 있는 育苗 種子量은약 1·8dl정도 소요되므로 건실한 것 한포기에서 약 0·4dl 내외의 採種을 할 수 있으니 10a 播種量을 얻으려면 여유있게 10포기 정도면 충분하다.

3、育苗 移植法

㉮播種期: 播種은 가을과 봄에 할수 있다. 일반적으로 가을에 파종하는 것이 좋고 봄에 발육이 잘되면 많은 收穫量을 얻을 수 있다. 따뜻한 하순경부터 11월 상순 사이에 파종할 수 있으나, 中部地方에서는 9월 하순 사이에 파종하려면 가을에 위 11월중 파종하여 年內에 발아되지 않도록 할 것이다.

經驗에 의하며 試驗圃場에서 자연히 種子가 떨어진 것도 年內에는 發芽되지 않고 다음 해 이른봄에 발아하는 것을 보았다.

㉯苗床準備 및 播種: 苗床의 위치에서 通風이 잘 되고 햇볕이 잘 쪼이는 東南向으로 排水가 잘 되고 適濕한 砂質壤土가 좋다. 苗床이 中等이하의 땅이라면 파종하기 전에 잘 썩은 堆肥, 깻묵, 過石, 人糞尿 등을 흙과 잘 섞어서 두었다가 2~3주일후에 120~150cm의 두둑을 짓고 흙을 잘 부수고 고른후 씨를 撒播로 뿌리거나 줄로 갈라 9~12cm 정도의 골을 치고 條播를 한다.

中部地方에서는 봄에 파종하려면 가을에 위와 같이 미리 밑거름을 주어 갈아 두었다가 越冬한 후 이른봄에 갈지 않고 그대로 두둑을 짓고 播種하면 發芽가 잘 된다.

파종한 다음 씨가 보이지 않을 정도로 흙을 얇게 덮고 가볍게 손질한 후 그 위에 짚을 덮어 준다.

苗床의 面積은 10a 當 假植으로 育苗할 때에는 0·06~0·1a (2~3평) 정도로하고, 育苗 후 본밭에 定植할 때에는 0·5a (15평) 내외의 育苗床이 필요하다.

苗床은 파종 후 2~3주일이 지나면 발아하는데 發芽狀態를 보아 덮었던 짚을 걷어주어 모가 3cm 정도자라면 제1차 가식할것이다. 가식은 1시간전에 床土에 충분한 灌水를 한 다음 뽑을때에 뿌리가 상하지 않게 하여 1·5cm 사방에 한 포기씩 심는다.

假植하지 않는 것은 6cm 사방으로 한 포기씩 남기고 솎아버린다. 假植할 때에는 바람이 불지 않고 흐린 날에 하는 것이 좋다.

수시로 가뭄에 풀을 뽑아주고 제2차 가식할 때에는 모의 키가 6cm 정도자랐을 때 이랑 사이 12~15cm, 포기 사이 9~12cm로 가식을 한다. 이때의 假植 苗床은 제1차 가식할 때와 같이 준비하고 假植床은 제1차 가식때와 같이 가식할 때에는 구름이 낀 날 苗床에 옮겨 심는다.

가식한 후에는 정식하기에 앞서 強健하게 길러야 하는데 모종의 移植 만약 移植前에 뽑을 때에는 速効性 肥料를 물에 묽게 타서 施用하면 좋다.

4、定植

본밭에 定植할 時期가 있다. 봄과 가을의 適期는 3월하순~4월 상·중순경이며 많은 收穫量을 얻을 수 있다.

播種은 開花후 약 3주일 정도 지나서 할 수 있다. 보통 花梗이 따 노란빛이 된 것은