連載 栽培教室

모(母)＝패(貝)

新規會員을 爲하여

○生藥名：貝母 Fritillariae Rhizoma
○效用：鎭咳, 祛痰, 排膿藥, 解熱, 肺結核, 金瘡, 冬痛등에 쓰인다.

1. 性狀

中國 原産의 多年生 草根草이다. 草長이 30~60cm 자라며 잎은 가늘고 길며 줄에 3~4잎이 돌려 붙어 있다. 4월에 줄기의 중간부분의 葉腋에서 炎黃綠色의 鐘狀의 꽃이 핀다. 짧은 꼬투리에는 납작하고 넓은 날개가 6개 있고 種子는 둥글다. 貝母의 鱗莖은 球形 또는 扁球形으로 직경이 1~3cm, 두께 1cm 내외의 肉質의 鱗片이 2개가 있으며 外面은 白色 또는 炎黃色의 白粉이 붙어 있으며 속은 炎黃色이다.

2. 品種

1. 貝母：Fritillaria verticillata Willd. var. Thunbergii Baker
産地：中國의 浙江, 江蘇, 日本에서는 藥用 또는 觀賞用으로 재배한다.
2. 浙貝母：Fritillaria verticillata Willd. var. Dnow.
異名：象貝, 大貝母
産地：浙江지방에 自生한다.
3. 川貝母：Fritillaria Roylei Hooker
異名：川貝
産地：西藏의 四川省 근처 지방에 난다.
4. 平貝母：Fritillaria Ussariensis Maximowicz
異名：平貝
産地：우리나라, 만주, 우스리
5. 其他：學名 不名의 西貝, 古貝등이 中國일대에 自生한다.


貝母

3. 栽培法

1. 栽培適地

貝母는 비교적 耐寒性이 강한 작물이지만 재배함에 있어서는 다소 건조한 氣候가 적당하며 아주 추운지방이 아니면 어느 곳에서나 재배할 수 있다.

土質은 表土가 깊고 물빠짐이 좋은 埴質壤土 또는 砂質壤土가 적당하다. 多濕한 밭에서는 鱗莖 生育이 안되고 病害를 입거나 썩기 쉽다.

한편 貝母의 栽植期 수확기가 다른 작물과의 間作관계가 좋고, 그리고 지상부의 경엽이 무성하게 자라지 않으므로 뽕밭이나 과수원등에 間作을 할 수 있다. 따라서 連作을 하여도 무방하지만 鱗莖의 收穫과 발육을 위해서 신선한 土壤에 가꾸는 것이 좋을 것이며 한번 재배한 밭에는 2~3년간 輪作하는 것이 좋다.

2. 繁殖

貝母의 번식은 주로 鱗莖으로 번식하지만 씨앗 또는 鱗片의 揷木 定植하게 된다. 苗床의 위치는 東南向으로서 햇볕과 바람이 잘 통하고 배수가 잘 되는 곳이 좋다.



씨 패모 심는 要領
A；씨 패모 B；두엄 C；과석 D；갯묵 E；겉흙 F；밭는 흙 G；두엄

㈎鱗莖繁殖：인경은 보통 6월 상순경에 수확하지만 거름의 種類, 氣候 狀態에 따라 캐는 시기가 다소 달라진다. 수확한 것은 大小로 선별하여 큰 것은 藥用으로 調製加工할 것이며 작은 것은 繁殖用으로 재식한다. 번식할 種貝母는 한개당 보통 2~3돈중되는 것이면 충분하다. 이러한 씨 패모는 본밭에 정식하고 작은 鱗莖은 苗床에서 기른다. 이 6~9cm 내외로 심는다. 더욱 작은 鱗莖은 12~15cm 간격으로 골을 치고 條播하듯이 드물게 (인경의 크기의 2~3배 간격으로) 뿌려 놓고 흙을 덮는다.

흙을 덮는 정도는 鱗莖크기의 3~4배이며 흙을 덮은 후 그 위에다 왕겨, 짚, 또는 퇴비 등을 덮어서 表土의 굳어짐과 지나친 乾燥를 막으며 防寒에도 도움이 된다.

심는 時期는 9월~10월중에 심을 수 있으나 따뜻한 지방은 늦게 심고, 추운 지방일수록 빨리 심는 것이 좋다.

肥培管理할 것은 별로 없으나 자라는 상태를 보아서 될 수 있으면 일찍 잘 썩은 人糞尿를 물에다 묽게 타서 수시로 줄 것이며 中耕除草를 할 것이다.

㈏鱗片揷木法：鱗莖의 크고 작은것을 막론하고 鍾貝母가 부족할때 번식할 목적으로 鱗片揷木하는 것이며 흔히 이른 봄에 휘취급에 따라서 鱗莖이 되었을 때꺾꽂이하는 것이다. 揷木床은 수량에 따라서 정하고 床土는 깨끗한 모래와 산기슭에 있는 黃土를 체에 쳐서 반씩 섞어서 揷床을 만든다. 揷土의 깊이는 12~15cm로 하여 그림과 같이 꽂는다. 꽂은 후에는 灌水를 충분히 하고 床土 表面에 짚을 깔아주고 햇볕을 가려주며 床土의 건조에 주의하면서 기상에 따라 서서히 揷土의 깊이를 얕게 하여 준다.



揷 木 法
1；가장 적당함. 2~5；생장에 우려가 됨.
A；인편 B；삽목 후 신구가 생김.
C；인편의삽목상태 D；삽목 후 새로운 개체.

㈐採種：채종하는데 技術이 필요하고 매우 힘든 일이라 하겠다. 채종을 할때에는 별도로 採種圃를 선정하고 生育環境을 人爲的으로 조절함으로써 소기의 채종을 할 수 있다.

채종포에 심는 時期와 肥培管理는 種貝母 재식 때와 같이 한다. 그러나 인산, 칼리 成分의 거름을 더 줄것이며 될 수 있으면 遲效性 肥料를 施用할것이다. 生育期間이 길어서 밑거름의 斷肥現象이 일어나지 않게하는 것이 좋다. 물론 越冬후 이른 봄에 웃거름을 줄 수 있지만 잘못하여 늦게서야 肥效가 나타나면 種子結實이 늦게 되고 그럼으로써 氣溫이 높아지고 특히 氣候的으로 乾燥期에 들어서 후적 乾燥期(旱魃이 심할 때)生育이 왕성할 때 가뭄으로 植物體가 衰弱하여 種子의 發芽率이 떨어지고 病害蟲의 發生이 많아지며 심한 경우에는 植物體가 枯死하는 수가 있다. 그러므로 기상상태를 보아 수시로 灌水하여 水分부족으로인한 生育旺盛에 지장이 없도록 힘써야 한다.

꽃은 밑에서 피기시작하여 점차로 위로계속해서 꽃봉오리가 생기는데 한포기에서 2~3개만 結實시키고나머지는 따버릴 것이다. 種子번식에 대하여는 추후에 發表할 것이다.

3. 定植

본밭은 굼벵이 등의 虫害를 방지하기 위하여 10a당 45kg 정도의 석회질소 또는 적당량의 B·H·C를 뿌리고 밭을 갈 것이다.



採種과 球根形成

貝母는 定植하면 2주일 내외로 뿌리가 뻗기 시작하여 다음해 이른 봄에 서리가 내리고 땅이 얼어있어도 싹이 자라며 解冬하면 왕성하게 발육하므로 肥料의 흡수이용이 가장 많은 시기이다. 그러므로 이때에 施肥할 때는 肥料의 濃度에 주의하여 물에다 묽게 타서 줄 것이며 施肥할 때까지 施肥量은 될 수 있으면 그 전면 撒布하거나 골을 깊이 치고 시비한 후 심는다.

심는 방법은 넓이 120~150cm의 두둑을 짓고 이랑 사이는 鱗莖의 크고 작은것에 따라 12~15cm 또는 21~24cm로 골을 깊이치고 밑거름을 준다음 그 위에 種貝母의 크기에 따라 6~9cm 간격으로 심는다. 포기 사이는 種貝母의 크기에 따라 차이가 있으나 6~9cm 부터 15~18cm로 할것이며 鱗莖은 될 수 있으면 싹나는 곳이 위로 되게 놓고 鱗莖크기의 3~4배 정도의 흙을 덮어 준다. 種貝母의 심는 양은 230~260kg 정도이다.

정식 時期는 9월상·중순경이며 추운 지방에서는 좀 일찍, 심고, 따뜻한 지방에서는 좀 늦게 심어도 좋다.

4. 肥培管理

㈎肥料：肥料의 種類는 두엄, 외양간 두엄(厩肥), 魚肥, 油粕類 따위 過石, 草木灰중에서 적당히 선택할 것이고 웃거름으로 人糞尿, 黃安을 施用하는것이 좋다.

3成分 중에서 窒素分은 많이 쓰이지만 인산, 칼리성분도 상당량을 併用할 것이다. 한편 구득하기 곤란한 거름만을 의존할 것이 아니라 自給肥料를 최대한도로 이용하는 것이 經濟的이다.

貝母는 가을 9월에 定植하면 겨울 안에 뿌리가 뻗으며 이른 봄에 싹이 튼다. 定植후에는 짚, 두엄, 잡초 등을 깔아주어 겨울의 寒害를 방지한다. 中耕除草를 할 것이며 꽃 따라서 수시로 꽃봉오리가 생기게 되면 채종할 것이외는 따버린다.

5. 收穫

定植한 다음해 5월 하순~6월중순 사이에 地上部의 莖葉이 黃色으로 변하면 곧 수확해야 한다.

適期에 캐지 않고 늦어서 캐면 鱗片이 분리되기 쉬워 조제하기에 불리하다. 수확할때 가장 세심한 주의가 필요하다. 특히 鱗莖이 상하지 않도록 하여야 하며 캐어흙을 털고 줄기는 버리고 대소로 구분하여 그 중에서 큰 것은 藥用으로 調製하고, 작은것은 繁殖用으로 할 것이다.

10a당 鱗莖의 수량은 대개 生根으로 400~800kg 정도이다.

〈3면으로 계속〉

【표1】 貝母의 施肥量 (10a당)

肥料種類	全量	밑거름	웃거름 1회(3月下旬)	웃거름 2회(4月中旬)	거름
두엄	800~1200 kg	800~1200 kg	kg	kg	
깻묵	200	200			
초목회	80			80	
인분	400		400		

비고：草木灰는 비오기 直前에 포기 밑에 뿌려주는 것이 좋다.

淨化特輯

◎고향을 가꿔가는 사람들 「續」

향토애착 불러일으킬 구실

서울에서 공부하는 제주출신 학생들의 「제주사회연구회」라는 모임은 비록 고향을 떠나 있지만 고향에 대한 관심으로 고향을 가꾸어 가고자 하는 노력들이 모여져 만들어졌다. 이들은 지난84년 〈제주사회〉라는 자료집을 펴냈다. 민족자원 및 자연풍광의 보고로, 또는 잠시동안의 휴식처로 인식되는 제주지만 제주도라는 지역 역시 그 주민들의 생존을 위하여 자연및 사회환경과 싸워 온 삶의 현장이다. 제주에서 태어난 이들은 지난60년대 이후 일련의 개발계획에 따라 외양적으로 놀랍게 변모해 온 고향 제주도가 안고 있는 문제점을 주목하고 내일의 고향을 위해 그 문제들의 근본을 분석하는 노력을 꾸준히 펴나가고자 한다.

『지난 20년 동안 제주도는 소득수준·교육수준·문화수준등 삶의 질적 면에서 비약적인 발전을 이루었다. 그 개발과정에서 실제 제주도민의 참여가 배제되고 있다는 문제의 근본적 소재를 밝히고, 제주도민이 해결해 가야할 문제들을 하나하나 풀어나가는 노력을 단편적으로나마 펴나가는 일 또한 필요한 과제다.』

제주사회연구회가 펴낸 자료집 서문에 밝힌 바대로 이들은 제주도 개발사를 정리하고 이로 인해 빚어진 주민생활 및 산업구조상의 여러 문제점을 보여주는 신문기사를 발췌, 편집했다. 그리고 그에 대한 도민과 여론의 반응에도 관심을 기울였다. 『자료상의 한계는 뚜렷하지만, 제주도민들이 고향에 대한 「무관심과 무지」에서 벗어나 향토에 대한 적극적인 관심과 애착을 불러일으킬 구실을 해 줄 것』을 회원들은 바라고 있다.

절실한 지방문화의 육성

그러나 고향을 가꾸어 나가는 구체적 작업은 고향에 살고 있는 사람들이 중심이 되는 「관심」이상의 것이 될 수 없다는 것이 이들의 공통된 생각이다. 자기가 뿌리내린 그곳에서부터 문제가 해결되어 나와야 하는 것이기 때문이다.

많은 젊은이들이 고향을 아끼는 마음을 갖고 있지만 고향의 실체가 보잘것없으면 그들은 고향으로 돌아갈 긍지를 갖고 터를 잡을 수 있는 터전으로서의 기반이 부족하기 때문이다.

사회경제적인 기반이 함께 쌓여가지 않으면 향토문화는 패배주의적인 자기인식의 결과로 배타적인 문화운동만을 싹 틔울 뿐이다. 『정치·경제는 불론 문화예술이 모두 대도시를 중심으로 하고 있어서 골 사람들은 그 혜택을 받지 못한다』는 한탄은 이제 차츰 사라져갈 조짐이다. 각 면마다, 각 군마다 자기 고장을 아끼고 가꾸는 사람들이 늘어가고 있다. 그러나 아무리 청빈한 학자라고 해도 자료와 연구자금의 뒷받침이 있어야 하듯이, 고향 땅을 일구겠다는 뚝심도 농정을 뒷받침하는 정책이 없이는 그 기운을 펼 수가 없다. 앞으로 2000년대를 이끌어 갈 젊은이들이 고향에 남아서도 낙오됐다는 느낌 없이 고향을 지킬 수 있도록, 또 고향을 떠나 있는 젊은이들이 긍지를 갖고 자신있게 고향으로 돌아갈 수 있도록 균형있는 지방문화의 육성에 더욱 박차를 가할 것을 기대해 본다.

가장 향토적인 것이 가장 민족적인 것이요 가장 민족적인 것이 가장 세계적인 것이라는 말대로 가장 토속적인 것의 올바른 전승 발전만이 국가를 살찌우고 발전시킬 수 있다는 인식이 우리 모두에게 절실하다. * 〈2000년 정화지에서 발췌〉