傘下 支部 動靜

▲忠南 道支部

지난 12月 1日 忠南支部 산하 緣生會에서는 文大珪 支部長 主管으로 86年度 마지막 定例會議를 召集코、期間中 生藥材 流通現況에 對한 相互정보 交流및 산하會員들의 친목과 유대를 더욱 공고히 한바있다。

한便 이번 會議를 계기로 道管下會員들의 權益保護를 強化하기 爲한 措置로서 녹생회會員組織을 과감히 再整備해 나갈 것이라고 한다。

故 尹福永 (아산군 사무소장) : 會員一同은 삼가 명복을 빕니다。

▲江原道 支部

지난 12月 14日 道支部緣生會에서는 原州市事務所長 황인구 主管으로 今年度 마지막 定期緣生會를 召集코 期間中 相互 情報交流및 會員유대를 더욱 돈독히 한바 있다。

이날 會議에서 임기만료된『신원일』會長이 물러나고『황인구』原州市所長이 次期會長으로 選出되어 向後 2年間 道관하緣生會를 병행 運營해 나갈 것이라고 한다。

▲釜山直轄市支部

지난 12月 10日 朴吉夫支部長 主管으로 86年度 마지막 月例 緣生會 開催。

전국地價 평균7.3% 上昇

점차 都·農 평준화 현상

市昇格 九里19·平澤18%로 큰幅앞질러

올한해동안 전국의 地價는 평균 7.3%올랐다。이는 지난해의 7%보다 0.3%가 더 높은 것이다。

22일 건설부가 발표한 지난 1년간 (85년 10월1일~86년10월1일) 전국의 地價동향에 따르면 中部圈개발계획에 영향을 받은 大川시가 27%로 가장많이 뛰었고 다음이 論山군 25.4%、公州시 23.3%등 순으로 오른 것으로 나타났다。

또한 올해 市로 승격된 首都圈내의 도시들도 지가가 많이 올라 九里가 18.9%、安山이 18.6%、平澤 17.7%씩 올라 전국의 지가상승률을 크게 앞질렀다。

반면에 개발혜택이 적은 木浦는 0.5%、麗水 0.7%、晋陽 1.2%、昌寧 1.3%、居昌 1.5%씩 각각 하락했다。

시도별 地價상승률은 忠南지역이 가장 높아 14.5%를 기록했고 京畿지역이 11.2%를 시현했는데 반해 서울은 3.7%、光州 4.5%、全北 4.3%、慶南 4.7%로 전국의 평균 지가상승률 보다 낮았다。

특히 서울의 경우는 지난해 지가상승률 8.1%보다 절반이하로 떨어졌고 忠北지역도 지난해의 17.2%에서 10.8%로、忠南지역은 16.1%에서 14.5%로 떨어져 전국의 지가가 점차 안정세를 보이고 있다。

올해의 특징은 도시와 농촌의 지가변동이 평준화 현상을 나타내기 시작한 점으로 대도시가 6.4%、중소도시 7.4%、농촌지역 7.8%의 비슷한 수준을 보였다。

전국의 지목별 가격동향을 보면 대지가 평균 6.8%、田이 7.4%、畓이 7.7% 등으로 비교적 안정된 상승률을 보였으나 임야는 8.3%를 기록、미개발토지의 상승률이 개발토지보다 앞서가는 것으로 나타났다。

86마무리 — 會費納付 完結當付

▲協會本部에서는 금년도 諸運營을 원활하게 마무리 짓기 위하여 現在까지 체납된 會費一切를 일괄 징수가 可能한 市·道支部에서는 支部長께서 其他는 分事務所에서 오는 12월30일까지 各己完納해 주실것을 당부하고 있아오니 어려운 點이 있으시더라도 支援協助해 주시기 바랍니다。 〈事務局〉

藥이 되는 꽃들

當歸

당귀란 말을 풀이하면……『當然히 돌아온다』는뜻이 되며 中國의 옛 이야기로는 아내가 婦人病에 오래 시달리다 보니 自然이 男便과 거리가 멀어짐에 ~ 여러모로 생각끝에 이 藥草를 服用하였던바 감쪽같이 病이 낳았다고 한다。『사랑하는 男便이 진정 아내곁으로 다시 돌아왔다』란 古事에서 當歸라고 이름 지어졌다고 한다。

日本의 當歸는 中國産과 品種이 약간 다르다고 하여 日當歸라고 하며 韓國産當歸는 土當歸라고 부르는 것이 通例로 되어있다。

乾燥한 뿌리를 漢方에서는 當歸라고 하며 婦人病에 主濟로서 鎭靜、鎭通、強壯등의 目的으로 使用하고 있고 또는 부은데 腎炎、치질、복통、우울증등에도 효렴이 있다。

民間藥으로서는 莖葉을 비벼서 동상 또는 浴湯香料로서 使用하기도 한다。

植物全體에 그윽한 香氣가 있음으로 구라파 婦人들은 몸을 가꾸는데 이 香氣를 이용한다고도 한다。 〈편집부〉

〈1면에서 계속〉

려 있기 때문에 協會自體로서 出荷品目 標準規格化 시안을 마련하여 來年부터 部分的이나마 시험관리해 볼 것을 계획중에 있다。

그러나 항상 生藥材를 生産하여 物件을 만드는 過程과 出荷과정에서 藥事法저촉등으로 物議를 이르키고 있으므로 이에 대한 取扱限界를 관계당국에 行政指導上으로 明示해 줄 것을 건의하고 있으나 아직도 留保상태에 놓여 있기 때문에 계속적인 접촉과 건의로 우리들의 權益보호에 有益하게 反映되도록 노력을 계속해 나가지 않으면 안될 것이다。

다섯째는 國內生産 可用品目에 對한 수입억제책계속 推進……

治外法權的인 형태로 들어오는 品目을 除하고는 協會에서 건의하는 品目들에 對한 輸入억제策은 行政體系上으로 잘 協調되고 있는 것으로 評價되고 있음으로 이 措置와 協調는 우리 會員의 生産意慾고취와 權益을 보호하는데 必需要素가 되는 것입으로 新年度에는 더욱 예리하게 品目을 選定하여 수입억제策을 반영시켜 나갈 것으로 예상하고 있다。 〈편집부〉

분재(盆栽) 겨울관리 요령

한국분재문화연구원 제공

한국 분재문화연구원(원장·안형재)에서는 온 국민의 정서생활 함양과 건전한 취미생활을 권장하기 위하여 동호인들은 물론 본회회원들에게 대한 분재기술 보급을 확대코저 每月1회씩 참고자료를 제공해주고 있읍니다。취미와 뜻이 있으신 會員들께서는 많이 活用하시기 바랍니다。

우리나라 처럼 사계절이 뚜렷한 자연조건 아래서 분재를 기른다는 것은 그계절에 따라 변화하는 분재를 감상할 수 있어 커다란 즐거움이 아닐 수 없다。

특히 겨울철 잡목류에 대한 한수(寒樹)의 감상도 일품이려니와 해송이나 진백、오엽송、가문비나무와 같이 상록(常綠)의 푸르름을 즐기는 것도 좋을뿐 만 아니라 창 밖에 함박 눈이 내리는 엄동설한에 청아한 꽃 망울을 터트리는 매화꽃의 그윽한 향내에 젖어 본는 멋은 분재인만이 가질 수 있는 보람이요、기쁨일 것이다。

이러한 분재들의 겨울관리를 자칫 소홀히 하는 경향이 있고 겨울을 처음 맞이 해 보는 초심자들은 매우 당황하거나 부적정한 월동 관리로 귀중한 분재를 고사(枯死)시키는 일이 있어 분재의 겨울관리에 대한 기본 요령을 살펴본다。

1、분재의 휴면(休眠)관리

나무도 겨울철에는 휴면을 한다。그러므로 기온이 점차 내려 가더라도 당황하지 말고 분수(盆樹)가 기온이 내려가는 것을 느낄수 있도록 여름철에 기르던 정원이나 밖에 그대로 둔채 서너차례 서리를 맞힌 다음 11월 중하순경 겨울 나기에 알맞는 양지바른 처마 밑이나 아파트의 베란다에 들여 놓으므로 휴면을 시작하게 한다。

2、나무(盆栽)의 손보기

이 때에 잡목류의 경우 낙엽이 안된 잎은 핀셑이나 손으로 모조리 따내되 가지에 붙어있는 내년 봄에 돋아 날 잎눈 또는 꽃눈이 상하지 않도록 주의 한다。

잎을 따 내고 나면 앙상한 가지만 남게 되므로 불필요한 가지와 도장지(徒長枝)를 잘라(剪定) 내어 분재의 모양을 다듬(整姿)는다。

송백류(소나무와 향나무류)는 필요에 따라 철사걸이를 해도 무방하지만、잡목류는 해서는 안된다。

3、병충해 예방

겨울철 배양 장소에 옮겨 놓기전에 위와 같은 작업이 끝나면 상록수를 제외한 모든 잡목류에 대하여는 석회유황합제 30배액을 나무 전체에 골고루 뿌려서 병충해를 예방한다。이 작업은 월동기간동안 11월과 2월 두 차례 실시 한다。

4、겨울철 분재 기르는 장소

날씨가 추워지면 분재의 초심자나 경험이 없는 사람들은 대개 분재를 안방이나 거실등 따뜻한 곳에 옮겨 놓거나 심지어는 스팀박스 위에 올려 놓은 사람도 있으나 그렇게 하면 따뜻해서 겨울잠을 이루지 못할 뿐만 아니라 건조해서 말라 죽게 되므로 절대 주의해야 한다。

겨울철에는 저녁에 분이 꽁꽁 얼더라도 낮에 녹을수만 있다면 얼어죽지 않는다。

따라서 겨울철에 분재를 기르기에 알맞는 장소는 북서풍의 차고 건조한 바람이 직접 와 닿지 않는 양지바른 처마 밑이나 베란다 또는 거실이 좋겠고、온도는 최저 영하 5 C°에서 영상 10 C°면 이상적이나、다만 햇볕이 직접 쪼이는 곳이라야 한다。

5、겨울철 물주기

겨울철 물주기는 3~4일에 한번씩 분토에 흠벅 주되 분토의 마르는 상태를 살펴서 물 주는 횟수를 조절하되 물 주는 시간을 반드시 오전 10시부터 12시 사이에 실시한다。

만일 오후에 물을 주기 하게되면 분(盆)속에 물기가 완전히 빠지지 않고 남아 있다가 저녁에 기온이 내려가면 분토가 그대로 얼어서 화분이 깨지기 때문이다。또한 한낮이라도 분토가 얼어 있을 때에는 완전히 녹은 다음에 물주기를 해야 한다。

◆분재에 관한 문의전화 (0343) 43·6367

86生藥材 生産現況 提出要望

참조:생약 7-1141~50(86·11·14) 생약재 생산현황파악보고 지시공문

協會는 每年 定例的으로 파악하고 있는 全國의 生藥材 生産現況을 早期파악하고자 各地域別 分事務所長의 적극적인 資料수집 및 提出을 要望하고 있다。

그런데 이 자료들은 國內유일한 生藥材 生産統計자료로서 各要路에 (농수산부、경제기획원、한국은행본부 사업계획자료등) 提供하게 되므로 最善을 다한 신빙성 있는 資料가 되어야 하며 오는 11월末을 期해 作成되어 12月30日까지 必着시켜 주실것을 당부하고 있다。

※生産量 現況作成 要領
(단위:kg)

①品種別:재배、자연생을 망라할 것。

②各道別:관하群 생산량을 종합작성 할것。

③各郡別:생근、건재를 구분작성하여 1부는 도지부로、1부는 협회본부로 제출할것。

④비고란에는 재고량이 있다면 명기할것。

(連載) 栽培教室

新規會員을 爲하여

〈전호에서 계속〉

④定植과 肥培管理

牡丹의 심는 시기는 9월중순경이 適期이다。추운 지방일수록 일찍 심는것이 좋으며 또한 이른 봄에 심기도 하지만 추운 지방일수록 일찍 심는 것이 理想的이다。식물은 어느 곳에서나 生育하지만 겉흙이 깊고 물빠짐이 잘되는 砂質壤土나 混礫壤土가 좋다。

심을 圃地는 심기에 앞서 石灰窒素를 살포하여 겉흙과 잘 섞이도록 하고 1주일쯤 지난 뒤에 밑거름으로서 다음 표와 같이 구분하여 施肥하면 좋을 것이다。

牡丹 심을때의 施肥量(10a당)

肥料	施肥量	施肥別
石灰窒素	400kg	밑거름
퇴비	1,200	〃
과인산석회	48	〃
깻묵류	200	〃
닭똥	200	〃
인분뇨	800	웃거름
황안칼리	12	〃

이상과 같이 施肥하여 두둑의 겉흙과 잘 섞고 整地한 뒤에 이랑사이 90cm、포기사이 60cm내외로 하고 깊이 18~21cm로 파서 바로 苗根을 넣은 뒤에 얕게 흙을 덮는다。심을 때는 뿌리부분이 직접 肥料에 닿지 않도록 하고 地表로부터 6~9cm 깊이로 서 있게 하여 뿌리가 많을 때는 적당히 펼쳐서 심는다。

追肥는 인분뇨를 施肥할 때는 심은 뒤에 한번 주고 다음해 봄에 반쯤 물에다 묽게 타서 주고 꽃이 진 뒤에 3배 되는 물에 묽게 타서 施肥하면 生育이 좋다。

따라서 황산칼리는 3월하순경에 施肥할 것이다。牡丹에 施肥할때 주의할 것은 될수 있으면 봄에는 농도를 묽게 해서 주고 가을에는 좀 짙게 해서 줄 것이다。

한편 花盆에 심어서 觀賞用으로 재배하여 收益을 올리고자 할때는 미리 培養土를 만들어서 쓴다。

栽培할 腐葉土를 얻고자 할 때는 상수리나무、밤나무、푸라타나스 등의 闊葉樹 落葉을 이용하는데 이것들의 落葉은 葉脈이 딱딱하여 썩어도 잘 부서지지 않는 것으로 흙과 人糞尿 등을 섞어 쌓고 잘 썩게 한 후 필요에 따라 사용할 것이다。

이러한 腐葉土를 얻게되면 잘 썩은 후에 腐葉土、밭흙、모래를 5:4:1의 비율로 섞어서 심으면 잘 자란다。이상의 培養土가 없을 때는 肥沃한 밭흙과 모래를 적당히 섞어서 쓰면 된다。

심는 요령은 일반花草 심는 방법이면 좋으나 한가지 주의할 것은 밭에 심는 식으로 밭흙에다 각종 肥料를 혼합해서 심게 되면 뿌리가 상하고 썩기 쉬우니 그냥 肥沃한 흙에 모래만을 섞어서 심고 약 [illegible] 수일이 지난 다음 깻묵 등을 겉흙에다 주거나 물거름(人糞尿、깻묵、魚肥 등을 썩힌 것)을 3~4회 주면 좋다。



牡丹接木法

⑤病蟲害

牡丹에 발생하는 病害에는 여러 가지가 있으나 그 가운데 중요한 것은 다음과 같다。

㉮보토리티스病:이 병은 꽃봉오리、꽃잎、잎자루 등에 발생하는데 꽃봉오리가 상당히 컸을 때 새 가지의 끝에나 꽃자루에 侵入한다。피해가 심해지면 점차로 枝幹이 말라 죽게 된다。

이러한 원인은 窒素質 肥料의 施肥가 많았을 때와 비가 자주 올 때 발병하게 된다。

이 병을 예방하기 위해서 꽃봉오리가 생기게 되면 때때로 8-8 또는 6-6식 석회보르도액을 살포하고 被害부분은 제거할 것이다。

㉯白絹病:이 병은 6~9월 경에 가장 심하다。주변에다 宿根草 球根등을 심었거나 또는 牡丹、芍藥을 連作했을 때 발병하게 된다。

이 병은 枝幹이나 뿌리 부분에 피해를 주고 있다。기타 枝枯病、銹病、葉斑病 등이 있는데、예방법은 모두 8-8 또는 6-6식 석회보르도액을 기상상태를 봐서 살포하면 효과적이다。

㉰蟲害:蟲害로서는 하늘소벌레、介殼蟲 혹은 진딧물이 생기는데 하늘소벌레는 發芽하기전에 석회유황합제를 뿌려 5도액을 살포해줄 것이다。

5~6월 경을 전후하여 개각충、진딧물、기타 벌레가 자주 발생하여 많은 피해를 주는데 이들은 folidol E.P.N.diazinon등을 800~1000倍液으로 하여 살포해 주면 피해를 막을 수 있다。

4、收穫·調製

種子로 번식한 것은 7~8년 이상 生育하여야 수확할 수 있다。그러나 포기 나누기한 것은 種苗를 정식한 후 生育狀態에 따라서는 4~5년만에 수확할 수 있다。

수확하는 適期는 접붙이는 대목을 이용하거나 繁殖할 種苗등의 용도에 따라서 다소 時期가 다르지만 일반으로 9월 상·중순경에 하는 것이 좋다。

뿌리를 캐는 요령은 형편에 따라서 일시에 다 캐어 뿌리부분은 藥用으로 調製하고 포기눈은 적당한 크기로 나누어 種苗로 팔거나 自家繁殖을 한다。

한편 藥劑의 時勢에 의하여 적게 수확할 때는 캘곳을 돌려가면서 뿌리만을 캐어 낸다。

이렇게 수확한 후에는 잘 썩은 퇴비、깻묵을 흙과 잘 섞어서 캐낸 자리를 메워 준다。

수확한 뿌리는 잘 씻고 대칼로 껍질을 벗기고 뿌리를 6~9cm로 끊어서 木質部(심)을 빼내고 낮에는 별에 말리고、저녁이나 雨天時에는 온돌등 火力乾燥를 하여 될수 있으면 짧은 時日에 말리는 것이 품질이 좋다。

定植후 4~5년생의 10a당 收穫量은 생것으로 2400~2800kg정도이고、乾燥한 牡丹皮는 1000kg 내외이다。