

## 스트레스 어떻게 풀면 좋은가

特輯

- ◆ 스트레스반응은 인간이나 다른 개체에의
- ◆ 해 생기지만, 개인의 내적인 욕구와 사
- ◆ 회, 문화적 배경에 따라 그 양상이 다르
- ◆ 게 나타날 수가 있다. 정신신체장애는 일
- ◆ 상생활에서 겪는 스트레스에 대한 평소의
- ◆ 적응능력이나 방어기전이 무너지게 되거나
- ◆ 또는 부적절하게 됨으로써 나타나는 것으
- ◆ 로 본다. 여기 스트레스에 대한 장기의 반
- ◆ 응은 개인을 보호하여 적응을 돋고, 긴급
- ◆ 한 상황에 대비하게 된다. 그러나 장기의
- ◆ 반응이 스트레스와 관계없이 지속되면, 결

국 조직이 손상하게 된다. 정신신체장애의 증상은 감정상태의 생리적 표현이다. 급한 분노가 생기면 정상 식물신경 반응으로 혈압이 상승하고 화가 해소되면 정상으로 회복되지만 지속적인 억압된 분노가 긴장을 계속시키면 혈압은 떨어지지 않고 그대로 상승된다. 갈등을 해소시키기 위해 유아적으로 행위로 퇴행되어 정신증상이 재현되는 경우 우리는 우리몸에서의 항상성을 유지하려는 정신적 방어의 실패이다.

여러 스트레스에 적응하는 힘이 약한 사람에게 감정적인 요소가 더욱 악순환을 조성하여 고혈압을 일으킨다고 밝히고 있다. 의존적 관계가 위협당하는 것과 분노가 적절하게 발달되지 못하고 억압되는 까닭이다. 많은 고혈압 환자는 강한 외변성과 강박적인 경향이 있고 권위적 위치에 대해 강력한 의존적인 결속을 시키려는 욕구와 함께 공격적인 적개심을 갖고 있다.

◆ 두통 및 편두통: 모든 두통 환자에 특정한 성격형은 없으나 수동, 공격적, 강박적 또는 히스테리적인 적응장애도 나타나는 수가 많으며, 동반되는 만



延圭月

<梨花醫大>  
神經精神科 교수

## 스트레스와 精神身體장애

## 胃臟관계에서 오는 가장 흔한疾患은 소화성潰瘍

感情심하게 받으면 血壓上승으로 高血壓, 性交不能 초래도

미하나 어떤 경우에는 corticosteroid의 분비가 25~35% 까지 증가된다.


이는 전해질 평행, 탄수화물 대사, 변역반응등에 영향을 미치고 역시 정신적 스트레스가 촉진되면 testosterone의 분비가 감소되고 성장 호르몬의 분비는 증가된다. 한편 어머니의 박탈을 겪는 어린이는 성장호르몬의 반응이 결여됨을 보인다.

주요 정신신체장애를 열거해 보면 다음과 같다.

◆ 소화성 궤양: 위장관계에 오는 정신신체장애중 가장 흔한 질환으로 젊은 연령층의 남자에 빈번하고 악성종양의 가능성은 위궤양보다는 적으나 감정요소와 밀접한 관계가 있다. 대부분의 십이지장 궤양은 위점막의 분비과다, 모조벽이나 조직의 저항력 약화등의 생물학적인 소인이 있는 사람에게 그 사람이 어려서부터 자라온 사회환경적 배경 및 커서 부딪치는 어려움 등 정신적인 알력이 더할 때 생기는 것으로 알려져 있다.

◆ 궤양성 대장염: 1차적으로 대장의 점막하조직을 침범하는 만성적 질환이다. 가족력이 있어 유전적 소인이 관여할 것으로 간주되며 정신적 요소가 증상을 유발 또는 악화시킨다.

◆ 기관지 천식: 체질적인 소인



이 관계 있지만 알레르기 환자의 75%에서 그 발작이 어떤 감정요소에 영향을 받는다고 한다. 성미가 급하고 민감하며 매사에 자신이 없고 소극적이며 항상 불안하다. 어린 시절의 양육과정과 관계되는 억압된 갈등과 관련된다고도 한다.

◆ 고혈압: 혈압의 상승은 여러 원인에 의한 전신반응으로 체질적 소인이 중요하며 renin, angiotensin을 여러 호르몬과 자율신경계의 작용에 의한 혈관수축, 뇌질환, 혈관질환 및 약품등 여려 원인을 들 수 있으나 정신의학적으로는 불안, 긴장등 여려 스트레스와의 관계에 관심이 있다. 심한 스트레스를 겪는 조건이나 직업에서 고혈압 환자가 보다 많고

불안이 두드러지며 다른 신경증상이 나타난다. 편두통 환자들은 완고하고 완벽주의적이고, 지나치게 양심적인 성격으로 침착하면서도 매사에 날을 많이 의식하고 날의 바쁨에 예민하여 양심적이고 이지적이다. 양심에 대한 적개심이 신경증적 갈등과 불안의 주된 요소가 되며 억압된 분노와 의존성이 두통을 유발한다. 또 완고한 성격으로 생활이 각박하고 긴장된 노력이 계속되어 신경관계의 기능장애가 겹쳐서 혈관 확장등이 발작적으로 나타난다.

◆ 기타 스트레스와 관계되는 정신신체장애: 요통은 동통 클리닉에 의뢰된 환자의 70%를 차지하나 그 중 1/3은 검사

## 일상생활適應能力가 장중요

内科的 치료로 症狀解消시킨후

상 정상이다. 심장순환으로 불안, 긴장, 분노등은 협심증, 심장경색등을 악화시키고 심부전을 초래할 수 있다. 호흡기성으로 파이프호흡, 위장계로 설사, 변비소화장애등이 나타나며 피부성으로는 스트레스로 인해 전신성, 국소성 소양증, 다한증, 신경성 피부염등이 나타난다. 그외 내분비계 이상으로 갑상선 기능 항진증, 당뇨병, 비대증, 신경성 식욕 부진증, 비뇨생식계로 성교불능등이 스트레스와 관련되어 나타날수 있다.

정신신체장애의 치료는 일반적으로 정신과의사와 내과의사 등이 서로 협조하여 치료한다. 초기 또는 급성기에는 증상 자체의 해소등을 내과적 치료로 해주고 점차 정신적인 보호, ventilation, 안심시키는 일 또는 환경의 변화등의 지지적인 방법으로 해주며 적극적인 정신과적 치료는 내과적 치료에 효과가 없거나 만성화된 경우나 정신장애가 우선적이나 심각한 경우에 의뢰하는 것이 보통이다. 치료는 보다 성숙된 일상생활의 적응, 신체적 및 직업적인 활동 능력의 배가, 병자체의 진행과 합병증, 2차적 이득추구의 예방, 그리고 장기적인 안목을 갖고 순응할 수 있는 능력을 갖추는데 그 목표를 둔다.

**휴대용 혈당측정기**는 환자 및 일반인이 병원에 가는 번거로움이 없이 가정, 직장 및 여행중 본인 스스로 혈당치를 측정하고 당뇨병을 치료하는데 필요한 소형 혈당측정기입니다.

## 특징:

- 한방울의 혈액(血液)으로 측정(測定) 됩니다.
- 측정범위: 0~1,000mg/dl  
물로 닦을 필요가 없음
- 날짜, 회수, 혈당치가 동시 100회까지 기억 재생됨
- 검사 비용이 적게 들고, 간편한 휴대가 됩니다.
- 검사 시험지(Strip)을 냉장고 보관이 아닌 실온 보관으로 변질될 우려가 없음.

제조원: KYOTO DAIICHI

판매원: 정우양행

서울시중구충무로 3 가24-14(경북빌딩 101호)

전화: 276-0277

276-0278

## ※당뇨신문

“소망” 구독을

원하시는 분은

아래 주소로

연락바랍니다.

보내실곳: “대한당뇨협회”

서울시중구충무로 3 가24-14

경북빌딩 101호

TEL: 265-9822