

淨化特輯

제 조 제 김 으 면 고 술

이 날은 악의 재앙으로 예상되며 단정하고.

약앞에선 항상 겸허해야 한다

- … 1960년에서 61년사이 서독에서는 물개팥(海豹肢症)…○
- …을 가진 기형아가 잇달아 태어나온 나라가 공포로 들…○
- …젊은 적이 있다. 그 2년 전까지만해도 이런 기형아 출…○
- …산은 한전도 보고되지 않았던 것이 59년에 17건, 60년…○
- …에 1백26건, 그리고 61년에는 4백77건이나 발생했던…○
- …것이다. 처음에는 풍진바이러스나 피임제가 원인이 아…○
- …닌가 하였으나 한 의사의 암케이트조사결과 이들 기…○
- …형아출산산모의 절반가량이 「콘테르간」이라는 약을 먹…○
- …었다는 사실이 밝혀졌다.

분이나 부작용을 모른 채 래서 살피적으로 복용한 실정인 것이다. 그 되어도 납통통제만 학생들이 약화의 삼상수를 수 있을 것이다. 그들이 감조하다. 학생 마구 납통되는 학생

부작용 소연진통제의 부작용도 심각한 것 중의 하나다. 그 대표적인 것 이 「아스피린」으로 두나 독감에 걸린 린이가 복용할 경우, 벌레, 구토, 두통 등의 증상이 하루 갑자기 빨작으로 흔수에 빠지거나 사망에 이르는 수가 있는데 이것이 소위 말하는 「후쿠로」이다. 끝으로 영양제를 열마전까지만 해보 보약이라는 것이다.

中國原產의
미나리나를
속하는 多年生草本
이다. 本科에
우리나라에서는 中南
부에 분포하는
지방에서는 별로
없고, 北部지방에서
만약 있다면
생산되고 있다.

	栽培教室 農業栽培研究會 農業栽培研究會
	新規會員用 雜誌 87
	栽培教室 農業栽培研究會 農業栽培研究會
	新規會員用 雜誌 87
	栽培教室 農業栽培研究會 農業栽培研究會

이防風이 山防風도 는
는防風이라고도 하며
것가에 自生하는
것이다.
2~3년생 草本이다.
草長은 60~90cm에
이르며 뒤에는 흰색
의 꽃이 피어
꽃이 많아도
여윈다. 8~9월경에
결실한다.