

- Chlorhexidine과 소염제를 함유한 GEL의 국소도포시 치태형태 및 치은염증 억제효과에 관한 임상적 연구

### 최 상 목

서울대학교 치과대학 치주과학교실

치주질환 환자 44명을 대상으로 chlorhexidine과 비스테로이드성 소염제가 함유된 gel(Hiparadent)의 임상효과를 위약을 대조군으로 하여 이중맹검법에 의해 검사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 치태지수는 실험군에서 대상군과 비교하여 전 치료기간에 걸쳐 모두 통계학적으로 유의성 있게 감소하였다.( $P<0.01$ )
2. 치은지수도 실험군에서 대상군과 비교하여 전 치료기간에 걸쳐 모두 통계학적으로 유의성 있게 감소하였다.( $P<0.01$ )
3. 개인별 평균 색소침착지수는 실험군에서나 대조군에서 모두 비슷한 수치를 보이고 있으며 실험기간중 통계학적으로 유의한 변화를 나타내지 않았다.
4. 대상 환자중 구강내에 나타나는 부작용을 일으킨 환자는 발견되지 않았다.

- 측방치주낭종의 증례보고

황치훈 · 박미정 · 김 진 · 조규성 · 채중규 · 김종관  
연세대학교 치과대학 치주과학교실

1987년 11월 11일 연세대학교 치과대학 부속병원 치주과에 내원한 41세 여자 환자에게 측방치주낭종을 진단하였으며 그 치료방법으로서 치은 박리 소파술시 낭종 부위를 적출함으로써 임상적으로 좋은 결과를 얻었기에 보고하는 바이다.

- 급성치주농양의 초기 처치 : 치석제거술과 치근활택술

한수부 · 손한기  
서울대학교 치과대학 치주과학교실

급성치주농양의 치료목적은 통통을 경감시키(치주낭의 깊이  $\geq 6\text{mm}$ )는 치은 판막술을, 2명(치주낭의 깊이  $\leq 5\text{mm}$ )에게는 치근활택술을 시행하였다.

Nabers(1964)는 그의 임상경험을 통해 급성농양이 있는 경우에 치주조직의 재생능력이 아주 뛰어나다고 결론지었다. 그리고 급성염증성 조직파괴 후의 뛰어난 치유효과는 치근면의 적절한 생물학적 상태에 기인한다고 가정하였다.

그러므로 농양이 소실되고 재부착이 가능하다면 조직이 치유될 수 있는 시간을 주기 위해서 그부위의 재평가는 3개월정도 기다리는 것이 가장 바람직하다고 하였다.

Kareha 등은 염증반응이 급성일수록 적절한 치료에 대한 치유반응 또는 극적이라고 하였다. 한번의 약속으로 외과적 술식에 의한 좋은 결과의 보고도 있으나, 조직의 조직이 어려워 절편의

손상가능성이 높다. 또한 수술전단계처치(preparatory phase)를 하지 않으면 수술후 치은퇴축의 양을 예전치 못하므로 심미적인 문제가 발생할 수 있다. 그러므로 불필요한 외과적 처치를 피하기 위해서는 일정기간 기다렸다가 재평가하는 것이 타당하다고 생각된다.

## ● 성견의 건강치은, 구강열구 및 부착상피의 주사전자 현미경적 연구

지준순 · 채중규 · 김종관

연세대학교 치과대학 치주과학교실

본 연구는 치은상피와 구강열구상피 부착상피의 형태 및 표면특성을 관찰하기 위하여 임상적으로 건강한 성견의 치은을 주사전자현미경으로 관찰하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 치은상피의 형태는 사각형 또는 다각형이며 표면에는 수많은 미세융기세(microridge)으로 이루어진 벌집모양(honey-comb) 혹은 미세구멍(pit) 형태를 나타냈다.
2. 구강열구상피는 다각형 내지 옆으로 길게 늘어진 형태이며 표면에는 많은 미세돌기(microvilli) 혹은 불규칙한 스폰지 형태의 미세충판(microlamellae)이 관찰되었다.
3. 부착상피 역시 다각형이였으며 표면에 미세융기 선이나 미세돌기, 미세충판을 관찰할 수 없고 편평했다.
4. 치은상피의 세포연결은 굵고 볼록한 돌출된 융기선에 의하여 이루어져 있고 구강열구상피는 서로 접혀서 연결되어 있는 형태를 보였다.
5. 부착상피 세포간에는 미세한 세포돌기로 연결되며 넓은 세포간극이 보였고 그 안에 혈구 세포들이 관찰되었다.

## ● 치주기구 사용후의 치근표면에 대한 주사전자현미경적 연구

임순연 · 조규성 · 채중규

연세대학교 치과대학 치주과학교실

큐렛과 초음파 기구의 사용이 치근 표면에 미치는 영향과 치면세마의 효과를 연구하기 위하여 치주 질환에 이환된 치아를 구강 내에서 치근활택술을 시행하고 치주적으로 건강한 치아는 발치후 정해진 Stroke의 횟수와 방향으로 치근활택술을 시행하였으며 각 군에서 몇개의 치아는 치면 세마를 시행한 후 주사 전자현미경으로 관찰한 결과 아래와 같은 결론을 얻었다.

1. 동일한 stroke으로 기구를 사용한 정상치군에서 큐렛을 사용한 면은 평활한 면을 보였으며 초음파 기구 사용면은 백악질면이 일부 제거되나 완전한 제거는 관찰할 수 없었다.
2. 질환치에서 큐렛을 사용한 면은 평탄하며 미끄러운 표면을 보였으나 초음파 기구를 사용한 면은 작은 입자상의 잔사가 많이 존재하였고 불규칙적인 물결 모양이 관찰되었다.

3. There was no significant difference in extrinsic stain index through the 8 week trial in any of the groups.

### **Case report of a lateral periodontal cyst**

**Chi Hun Hwang, Mi Jeong Park, Jin Kim, Kyoo Sung Cho, Jung Kiu Chai, Chong Kwan Kim**  
Dept. of Periodontology, College of Dentistry, Yonsei University

A lateral periodontal cyst may be seen on roentgenograms as a welldefined radiolucent lesion adjacent to a root. Many mechanisms leading to the formation of such a cyst and treatment have been described.

A case of 41 year-old female patient with lateral periodontal cyst is reported in which the lesion showed clinically successful result followed by flap operation and surgical enucleation.

### **Initial treatment of acute periodontal abscess : scaling and root planing**

**S. B. Han, H. G. Son**  
Dept. of Periodontology, College of Dentistry, Seoul National University

The present study evaluated the efficacy of scaling and root planing in initial treatment of acute periodontal abscess.

Twenty-two patients, aged 18 to 60, having acute periodontal abscess were treated with scaling and root planing.

The next day, the swelling was markedly reduced or absent in all the patients. The symptoms had subsided or had been alleviated. Purulent content was exuded only in one patient.

7 days after therapy, the swelling was absent except in one patient, and the symptoms had also subsided except in one patient. Purulent content was exuded in none of the patients.

The results of the study support the effectiveness of scaling and root planing in the initial treatment of acute periodontal abscess.

### **Scanning electron microscopic study of the healthy gingival sulcular, junctional epithelium of the dogs**

**Jun Son Jee, Jung Kiu Chai, Chong Kwan Kim**  
Dept. of Periodontology, College of Dentistry, Seoul National University

The purpose of this study was designed to observe the form and surface characteristic of gingival,