

억제제이며  $\beta$  blocker의 점안이 행해지고 있다. 이 점안만으로는 안압이 정상치를 유지하지 않는 경우나 시아결손이 일어나기 시작한 때에는 수술요법이 행해지고 있다. 녹내장의 수술요법은 방수의 배출로를 수술로 만들기 위한 것이나 시신경왜축의 진행을 방지하는데 지나지 않으며 백내장의 경우와는 달리 시기능의 회복을 위한 것은 아니다.

### VIII. 중심성맥락망막염

30대후반에서 40대인 사람에게 일어나는 황반부(黃斑部)의 장액성의 삼출성 변화이다.

## 협의회소식

### 실행임원회 개최

지난 10.13일 팰리스호텔 회의실에서 개최된 실행임원회에서는 전국 근로자의 건강관리를 효과적으로 하기위해 그간 추진되어 왔던 전산화가 11.1일부터 협회 9개 산업보건센타에 P/C를 설치하고 본격적으로 가동케됨에 따라 향후 이의 최대한 활용에 대비한 정형프로그램과 분석프로그램 개발에 착수키로 하는 한편,

현재 근로자 건강진단을 실시하고 있는 협의회회원기관과 유관기관 및 사업장 근로자들이 이를 효율적으로 이용할 수 있도록 하기 위하여 전산화업무에 대한 안내, 홍보팜프렛 및 카드록을 제작 배포키로 하였다.

### 일반건강진단기관 업무지도실시

협의회는 회원기관 업무지도 연차분할 실시계획에 따라 지난해에 이어 금년도에도 대상검진 기관에 대해 사전통보와 함께 10월부터 12월

원인은 현재까지도 불명확하며 전신적 과로등이 유인이 된다고 생각된다.

이것은 어느날 돌연히 시야의 중심이 어둡게 보이거나 물체의 형태가 빠뚤어져 보이게 되며 이는 망막의 최외층의 색소상피층에 변화가 생겨 맥락막에서 망막내로 장액성의 삼출액이 나오는 것이다. 이 삼출을 일으키고 있는 부위를 光응고하는 것으로 삼출액을 일찍 흡수시키는 것이 가능하다. 그 부위가 중심窟에 가까운 때는 대단히 위험하다. 전신적 정양과 순환촉진제의 내복등으로 경과를 호전시키는 수가 많다. 통상 완치할때까지 2~3개월을 요하며 재발도 많으므로 주의해야 한다.

까지 3개월간에 걸쳐 업무지도에 들어갔다.

금년도 업무지도는 전국 1,082개 기관중 지난해에 실시한 350개 기관을 제외한 700여개 기관중 346개 기관을 선정하여 실시키로 하였다.

전국 지역별 대상기관수는 다음과 같다.

서 울 :	95 개기관	강 원 :	9 개기관
부 산 :	59 //	충 북 :	14 //
대구경북 :	28 //	전 북 :	6 //
광주전남 :	15 //	경 남 :	21 //
인천, 충남, 경기 (미정)			

### 창립기념일 우수직원 표창

협회는 오는 11월 22일 제 25회 창립기념일을 맞이하여 이날을 휴무일로 정하고 근무성적 우수직원에 대하여 표창과 부상을 수여할 예정이다.