

油風의 内服 및 外用藥에 關한 研究

朴 恒 基*

I. 緒 論

油風證은 頭髮部에 잘 나타나며, 毛髮의 脫落으로서 원형 或은 타원형의 穗斑이 되기도 하며, 경계는 明確하고, 전혀 털이 없거나, 初期에는 짧은 털이 남아 있으나, 쉽게 빠지기도 한다.

病巢部의 皮膚는 平滑하고, 落屑의 痘的 症狀이 없으며, 손톱크기나 계란크기가 되는 수도 있고, 1個 또는 數個로 多發의 이어서 이들이 融合하여, 不規則하게 되어 多發性舟形脫毛症이 되고, 이것이 차차 進行하여, 全頭毛가 脱落하는 全頭脫毛症이 되기도 한다.

頭髮部以外에도 종종 수염, 눈썹,腋毛, 陰毛等에 나타나며, 毛髮이 脱落된 皮膚에는 紅色을 띠며, 光亮하여 별례가 기어 가는 것 같은 摳痒證을 發한다.²⁾

惡性인 경우는 全身이 無毛일 수도 있으며, 經過가 여러가지이며, 하나의 小禿에 머무르는 것도 있고, 急速히 머리 全部가 대머리가 되는 境遇도 있다.

油風은 風病으로 皮膚가 乾燥하며, 毛髮이 거칠어지며, 痂皮를 形成하여, 그 毛髮이 脱落하는 것이다. 이러한 疾患이 發生하게 되는 것은, 皮膚毛孔으로 風邪가 侵犯하여 熱이 發生하여 지며, 血液이 燥澀하게 되어 皮膚나 毛髮에 血養을 供給받지 못하기 때문에 나타나기도 하며,²⁴⁾ 神經性障礙로 나타난다는 說도 있다.⁶⁾

이 調査에서는 毛髮의 脱落中에서 進行過程上 油風의 一部分으로 看做될 수도 있는 毛髮의 脱落의 處方을 拔萃하여 處理하였다. 即 文獻中에는 油風의 部門이 뚜렷이 있기도 했으나,

어느 文獻에는 이 項目이 없고, 毛髮의 脱落부門으로 다루고 있기 때문이다.

II. 資料 및 方法

A) 資 料

文獻 50餘種以上을 資料로 하였으나, 文獻上 나타나지 않은 것이 많아서 實際 30餘種의 文獻에서 處方을 拔萃하였다.

그러나 原本引用을 包含한다면 그 以上的 文獻이 될 것이다.

B) 方 法

1) 内服藥을 A群, 外用藥을 B群으로 分類處理하였다.

2) 取拔한 書籍中에 油風이라 記錄되었거나, 穗斑으로 記錄된 것 以外에도, 油風症狀으로 記錄된 毛髮脫落은 모두 拔萃하였고, 그外 書籍을 參考로 引用하였다.

3) A, B群의 處方種類와 出現回數 및 頻度를 調査檢討하였다.

4) 處方名이 없는 것도 拔萃하였으나, 方名이 틀리나, 같은 內容이거나, 비슷한 處方은 같은 意義를 지니므로 重複하지 않았으며, 그런 類로 複雜한 것은 省略하려고 努力하였다.

5) 引用書籍에서 油風證에 使用된 處方이, 原典에서 本疾患에 使用되지 않았다 해도 原典의 것은 除外하고, 引用書籍에 있는 것만 拔萃하였다.

文獻資料

1. 醫醫大典 : 海艾湯, 神應養真丸

2. 醫宗損益 : 六味地黃丸, 防風通聖散, 八物

- 湯，黃芪建中湯，三聖膏，二仙丸，黑熟椹。
3. 醫部全書：黃芪建中湯，四物湯，八物湯，二仙丸，生禿烏雲油，全珠綠雲油，胡麻油，熊脂，羊糞燒灰淋汁，臘月猪生膏，麻子油
4. 醫門寶鑑：神應膏
5. 濟衆新篇：腎氣丸，防風通聖散，八物湯，黃芪建中湯
6. 聖濟總錄 白禿：細辛膏，杜薦膏，五味子膏，防風丸，麻膏，桃皮湯沐髮方，桃支膏，赤禿：旱蓮汁方，馬蹄灰，塗椹汁，椒葉汁
7. 普濟方 白禿：杜薦膏，木蘭皮膏，五味子膏，防風丸，什麻膏，王不留行湯，松瀝煎桃皮湯，水銀膏，馬羊膏，龍粉散，藜蘆散，苦棟膏，百部散，皂莢湯，合鵠羹(洗)
- 赤禿：旱蓮汁，牛羊角灰，馬蹄灰，椒葉汁，搗黑椹子汁，猪毛燒灰。
8. 太平聖惠方，白禿：蛇床子膏，慾蟲止痛方，木蘭皮膏，松瀝膏，水銀膏
- 鬚髮禿落：補益牛膝圓方，蔓荆子膏，蘭茹膏，蓮子草膏，赤禿：黑椹汁(服)桑灰汁，馬蹄燒灰。
9. 外臺秘要，茯苓朮散，麻子油，搗黑椹汁，馬髻膏，豬脂，熊脂羊糞灰淋汁(洗)，防風蔓荆子丸，松瀝煎 桃皮汁，王不留行湯
10. 中醫外科臨床手冊：神應養真丹，代赭石粉(一錢吞服 每日 一次)，毛姜 外擦，蒲公英 30錢 黑豆 1 什 加水煮 熟再加 水糖 40 錢(每日吃 20 錢)
11. 外科正宗：海艾湯，神應養真丹
12. 萬病回春：補中益氣湯加麥門冬 五味子，六味地黃丸加五味子。
13. 惠庵醫方：三聖膏，桑白皮汁(洗沐)，白杏川椒蕊頭煎湯，牛牙散
14. 仲景全書：桂枝龍骨牡蠣湯
15. 中醫外科學講義：神應養真丹，毛姜
16. 皇漢醫學：加味道遙散，桂枝加龍骨牡蠣湯。
17. 仲景方類聚：小建中湯，桂枝加龍骨牡蠣湯，五苓散。
18. 直指方：烏羊膏。
19. 千金要方：王不留行湯，松瀝膏 牛羊角灰，馬蹄灰，烏馬花，搗黑椹汁，麻子油，桃皮汁，柏葉汁，貓兒毛灰膏，桑白皮汁。
20. 東醫寶鑑：八物湯，黃芪建中湯，四物湯，地黃酒，天門冬膏，滋榮散，三聖膏，菊花散，巫雲散，二仙丸，生禿烏雲油，金主錄雲油 六味地黃丸 防風通聖散，胡麻油，猪鬃膏。
21. 六科華繩(雜病科)：三聖膏
22. 漢方治療의 實際：小柴胡加牡蠣湯，大柴胡湯，桂枝加龍骨牡蠣湯
23. 醫學入門：腎氣丸，天門冬膏，柏葉煎，防風通聖散
24. 漢方治療百話：柴胡加龍牡湯。
25. 漢方診療醫典：神應養真湯，防風通聖散，桂枝加龍骨牡蠣湯，大柴胡湯，小柴胡湯， 小艾灸，紫雲膏，禿癬膏。
26. 漢方臨床四十年：防風通聖散，大柴胡湯，小柴胡湯，神應養真湯，桂枝加龍骨牡蠣湯，外用；禿癬散，八仙丹，四六地黃丸，毛髮生毛藥(百荷首，人蔘，白朮，白茯，甘草，熟地，白芍，川芎，當歸 1錢3分，續斷，香附子，黃芩，黃連)加味活血湯。
27. 診療要鑑：生毛丹
28. 漢方外科：神應養真丹，海艾湯，防風通聖散，六味地黃湯。

Table 1. (A群)

No	處 方 名 (服用藥)	書籍出回數
1	神應養真丸(丹) 2)4)7)8)23)24)25)	7
2	六味地黃丸 3)4)25)27)28)	5
3	防風通聖散 1)4)7)19)25)27)28)	7
4	八物湯 1)9)27)28)	4
5	黃芪建中湯 1)8)27)28)	4
6	二仙丸 9)27)28)	3
7	四物湯 9)28)	2
8	腎氣丸 1)19)	2
9	茯苓朮散 17)	1
10	(擣)黑棗汁 11)	1
11	代赭石粉 8)	1
12	補中益氣湯 3)	1
13	柱枝龍骨牡蠣湯 4)5)7)20)22)26)	6
14	加味道遙散 26)	1
15	小建中湯 18)	1
16	五苓散 18)	1
17	大柴胡湯 4)7)12)	3
18	柴胡加龍牡湯 12)16)	2
19	小柴胡湯 4)7)	2
20	加味活血湯 4)	1
21	毛髮生毛藥 4)	1
22	生毛丹 25)	1
23	防風蔓荊子丸 17)	1
24	防風丸 15)22)	2
25	蒲公英 30 錢黑豆 1 什, 加水煮熟再 加冰糖 40 錢(每日吃 20 錢) 8)	1
26	八仙丹 25)	1
27	桃皮汁 17)	1
28	補益 生膝圓方 11)	1

Table 2. (B群)

No	處 方 名	書籍出回數
1	海艾湯 2)24)25)	3
2	黑棗子汁 15)17)21)22)27)	5
3	三聖膏 6)14)27)28)	4
4	生禿烏雲油 9)28)	2
5	金珠綠雲油 9)28)	2
6	胡麻油 9)28)	2
7	神應膏 21)	1
8	細辛膏 15)	1
9	杜蘅膏 15)22)	2
10	五味子膏 15)22)	2
11	麻膏(油) 9)15)17)21)	4
12	桃皮汁(湯)(膏) 15)17)21)22)	4
13	旱蓮汁方 15)22)	2
14	馬蹄灰 11)15)21)22)	4
15	楸葉汁 15)22)	2
16	木蘭皮膏 11)22)	2
17	什麻膏 11)	1
18	王不留行湯 10)17)22)	3
19	松瀝煎 10)11)17)22)	4
20	水銀膏 11)22)	2
21	烏羊膏 11)22)	2
22	龍粉散 22)	1
23	藜蘆散 22)	1
24	牛羊角灰 10)22)	2
25	苦棟膏 22)	1
26	百部散 22)	1
27	豬毛燒灰 22)	1
28	怒蟲止痛方 11)	1
29	蔓荊子膏 11)	1
30	蘭茹膏 11)	1
31	羊糞灰淋汁 9)17)	2

No	處 方 名	書籍出回數
32	防風蔓荆子丸 ¹⁷⁾	1
33	烏麻花方 ¹⁰⁾	1
34	馬鬚膏 ¹⁷⁾	1
35	蓮子草膏 ¹¹⁾	1
36	毛姜方 ⁸⁾²⁰⁾	2
37	桑百皮方 ¹⁰⁾¹¹⁾¹⁴⁾	3
38	牛牙散 ¹⁴⁾	1
39	豬鬚膏 ²⁸⁾	1
40	地黃酒天門冬膏 ²⁸⁾	1
41	滋榮散 ²⁸⁾	1
42	蘭花散 ²⁸⁾	1
43	巫雲散 ²⁸⁾	1
44	紫雲膏 ⁷⁾	1
45	禿癬散 ⁴⁾²⁷⁾	2
46	小艾灸 ⁷⁾	1
47	熊脂 ⁸⁾¹⁷⁾	2
48	猪脂 ¹⁷⁾	1
49	臘月猪生膏 ⁹⁾	1
50	柏葉汁 ⁹⁾¹⁰⁾	2
51	白杏, 川椒葱頭煎湯 ¹⁴⁾	1
52	貓兒毛灰膏 ¹⁰⁾	1
53	皂莢湯 ²²⁾	1
54	白鵲糞 ²²⁾	1
55	天門冬膏 ¹⁹⁾	1

III. 総括 및 考察

油風證에 있어서禿頭病 即 百禿, 赤禿으로 나누어, 寒性과 熱性疾患을 表現하고 있는 바, 그治療方을 聖濟總錄이나 普濟方에서는 뚜렷이 区分하여 收錄하여 놓았고, 其外 髮髮禿落方을 다시 收錄해 놓기도 하였다. 그러나 脫毛症인 髮落의治療에 있어서 区分없이 같은 處方으로治療한

境遇가 있었고, 油風證의 自體를 毛髮脫落의 一過程으로 보아, 文獻拔萃에도相當한意義가 나타나 있었다. 또한 여러 文獻에서 조차, 毛髮部門이나 油風에 關한 記錄이 子細히 取扱되어 있지 않아 文獻拔萃에相當한 어려움이 있었다.

A群에서 處方數는 28個이며, B群의 處方은 55個로 A, B群을 合하여 83個方이나 湯, 丸, 膏 및 散의 本方에 類似한 處方으로 보면, 훨씬 더 많아 질 것으로 본다.

A群에 있어서 書籍出現回數로 보면, 神應養真丸과 防風通聖散이 7回로 가장 많고, 桂枝加龍骨蠟湯이 6回, 六味地黃丸이 5回, 八物湯과 黃芪建中湯이 4回, 二仙丸, 大柴胡湯이 3回, 四物湯, 柴胡加龍牡湯, 小柴胡湯, 防風丸이 2回其他가 1回로 되어 있다.

B群에 있어서는, 黑棗子汁이 5回, 三聖膏, 松瀝煎, 麻子油, 桃皮汁 馬蹄灰가 4回, 海艾湯王不留行湯, 桑百皮方이 3回, 生禿烏雲油, 金珠綠雲油, 胡麻油, 檉葉汁等 16個方이 2回, 其他가 1回로 나타나 있다.

그中에서도 捣黑棗汁, 桃皮汁은 內外兼治로 使用되어 있으며, 外用藥을 觀察해 보면 統一된 處方이 사용된 것이 아니고, 書籍마다 모두 다르게 사용되어졌다.

그러나, 內服藥에 있어서 神應養真丸과 防風通聖散이 文獻上 繁用되어 있으나, 防風通聖散(體質이 強한 者), 桂枝龍骨牡蠣湯(失精家, 小腹強急 陰頭寒), 大小柴胡湯(胸脇心下痞硬), 六味地黃丸(年少者虛證) 等의 處方과 證狀의 緣由하는 바를 찾아 使用되고 있음을 認知할 수 있겠다.

IV. 結語

1) 油風에 對한 治療方 가운데 內服藥 28個方中 神應養真丸과 防風通聖散이 7回로 가장

고 桂枝加龍骨牡蠣湯이 6회, 六味地黃丸이 5회, 八物湯과 黃芪建中湯이 4회, 二仙丸, 大柴湯이 3회, 四物湯, 腎氣丸, 柴胡加龍牡湯, 小胡湯, 防風丸이 2회로 나타나 있다.

2) 外用藥 55方中 掸黑棗汁이 5회 三聖膏, 灑煎, 麻子油, 桃皮汁, 馬蹄灰가 4회, 海艾, 王不留行湯, 桑百皮方이 3회, 生禿烏雲油, 珠綠雲油, 胡麻油, 楝葉汁 等 16個方이 2회 나타나 있으나, 그 외에는 書籍마다 모두 다
계 使用되어 있다.

3) 掸黑棗汁, 桃皮汁은 内服藥이면서 外用藥
.로도 使用되어 있다.

4) 神應養真丸과 防風通聖散이 가장 效果있
- 藥으로 나타나 있으며, 또한 症狀에 따라
- 使用이 緣由되어 있음을 認知할 수 있겠다.

参考文獻

1. 康命吉：濟衆新編，서울，杏林書院，1975，
p.156.
2. 顧世澄：傷醫大全，錦章圖書局，下卷，
p.703.
3. 龔廷賢：萬病回春，서울，杏林書院，1975，
下卷，pp.8 ~ 9.
4. 金定濟：診療要鑑，서울，東洋醫學研究院，
1974，p.302.
5. 大塚敬節：朴盛洙譯 編，漢方治療의 實際，
서울，杏林書院，1974，pp.143 ~ 144.
6. 大塚敬節 外：漢方診療醫典，서울，高文社，
1969，p.345.
7. 朴炳昆：漢方臨床四十年，서울，杏林書院，
1972，p.454.
8. 上海中醫學院：中醫外科臨床手冊，上海，
上海科學技術出版社，p.327.
9. 孫思邈：千金翼方（醫部全書） 第六冊，
p.4172, p.4173, p.4151, p.4155,
p.4166.
10. 孫思邈：備急 千金要方，台北，自由出版社，
pp.248 ~ 250.
11. 宋太宗命撰：太平聖惠方，p.1252.
12. 矢數道明：漢方治療百話，橫須賀市，
p.154.
13. 楊士瀛：直指方
14. 吳得洙：惠庵醫方，서울，醫藥社，1978，
pp.5 ~ 6.
15. 吳錫璜：聖濟總錄，第卷 一百一髮髮門，
p.16.
16. 王肯堂：六科準繩（雜病科），p.743.
17. 王 燕：外臺秘要，서울，成輔社，pp.854
~ 858.
18. 龍野一雄 編著・廉泰煥 譯：仲景方類聚，
서울，p.48, p.261.
19. 李 淵：醫學入門，台北，舊聯東方圖書公
司，五卷 禿部，p.107, p.127.
20. 張仲景：仲景全書，서울，醫道韓國社，
p.36.
21. 周命新：醫門寶鑑，서울，三協出版社，
1964，p.430.
22. 朱灝昆等編：普濟方，第二冊，p.109.
23. 中醫學院 試用教材：中醫外科學講義，香
港，醫藥衛生出版社，1966，P.231.
24. 陳實功：外科正宗，北京，1964，p.256.
25. 蔡炳允：漢方外科，서울，高文社，1975，
pp.285 ~ 286.
26. 湯本求眞・周子敘 譯：皇漢醫學，臺北，東
方書店，p.100.
27. 黃道淵：醫宗損益 上，서울，醫藥社，1976，
p.308.
28. 許 淩：東醫寶鑑，外形篇 四，上海校經山
房石印，pp.9 ~ 10.

