

小兒癲癇 治驗方

朴 實 商*

小兒科病治療에 있어서 難治病의 하나인 癲癇에 對하여 經驗한 바를 發表하여 治療에 多少나마 도움이 된다면 多幸이겠다는 生覺에서 어리석은 經驗을 記錄하오니 參考하시기 바랍니다.

癲 癇

驚風 三發이면 癲疾이라고 하였는데 小兒病中の 惡疾이다. 大人の 病을 癲이라고 하고 小兒의 病을 癲이라고 하는데 實은 同一한 病이다(入門).

病因: 概 心膽의 虛弱兒에게 많은 病이며 觸驚 風痰 食傷의 並發證이 많다.

證狀: 갑자기 倒하여 눈을 치뜨고, 침을 흘리며 神氣가 鬱悶하고 四肢攣搦하며 沈默하고 昏冒하여 죽은 것도 같고 산것도 같으며 呻吟或은 高喊을 지르다가 얼마 後에 깨어난다.(直小)

治法: 驚 風 食의 三種과 陰陽의 二證을 區別하여 治療한다.

1. 驚癲은 恐怖나 積驚하여 發하는 것인데 읊 부르짖고 精神이 恍惚하게 된다. 定魄丸沈香天麻湯을 쓴다.

2. 風癲은 風邪의 外襲으로 因하여 發하는 것인데 먼저 手指로 무엇을 헤아리는 것과 같이 屈曲하면서 發症한다. 追風祛痰丸(方見神門)

을 쓴다.

3. 食癲은 젓이나 밥을 먹을때 갑자기 觸驚함으로 因하여 積滯되어 或은 癰塊가 形成되며 或은 大便에 酸臭를 排泄한다. 紫霜丸을 쓴다.

4. 陽癲은 始發할때 身熱이 發하며 手足이 抽掣되고 읊 소리를 지르는 것이다. 龍腦安神丸 清心涼痰丸(二方並見神門)을 쓴다.

5. 陰癲은 始發할때 熱이 없으며 手足이 清冷하며 抽掣하지 않고 啼叫하지도 않는 것이며 難治에 屬한다. 五生丸, 孔神歸金丹(二方並見神門)을 쓴다.

6. 急驚으로 因하여 癲疾로 傳變된 데는 三癲丹을 쓰고 慢驚으로 因하여 癲疾이 된 데는 來復丹(方見寒門)을 薄荷泡湯에 一, 二丸을 化下하며 下利하면 곧 낫는다. (入門)

7. 또 胎中에 있을 때에 驚悸함으로 因하여 癲疾을 長久히 發하는데는 燒丹丸(方見神門)을 쓴다.

以上은 東醫寶鑑에 記錄된 處方으로써 잘 맞춰서 쓰면 特別한 效果가 있는 것도 事實이지만 舟村新方에 記錄되어 있는 小兒急慢驚神效方 散風丹을 通用하면 神效한 것을 經驗한 바 있으니 參考함도 可할줄 料된다.

散風丹: 牛膽南星一錢 羌活 獨活 防風 天麻人蔴 荆芥 川芎去油 細辛 甘草 各五分
右細末蜜丸梧子大每二丸紫蘇湯和下한다.

但, 蘇葉五分重式加入하여서 製丸함도 無妨하오며 三歲兒十五分式을 標準하여서 服用함이

* 대전 · 동일한의 원장

可하다.

近者 洋方治療를 받고 있는 患者가 많은 것
으로 料思되오며 散風丹을 長期服用시키면 效
果가 있으나 처음에는 洋藥과 散風丹을 같이
服用하여 가며 十五日에 一回式 洋藥을 減服하

여 가며 服用하는 것이 좋은 成果를 얻을 수
있다.

一時에 丸藥만 먹으면 처음에 鎮靜作用이 안
되는 것을 많이 보았다.