버마식 사회주의의 시작과 끝 〈下〉

〈續〉

한편 경제활동의 획일적이고 엄격한 중앙통제의 장기화는 이라와디강이 상징하던 세계 최대의 쌀 수출국 버마에경지면적의 감소라는 치명적인 결과를 초래했다.

2차대전 이전에 버마전국의 경지면적은 4백80만 ha에 달했으나 최근(1987~1988년)의 자료로는 20만 ha가 줄어든 4백60만 ha로 나타났다. 이 수치에 2차대전 당시의 1천5백만 인구가 현재 3천8백80만으로 증가된 것을 감안하면 이 나라의 어려운경제현황을 쉽게 이해할수 있다.

식량을 포함한 생활필수품의 절대부족은 암시장의 번성, 심각한 인플레이션과 함께 통화의팽창을 야기했다. 작년9월 버마정부는 물가앙등 억제책의 하나로 현재 통용되고 있는 「키아트(Kyat)화(貨)」의 고액권을 휴지화하여 통화의약 80%를 줄여버렸다. 그결과 1974년 민간인정부협태로 출범한 이후최대의 소요가 전국의 대도시를 휩쓸었으며 대학가는 6주일이나 휴교를 하지 않을 수 없었다.

국민들의 지지를 전혀 받지 못한 버마 사회주의계획당의 무분별한 경제정책과 획일적이고 무능한 경제운영은 모든분야의 국가경제를 피폐케 하여 생산의욕을 땅에떨어뜨렸으며 극에 달한생필품 부족현상은 자연히 국민의 불만을 고조시켰다. 버마정부의 강압정치는 국민들의 불만고조에 따라 폭압정치로 비화하여 인권을 유린하는 사례가 빈번하게 일어났고 이에 따라 드디어 대학생과 젊은 노동자들이앞장선 전국적인 민중봉기가 시작된 것이다.

반(反) 정부 시위에서 체제부정까지

네 윈은 지난7월23일 소집된 임시 전당대회에서 당 의장직 사임을발표하면서, 전국적인 소요사태의 해결책으로 현재의 일당체제와 다당체제를 놓고 국민투표를 실시할 것을 제의했다. 네 윈의 놀랍고도 급작스런 제의에 접한 버마 국민들은 온전세력에 의한폭넓은 개혁조처가 뒤따를 것을 희망적으로 기대했다. 그러나 7월26일의당대회는 세인 르윈(Sein Lwin)을 당 의장으로 선출하고 대통령직까지 겸임하도록 결정하면서, 네 윈이 제시한 국민투표안마저 거부했다.

르윈의 전면 등장은 대학생들의 전국적인 반정부 시위를 촉발시켰고, 불교승려와 민간인들도이에 가담하기 시작했다. 네 윈의 오랜 충복인르윈은 1962년 쿠데타 직후 시위를 벌이던 대학생들에게 발포명령을내려 많은 사상자를 내게 했으며, 우 탄트 국장요구 시위대 또한 무력으로 진압하여 랑군대학을 피로 물들게 한 장본인이었으므로 그의 등장을 국민들은 완강하게 거부했다. 사태가 걷잡을 수 없이 악화되자 르윈정부는 8월3일에 수도권일대에 계엄령을 선포하고 8월 9일에는 시위군중을 향해서 계엄군이 무차별사격을 가했다. 이에 성난 군중들은 무기를탈취하여 계엄군에 대항했으며 일부 군인들은 발포명령을 거부하고 시위군중에 합류하기도 했다.

버마 국민들은 거국적인 항쟁을 통해서 단순하게 르윈 퇴진만을 요구한것이 아니라 구조적인 체제변화를 부르짖고 나섰던 것이다.

결국 르윈은 18일 만에 사임하고, 9월 12일의 임시 당대회에서 선출된 민간인출신 마웅마웅(Maung Maung) 신임 대통령은 다당제에 대한 국민투표 실시와 반체제 인사들의 석방을 약속하는 등 유화정책을 제시했다. 그러나 대학생들이 내세운 사회주의계획당해체, 과도정부수립, 다당제도입, 정치범석방등 민주체제를 지향하는 수많은 요구는 일개 정부차원에서 해결할 수 있는 문제가 아니라 일통의 혁명에 해당되는 것이라 할 수있다. 때문에 마웅마웅의 유화 제스처에도 불구하고 시위와 소요가진정되지 않자, 9월 18일 네 윈의 사주(使嗾)임이 명백한 쿠데타가 국방장관인 사우 마웅(Saw Maung) 장군에 의해서 또다시 자행되었다. 이로써 지난 8월과 9월동안 버마 전국을 휩쓴 민주화 열기는 새로운 국면으로 접어들게 되었다.

버마는 어디로 갈 것인가?

버마는 지금 방황하고 있다. 모든 국민들은 한결같이 군사정부를 반대하고 민주체제 수립을 갈구하고 있으나, 지난 26년간의 철저한 독재체제 아래서 야당과 정치엘리트가 전혀 육성되지 않았기 때문에 상당기간의 정치공백이 불가피하게되었다. 고령의 전 수상우누와 반체제지도자 아웅지, 그리고 버마 독립의 영웅인 아웅 산 장군의 딸인 수키 여사 등 몇몇 우국(憂國) 인사들이 수많은 민중편에 서서 민주체제 소생을 위해서진력하고 있으나 오랜 병고에 시달려 온 버마를 다시 일으켜세우기에 이들의 힘은 너무도 빈약할 뿐이다.

버마는 어디로 갈 것인가?*

황금의 나라에서 세계 최빈국으로

○… 천혜의 자원으로 「황금의나라」라 불렸던 버…○
○…마, 그리하여 동남아 유수의 부국으로 발전하…○
○…리라는 것을 아무도 의심치 않았던 버마.그러…○
○…나 「버마식 사회주의」를 주창하며 철저한 쇄…○
○…국정책을 펴온 결과 버마는 일인당 국민소득…○
○…1백 90 달러의 가장 가난한 나라로 전락하고…○
○…말았다. 〈양승윤/한국외국어대교수〉 …○

교양시리즈

連載 栽培教室

'89 新規會員을 爲하여

담(膽)=龍

○學 名: Gentiana-Scabra Bunge var buergeri Maxi
○生藥名: 龍膽(草龍膽) Gentianae Scabrae Rabix
○成 分: 苦味 配糖體인 gentiopicrin 8~9%, alkaloid를 함유.
○効 用: 苦味 健胃藥으로 消化 不良, 食慾不振에 쓰임.

1、性 狀

龍膽科에 속하는 多年生 草本이다. 우리나라의 山野의 나무 밑에 널리 자생하고 있다. 草長은 30~60 cm 정도이며 잎은 對生 卵狀 披針形으로 3출의 平行脈이 현저하다. 가을에 포기 끝에 또는 上部의 葉腋에 淸楚한 파란 종모양의 꽃이 피고 果實은 紡錘形의 蒴果이며 種子는 微細하다.

근래에는 觀賞價를 높이 인정하여 花卉로 취급하는 경향이 있다.

2、栽培法

1、栽培適地

우리나라 各地에 自然分布되어 있어 각지에서 재배할 수 있으며 土質은 適濕한 粘質壤土, 埴質壤土가 적합하지만 山野의 開墾地, 混礫質土에서도 잘 재배된다.

2、繁 殖

번식은 實生法과 分法으로 할 수 있다.

㉠實生法: 育苗 移植할 수 있는데 9월 하순~10월 중순경에 채종한것을 苗床을 만들어 바로 뿌리도록 한다.

이 종자는 過乾하거나 오래두면 發芽力을 상실하게 된다.

播種床은 120~150 cm의 두둑을 짓고 12~15 cm 간격으로 잔골을쳐서 條播한 다음 細砂를 덮고 그 위에 짚으로 被覆한다.

苗床은 될 수 있으면 半陰地를 선정하는 것이 좋을 것이다. 苗床을 만들 때 잘 썩은 堆肥와 草木灰을 약간 基肥로사용해도 좋다.

㉡分株法: 實生法으로육성한 母株나 山野에서자생한 母株에서 分株할수 있는데 이때는 건실한눈이 2~3개 붙도록 해서 根部와 함께 나누어 심는 방법이다. 分株는늦은 가을과 봄에 할 수 있다.

3、定植 및 管理

本圃에 定植하고자 할 때는 늦은 가을 또는이른 봄에 起耕하여 整地한 다음 基肥로서 堆肥 1200 kg, 過石 200 kg, 草木灰 30 kg을 넣고 이랑사이 30 cm로 골을타고 포기사이 15 cm 간격으로 한개씩 심는다.

活着하여 발육하게 되면 1~2회 追肥를 주고 中耕 除草를 한다. 여름에 한발(旱魃)이심하면 生草를 깔아주어도 좋다. 물론 秋播도 할 수 있다. 보통 25~30일 정도로서 발아하게 되는데 밴곳은 솎아주고 최종에 포기사이를 12~15 cm 간격으로 둔다.

㉠育苗移植法: 育苗 移植할 때는 本 10 a에대하여 苗床을 0.6~0.9 a이 소요된다.

이 때의 파종량은 약 1 ℓ이다. 育苗床은 햇볕이 잘 쪼이는 땅에 1 20~150 cm 넓이의 두둑을 만들어 3.3 ㎡당 完熟堆肥 2.6 kg, 複合肥料 0.2 kg을 파종하기 2주일 전에 시용하고 床土와 잘 혼합해둔다.

播種은 5~8 cm 간격으로 條播하거나 撒播한다. 播種후 微細한 흙으로 엷게 覆土할 것이며 때로는 灌水를 하기도한다. 6월 상·중순경이되면 10~15 cm 정도 苗가 자라게 되므로 이때에이식하든지 또는 10월 중·하순경에 本圃에 定植하게 된다.

㉡定 植: 本圃에 정식하는 시기는 10월 중·하순경이다. 추운지방에서는 翌年 이른봄에 定植하는 것이 좋을 것이다. 基肥로서는 堆肥 8000~10000 kg, 過石 40 kg, 草木灰 60 kg을 사용하고 잘 整地한 다음투력사이 35~40 cm 간격으로 심는다.

이때 모가 마르지 않도록 주의한다.

3、肥培管理

追肥로서 8~9월경에 잘 썩은 人糞尿와 黃安 등의 速効性 肥料를 作況을 보아 1~2회 사용한다.

8~9월경이 되면 꽃대가 생기므로 摘蕾 摘芯하여 뿌리의 발육이잘 되도록 할 것이다.

4、病蟲害 防除

보통 2년째 초가을부터 늦가을까지 根腐病의 발생이 심하다.


龍膽

호(胡)=柴

1、生藥名: 柴胡 Bupleuri Radix
2、効用: 解熱, 마라리아, 黑水病, 強肝의 작용이 있다.

1、性 狀

시호는 미나리科에 속하는 多年生 草로서 우리나라 山野에 自生하며 많이 재배되고 있다. 줄기는 細長하며 分枝가 많고 草長은 60~90 cm 정도이다.

잎은 아래가 좁고 위가 넓은 線形 또는 廣線形이고 平行脈을 이루고 葉端은 뾰족하다. 7~8월에 複繖形 花序의 노랑색 꽃이 핀다.

2、栽培適地

우리나라 全地域에 자생하기 때문에 어느지역에서나 재배할 수 있다. 기후상으로 따뜻한 中南部 地方이 더 좋으며 通風이 잘되며 南向의 排水가 잘되는 埴質壤土또는 砂質壤土가 적당하다. 산간 벽지에 재배하여도 좋고 連作을 하게되면 근부병이 발생하므로 輪作을 하여야 한다.

2、繁 殖

주로 種子로서 번식한다.

採種은 2年生 株에서 한다.

播種은 直播法과 育苗移植法이 있다.

㉠直播法: 直播코자 할 때는 두럭사이 35~40 cm의 간격으로 얕은 골을 치고 씨를 뿌린후 覆土는 엷게 덮고 被覆物로서 짚이나 보릿대를 깔아줄 것이다. 이때의 파종량은 1.8 ℓ 정도이다 柴胡의 發芽 適溫은 18도씨 내외이므로 3월하순경에 파종하는 것이좋다. 물론 秋播도 할 수 있다. 보통 25~30일 정도로서 발아하게 되는데 밴곳은 솎아주고 최종에 포기사이를 12~15 cm 간격으로 둔다.

㉠育苗移植法: 育苗 移植할 때는 本 10 a에대하여 苗床을 0.6~0.9 a이 소요된다.

이 때의 파종량은 약 1 ℓ이다. 育苗床은 햇볕이 잘 쪼이는 땅에 1 20~150 cm 넓이의 두둑을 만들어 3.3 ㎡당 完熟堆肥 2.6 kg, 複合肥料 0.2 kg을 파종하기 2주일 전에 시용하고 床土와 잘 혼합해둔다.

播種은 5~8 cm 간격으로 條播하거나 撒播한다. 播種후 微細한 흙으로 엷게 覆土할 것이며 때로는 灌水를 하기도한다. 6월 상·중순경이되면 10~15 cm 정도 苗가 자라게 되므로 이때에이식하든지 또는 10월 중·하순경에 本圃에 定植한다.

㉡定 植: 本圃에 정식하는 시기는 10월 중·하순경이다. 추운지방에서는 翌年 이른봄에 定植하는 것이 좋을 것이다. 基肥로서는 堆肥 8000~10000 kg, 過石 40 kg, 草木灰 60 kg을 사용하고 잘 整地한 다음투력사이 35 cm, 포기사이 12~15 cm 간격으로 심는다.

이때 모가 마르지 않도록 주의한다.

3、肥培管理

追肥로서 8~9월경에 잘 썩은 人糞尿와 黃安 등의 速効性 肥料를 作況을 보아 1~2회 사용한다.

8~9월경이 되면 꽃대가 생기므로 摘蕾 摘芯하여 뿌리의 발육이잘 되도록 할 것이다.

4、病蟲害 防除

보통 2년째 초가을부터 늦가을까지 根腐病의 발생이 심하다. 여름에서 가을에 걸쳐서 줄기끝에 흰빛 또는 담홍색의 빈약한 꽃이 핀다. 뿌리는 길쭉한 생강모양으로 울퉁불퉁거치른 모양으로 잔뿌리가 많이 달린 덩어리를 이룬다.

㉠채종: 성숙한 송이에서 채종을 한다.

㉡파종: 씨앗을 채종즉시 파종한다.

㉢定植: 本圃에 정식하는 시기는 10월 중·하순경이다. 추운지방에서는 翌年 이른봄에 定植하는 것이 좋을 것이다. 基肥로서는 堆肥 8000~10000 kg, 過石 40 kg, 草木灰 60 kg을 사용하고 잘 整地한 다음투력사이 35 cm, 포기사이 12~15 cm 간격으로 심는다.

이때 모가 마르지 않도록 주의한다.

3、肥培管理

追肥로서 8~9월경에 잘 썩은 人糞尿와 黃安 등의 速効性 肥料를 作況을 보아 1~2회 사용한다.

8~9월경이 되면 꽃대가 생기므로 摘蕾 摘芯하여 뿌리의 발육이잘 되도록 할 것이다.

4、病蟲害 防除

보통 2년째 초가을부터 늦가을까지 根腐病의 발생이 심하다.

柴胡

自然生採取(연재)

출(朮)=蒼

1、과명: 국화과
2、속명: 삼쭈뿌리
3、약용부: 근경

①기본: 전국에 분포하여 잡목 등 사이에 자생하는 다년생 풀로서뿌리에 특수한 향기가 있다.

②생장적지: 낮은산이나 평지의 잡나무 숲속등이 적지이다.

③특징: 줄기는 가늘고 곧고 높이가 1 m 내외이고 아래 부분의 잎은 3~5매로 뻗어졌거나또는 3~5조각의 날개모양의 겹엽을 이룬 두가지 잎이 있다. 잎은 모다 타원형이다.

④채종: 성숙한 송이에서 채종을 한다.

⑤파종: 씨앗을 채종즉시 파종한다.

⑥채취: 가을부터 캐낸다.

⑦조제: 캐낸 뿌리를물로 씻고 잔 뿌리를 떨어버리고 햇볕에 말린다 겉껍질을 벗기지 않고말린것을 창출이라하며 겉껍질을 벗겨서 말리기도 한다.

⑧이용: ㉠창출은 방향성 건위제, 해열제, 발한제로 쓰인다. 신장기능저하로 인한 이뇨제 ㉡백출은 지한제로 쓰인다. 해외수출품.

뿌리를 파보면 얕은 赤褐色의 病班이 생기어심하면 黑褐色으로 변하여 죽게 된다. 방제법으로는 排水가 좋은 땅에 재배할 것이며 질소질 肥料를 많이 쓰지말고 播種전에 크로루피크린으로 土壤消毒을 하고 種子 消毒도 할것이다. 蟲害로서는 土壤線蟲과 花蕾가 생겨서 開花할 때까지 진딧물이 발생하는데 殺蟲劑를 살포해서 구제하여야 할것이다.

5、收穫·調製

보통 定植한 그해 늦은 가을에 캘 수 있으나 品質이 좋은 것을얻기 위해서는 2년 이상된 것을 수확한다. 캔것은 물에 씻어서 햇볕에 말린다. 乾燥가 된 것은 毛根을 없애고 잘 간추려서 시원하고 건조한곳에 저장할 것이다.

收量은 10 a당 2年根의 경우 乾根으로 1백~1백20 kg 정도이다.