

교양시리즈

기
부
인체의 피부는 완벽한 장벽으로 작용하지는 않으며 피부에 접촉시켜야 한다.
○ 피부 접촉을 경계하여 한다.
○ 가동할 피부 오염을 피해야 한다.
○ 피부를 깨끗이 오염시는 노출을 위해 일으킬 수 있다.
나. 마심
결로는 보다 심각
한 있다. 이는 중독을 야기시킬
농약이나 예기치 않게 일어날 수 있다.
부착되거나 마시는 사수는 농약을
옮겨 마시지 않도록 한다.
우리가 병원에 병원에 치료를 받을 때는
주주의를 주의를 기울여야 한다.


는	사실을	야	여방을
한다.	항상	기억해	치우고
도록	농약은	신체와	보니
하게	국부장애를	일로	자기
들어	신체내로	나온다.	것이다.
가는	증동장애를	증동	여기서
수	앓을 수 있다.	증동	증동을
있다.	농약은	증동	증동을
○교부	다음	증동	증동을
증독을	신체내로	증동	증동을
○마심	들어갈수	증동	증동을
(입을	들어갈수	증동	증동을
실패)	통해서마	증동	증동을
증독을	증동	증동	증동을
위의	예방하기	증동	증동을
서는	세가지	증동	증동을
피해야	경로	증동	증동을
한다.	경로	증동	증동을
감조하고	다시한	증동	증동을
만	증동	증동	증동을
예방된다.	증동	증동	증동을

알아둡시다. 농약 중독 시 응급조치요령

- … 농약은 농업용으로 사용되기 이전에…○
- …안전성과 약효등 일련의 시험을 거친, …○
- …생물학적으로 활성이 있는 화학물질이…○
- …다. 만약 잘못 사용하게 되면 인체에는…○
- …물론 가축이나 환경에도 위해(危害)를…○
- …끼칠 수가 있다. …○

다.	○ 농약을 본래의 용기로 여 보관함으로써 마시게 될 가능성을 없애 애도록 한다.
한국어	○ 농약을 본래 용기로 포장지 설령서 가부 착도지 않은 비명 등으 로 옮겨 보관해서는 안 된다.
영어	○ 농약 취급기는 용적 물을 머거나 음료수통을 마시지 말고 흡연을 삼 가 해야 한다.
한국어	○ 음식물이 농약으로 오 염되거나 주의하나. 농약으로 오염되는 경우 에는 농약을 살포해야 한다.
한국어	2. 보호장비 ○ 복무기를 깨끗이 유 지 보관한다. 작업장에 다음 물품들이 준비는 과대 노출 및 중독 에 대처하는데 유용하다. 가. 물


지
획을
3. 중독증상의 관찰
 및 파악
 농약중독은 통상 급성
 적이며 대체로 과대 피부접촉 및 과대섭취시
 생된다. 만약 어떤 사람에게 농약에 중독되었고 대처를 때는 즉시 발견될 때는 즉시 통증 사고 현장에서의 응급조치를 치법의 응급조치를 주제로 한다. 의사의 치료를 한다.
 농약의 여러 가지 제형 및 흡수경로의 차이로 노약증은 갖가지 형태로 나타날 수 있다. 기타 다른 병과로 인한 사고로도 노약증을 일으킬 수 있다.



〈그림 1〉 두둑짓기 및 파종

〈 1 〉

비료명	총량	밀도	施肥률	
			1회 (6월상순)	2회 (8~9월상순)
비	비	1,500	1,000	500
목	목	125	50	75
복합비료	37	37	-	-
용과탄 또는 용성인비	35	15	12	6
단종(계분)	150	-	-	150



-〈고리 2〉 시호제초제 선발 ('81 ~ '82 총불)

立
胡)

栽培教室

〈3면〉으로 계속

○동물용
포기구
등을
접견하고
장지의
사육설명서를
상회지
않게
잘 보관
다.
○땅이나
의복위에
걸리거나
노출하지
○살포기구의
고장이
잘못사용
~
계속

〈그림 3〉 시호의
적신방법

(6) 수확
가수확 및 조제
수풀질이 좋은것
을 연기 위하여는 2
3년생을 놋가을 10월까지
순 11월상순에 수확한다.
(7) 조제 : 캐것은 물에 깨끗
꽃이 씻어 작은 달걀羹에서
묶어 전조사안에서 풍건전에 바로
(風乾)하거나 바로 풍건전에 넣어
기를 자르고 뿌리를 씻어서 말린다. 갈대밭에 넣어
다 저장 : 전조한 것을 짜는
각종 려서 시원하고 물통에 넣어
이 잘되는 곳에 저장장을 한다.
당 10kg 정도이다.