

傘下支部動靜

<기간 : 89. 10. 1 ~ 90. 3. 31>

첫째주 (土)	둘째주 (土)	셋째주 (土)	네째주 (土)
宋景太 會長	임연학부회장	박재문부회장 또는 이용환 이사	배영두사무국장 또는 이종철 이사

中央共販場 특별勤務制 실시

協會는 秋冬 盛需期를 맞이하러 出荷會員들과 需要者들의 不滿意素나 전의사 場 實去來상대를 물과 運轉方面에 반영코져 하는 施策의 일환으로 會長團의 中央共販場 週末 특별勤務制를 실시하기로 하였다.

※會長團의 근무 日程表는 다음과 같으니 諸君活用 있으시기 바랍니다.

最近 協會운영상 애로점 이 많아 會費정리 현황을 분석해본 결과 5백여萬원 의 미달액이 누적되어 있 음을 확인하고 이달末까지 完납정리를 目標로 6개월 分이상 채납자에게 完納促 求 통지문을 발송한 바 있 습니다.

따라서 본통지문을 전수 한 分所長께서는 夏季不況 으로 어려움이 있으시더 라도 變通 協助하여 주시 기 바랍니다. 모든일이 다 습니다.

會費채납자 완납促求

最近 協會운영상 애로점 이 많아 會費정리 현황을 분석해본 결과 5백여萬원 의 미달액이 누적되어 있 음을 확인하고 이달末까지 完납정리를 目標로 6개월 分이상 채납자에게 完納促 求 통지문을 발송한 바 있 습니다.

따라서 본통지문을 전수 한 分所長께서는 夏季不況 으로 어려움이 있으시더 라도 變通 協助하여 주시 기 바랍니다. 모든일이 다 습니다.

生藥재배 기술교육 출강협조

協會는 지난 8월28일장 원도 공무관 연구원과 9 월7일 충남 단진군 농촌 지도소에서 실시한 生藥재 배교육 과정에 출강요청을 받고 사무국장이 찬성하여 4시간 동안 生藥生産現況 에 대하여는 본회 사무국 및 流通事項을 강의한 바 있



◇최동진소장 교육광경(9월7일)

漢方의약 對外情報

最近 日本 醫藥情報紙에 의 하면 福島市 商工會議所는 中國 吉林省에 있는 漢方 의약研究所의 製藥 藥劑 草藥의 效用 飼育 및 그 効果와 用法 應用치료 등에 관한 技術도움을 받 아 福島市를 漢方의약 育 기제형 藥劑製造地로 育成키로 하겠다고 한다.

이 계획은 1~2年内로 事業化될것이라고 하며 漢方 의약의 製品을 全國 的으로 弘報전파하여 漢 方이라면 漢方의藥里福島一

<2면에서 계속>

○환자의 상태
다. 별세
대부분의 농약은 많은 양이 오염되었을때 쉽게 말주위를 정도로 특이한 냄새가 있으므로 냄새를 잘 파악해야 한다.

○피부, 머릿털 등
다량의 농약을 사용하면 피부, 머릿털 등 피부에 자극을 주며, 특히 눈에 농약이 들어갔을 때는 눈을 씻고 최소한 10분이상 완전히 씻어낸다. 가급적이면 중독환자의 전신을 씻되 10~15분 이상 완전히 씻어 줘야 한다. 특수세척약을 찾지 못하고 만일 물을 이용할 수 없으면 옷이 나 화장지 등 종이로 두드리거나 가법제 뒤아낸다. 피부를 지칠게 문지르지 말아야 한다.

○응급조치법
중독환자는 극히 중요 되기 쉽기 때문에 환자를 안정시켜야 한다. 특히 유기인제 및 카바메이트계 농약일 경우 동요하면 더욱 악화되므로 환자의 안정에 각별히 주의해야 한다.

4. 호흡
호흡과 의식상태를 면밀히 관찰해야 한다. 중독환자는 무의식상태가 되거나 구토하는 경우도 있으며 호흡이 갑자기 멎을 수도 있다. 환자를 적당한 자세로 유지시키면 이와같은 위험에 대처하는데 도움이 된다.

1. 자세
환자의 머리를 낮게, 한쪽으로 향하도록 한다. 환자가 부의식 상태이면 턱을 앞으로, 머리를 뒤쪽으로 향하게 하여 호흡할 수 있도록 한다.

2. 체온
무의식환자일 경우에는 체온을 조절하는데 특별한 주의하여야 한다. 환자가 열이 심하면 찬물로서 헹궈야 한다. 환자의 체온이 내려가면 담요나 시트 등으로 덮어주어 정상체온을 유지하도록 한다.

3. 농약의 삼켰을때
농약이 고농도이어서 치명적인 것 같거나 의사의 치료를 받을 수 없는 경우 위엔 투하해하는 것이 바람직하지는 않다. 섭취한 농약을 토하게 하는 것이 좋지만 토하는 고독성 농약인지를 알 수 없으면 토하면 안된다. 토하는 것은 의식이 있는 환자에게만 가능하며 환자에게만 가능한 투하해 해안한다.

○환자를 앉히거나 일으켜 세운다.
○환자의 인후 후방부를 손가락으로 간질러서 하게 한다. 이때 다른 한 손의 두 손가락으로 환자의 뺨과 이 사이를 눌러서 혀를 눌러서 구토를 유도한다.

5. 경련
환자가 경련을 일으킬 때는 손이나 팔꿈치(palmar area material)를 이 사이에 끼워주어 자해행위 하도록 유도한다. 이 경우 갑작적으로 해서는 안된다.

6. 주의
환자로 하여금 담배를 피우거나 술을 마시지 않도록 한다. 어떤 농약의 한해는 장으로부터 흡수를 빠르게 하기 때문 에 우유를 마시게 해서 도 안된다. 기타 음료를 마실수도 있다.

생약재 한말에 한쪽보내기 응급

나 화장지 등 종이로 두드리거나 가법제 뒤아낸다. 피부를 지칠게 문지르지 말아야 한다.

○응급조치법
중독환자는 극히 중요 되기 쉽기 때문에 환자를 안정시켜야 한다. 특히 유기인제 및 카바메이트계 농약일 경우 동요하면 더욱 악화되므로 환자의 안정에 각별히 주의해야 한다.

4. 호흡
호흡과 의식상태를 면밀히 관찰해야 한다. 중독환자는 무의식상태가 되거나 구토하는 경우도 있으며 호흡이 갑자기 멎을 수도 있다. 환자를 적당한 자세로 유지시키면 이와같은 위험에 대처하는데 도움이 된다.

1. 자세
환자의 머리를 낮게, 한쪽으로 향하도록 한다. 환자가 부의식 상태이면 턱을 앞으로, 머리를 뒤쪽으로 향하게 하여 호흡할 수 있도록 한다.

2. 체온
무의식환자일 경우에는 체온을 조절하는데 특별한 주의하여야 한다. 환자가 열이 심하면 찬물로서 헹궈야 한다. 환자의 체온이 내려가면 담요나 시트 등으로 덮어주어 정상체온을 유지하도록 한다.


3. 농약의 삼켰을때
농약이 고농도이어서 치명적인 것 같거나 의사의 치료를 받을 수 없는 경우 위엔 투하해하는 것이 바람직하지는 않다. 섭취한 농약을 토하게 하는 것이 좋지만 토하는 고독성 농약인지를 알 수 없으면 토하면 안된다. 토하는 것은 의식이 있는 환자에게만 가능하며 환자에게만 가능한 투하해 해안한다.

○환자를 앉히거나 일으켜 세운다.
○환자의 인후 후방부를 손가락으로 간질러서 하게 한다. 이때 다른 한 손의 두 손가락으로 환자의 뺨과 이 사이를 눌러서 혀를 눌러서 구토를 유도한다.

5. 경련
환자가 경련을 일으킬 때는 손이나 팔꿈치(palmar area material)를 이 사이에 끼워주어 자해행위 하도록 유도한다. 이 경우 갑작적으로 해서는 안된다.

6. 주의
환자로 하여금 담배를 피우거나 술을 마시지 않도록 한다. 어떤 농약의 한해는 장으로부터 흡수를 빠르게 하기 때문 에 우유를 마시게 해서 도 안된다. 기타 음료를 마실수도 있다.

祝 中央共販場 신장 開業 發展



견 본



포장진열



공관장 사무실