

치석제거술이 치주질환의 임상지표 및 치은연하 치태 분포에 미치는 영향

김종관 · 채중규 · 조규성 · 문익상
연세대학교 치과대학 치주과학교실

치석제거술을 시행한 후 시간경과에 따른 치주낭내 세균의 구성성분과 치주질환의 임상지수의 변화를 관찰하고 어느정도 기간까지 이러한 변화가 유지되는가를 알기 위하여 15명의 환자에게 3mm이상의 치주낭을 가진 치아를 각각 2-4개씩 선택하여 인접부위중 치주낭이 깊은 부위를 실험부위로 설정하고 치석제거술을 실시하였다.

치석제거술 시행후 1,2,3,4,5,6,10,14,18주에 치주낭 내 세균의 분포와 치주낭깊이, 출혈지수를 관찰, 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 초진시와 비교하여 실험 전 기간을 통하여 운동성 세균의 비율은 감소하며 비운동성 세균의 비율은 증가하는 소견을 보였다.
2. 실험 전기간을 통하여 치주낭 깊이 및 부착상실정도를 감소하였으나 유의성있는 차이는 보이지 않았다.
3. 치태지수는 치석제거술 2주 후부터 10주까지 유의성있는($P < 0.01$)감소를 보였으나 그후 증가하는 경향을 보였다.
4. 출혈지수는 실험 전 기간 동안 감소하였다.
5. 치은 열구액 양은 치석제거술 후 1,2,3,4,5,6,10주($P < 0.01$)까지 유의성 있게 감소하였다.
6. 치은지수는 실험 전 기간동안 유의성있게($P < 0.01$)감소하였다.

● 테트라사이클린 함유 Slow release system이 진행된 치주질환에 미치는 효과에 대한 임상 및 암시야현미경적 연구

김진홍 · 조규성 · 채중규 · 김종관
연세대학교 치과대학 치주과학교실

치주낭깊이 4mm이상(평균 6.17mm)의 중등도이상의 치주염을 가진 13명의 환자를 대상으로 하여 치주낭이 비교적 깊은 2~4부위를 무작위로 선택하여 tetracycline함유 Instat[®]를 삽입한 실험군과 이를 사용하지 않는 대조군으로 나누었다. 실험군, 대조군에 supragingival scaling을 시행하고 그후 실험군에만 tetracycline함유 Instat[®]를 삽입한 후 치주낭깊이, 치태지수, 치은지수, 치은열구삼출액의 양, 치은출혈지수, 그리고 치은연하치태세균의 분포를 초진, tetracycline처리후 1,2,3,4,5,6주에 각각 측정하고 치료전후를 비교하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 치주낭깊이는 대조군에 있어서 시간이 지나가면서 유의성이 없었던 반면 실험군의 경우 매주 유의성있게 감소하였다.(1주 $P < 0.05$, 2주 이후 ($P < 0.01$))
2. 치은지수는 실험군, 대조군 공히 유의성있게 감소하였다. 치태지수는 대조군에 있어서 없었던 반면 실험군은 1주에 유의성있는 감소를 보였으며($P < 0.01$) 2주 이후 $P < 0.05$ 에서 유의성있는 감소가 지속되다가 5주 이후 진료전으로 회귀되는 경향을 보였다.
3. 치은출혈지수는 대조군에서 전 실험기간에 걸쳐 유의성있는 변화가 없었으나 실험군의 경우 1, 2주에 유의성있게 감소하였고($P < 0.05$) 3주 회귀되는 경향을 보였다.

the SBI-1, 3 groups($P < 0.01$).

2. Correlation coefficients between S.B.I. and periotron unit, S.B.I. and arylsulfatase, periotron unit and arylsulfatase were 0.40, 0.47, 0.47, respectively($P < 0.01$).
3. As the pocket depth increased, periotron unit and arylsulfatase also increased, but statistically not significant($P > 0.05$).

The effects of scaling on the clinical parameters and subgingival microflora of human periodontal disease

Chong Kwan Kim, Jung Kui Chai, Kyoo Sung Cho, Ick Sang Moon

Dept. of Periodontology, College of Dentistry, Yonsei University

The purpose of this study was to observe the changes of the composition of bacteria in periodontal pocket and clinical index periodontal disease in the process of time after scaling, and to evaluate the lasting period of these changes.

For this, 2~4(teeth)-sites of pockets $> 3\text{mm}$ were selected in each 15 patients who came to the department of periodontics of Y university. Scalings were performed on the adjacent sites which had deep periodontal pocket.

After scaling the distribution of bacteria in periodontal pocket depth, loss of attachment, gingival index, plaque index and bleeding index the amount of crevicular fluid were observed and analyzed over a period of 18 weeks.

The results were as follows :

1. The proportion of motile bacteria decreased and the proportion of nonmotile bacteria increased through all 18 weeks.
2. The pocket depth and loss of attachment decreased through all 18 weeks but not significantly.
3. The plaque index increased significantly($P < 0.01$) from 2 weeks to 10 weeks after scaling but thereafter it increased.
4. The bleeding index decreased all 18 weeks.
5. The amount of crevicular fluid decreased significantly during 14 weeks-1~10 weeks($P < 0.01$), 10~14 weeks($P < 0.05$)-after scaling.
6. The gingival index decreased significantly($P < 0.01$) through all 18 weeks.

The clinical and darkfield microscopic study of the effect of tetracycline, locally administered via slow release system on advanced periodontitis

Jin Hong Kim, Jung Kui Chai, Kyoo Sung Cho, Chong Kwan Kim

Dept. of Periodontology, College of Dentistry, Yonsei University

This study was performed to assess the effect of tetracycline, locally administered via Instat®