

14) 보건소에서의 약품에 있어서는 필요하지 않다는 자가 23명중 치료실에만 머물러 있으면 보건소 본연의 업무에 지장이 있게 된다는 자가 43.5%로 가장 많았으나, 필요로 하는 자가 128명중 보건소 및 계몽상 필요하다는 자가 56.3%로서 수위였다.

15) 보건소간호사의 초임급에 있어서는 정규직간호사가 13,750원, 모자보건요원이 19,800원, 가족계획과 결핵요원이 각각 12,300원과 11,140원이고, 간호보조원이 9,400원으로 봉급액에 있어서는 간호보조원과 가족계획 및 결핵요원과는 별차이가 없었으며, 특히 직책상 위험에 폭로되고 있는 결핵요원에게는 이에 대한 보건대책이 없었다.

16) 간호사의 정원 및 현원에 있어서는 청주도립병원의 간호사 정원수는 12명으로 4급잡이 1명, 4급을이 1명, 5급잡이 2명, 5급을이 8명이었으며, 현원은 4급잡이 1명, 5급을이 11명으로 모두 충원되었고, 충주도립병원 간호사 정원은 9명으로 4급을이 1명, 5급잡이 1명, 5급을이 7명이고, 현원은 5급잡이 1명, 5급을이 8명으로 9명이 모두 충원되었다.

보건소간호사의 정원은 청주시보건소에 5급잡이 1명, 5급을이 1명, 충주시보건소에 5급을이 1명이 있었고, 각군보건소에 5급을이 1명씩 있었으며, 임시직에 있어서는 청주시 및 청원군에서 각각 7명 9명으로 모두 충원되었으나, 충주시, 보은군, 옥천군, 영동군, 진천군, 괴산군, 음성군 및 증원군에서는 필요한 수에 비하여 상당한 인원이 부족상태에 있었고, 단양군 및 제천군에서는 임시직이 하나도 충원되지 못한 현상을 나타낸다.

일부 중도시 부인의 산전관리 실태조사

경기간호학교 논문집, Vol. 2, pp. 3~30, 1971.

김 계 숙

1969년 1월 1일부터 1970년 7월말까지 인천시에 있는 도립인천병원에서 산전 간호를 받은 부인 566명을 대상으로 하여 산전 관리에 관한 諸 양상을 조사검사한 바 다음 결론을 얻었다.

1) 부인의 연령별 분포는 25~29세 군이 242명(42.8%)으로 가장 많았고 다음은 30~34세 군이 132명(23.3%)이다.

2) 교육정도는 고졸이 212명(37.5%)으로 수위이고 다음은 중졸이 170명(30.4%)이다.

3) 가사이외의 직업에 종사하는 부인은 566명 중 88명(15.5%)이었다.

4) 남편의 직업은 회사원이 286명(50.6%)으로 수위이고 다음은 상업이 163명(28.

8%)이고 무직이 10명(1.8%)이다.

5) 부인의 초혼연령은 25~29세군이 298명(52.7%)으로 반수 이상이고 다음은 20~24세군이 191명(33.7%)이고 부인의 평균결혼연령은 24, 45세이다. 남편의 초혼연령은 25~29세군이 288명(50.9%)으로 수위이고 다음 30~34세군이 167명(29.5%)이며 남편의 평균결혼연령은 28.53세이다.

6) 초경연령은 16세가 150명(26.5%)으로 수위이고 다음은 17세가 121명(21.4%)이며 평균초경연령은 16.13세이다.

7) 결혼기간 및 임신횟수를 보면 결혼기간에서 1~4년이 307명(57.7%)으로 수위이며 다음은 5~9년의 157명(27.8%)이다. 임신횟수는 2회의 266명(47.0%)으로 수위이고 다음은 1회가 106명(18.7%)이다. 전체의 평균임신횟수는 2.46회이다.

8) 초산연령 및 출산횟수를 보면 초산연령은 25~29세군이 320명(56.5%)으로 수위이고 다음은 20~24세군의 209명(36.9%)이다. 평균초산연령은 24.77세이다. 출산횟수는 1회가 246명(43.5%)으로 수위이고 다음은 2회가 163명(28.9%)이며 평균출산횟수는 1.92회이다.

9) 연령별 인공유산에 있어서는 인공유산경험자 중 30~34세군이 23명(35%)으로 수위이고 다음은 25~29세군이 18명(28%)이다. 인공유산경험율은 11.5%이며 평균인공유산횟수는 1.62회이다.

10) 자연유산에 있어서는 35~39세군이 22명(33.3%)으로 수위이고 다음은 30~34세군이 18명(27.2%)이며 평균자연유산횟수는 1.80회이다.

11) 분만장소는 병원분만이 450명(79.6%)으로 수위이고 다음은 조산사분만이 61명(10.8%) 가정분만이 45명(17.9%)의 순이다.

가족계획 실시자에 대한 모자보건실태조사

대한간호 Vol. 10, No 36, p.110~126, 1971

김명숙

1970년 10월 25일부터 11월 25일까지 청주시 보건소 가족계획실에 등록된 경구피임약 복용자 144명을 대상으로 모자보건 관리상황을 조사검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 임신하였을 때 진찰여부

최종아 임신중에 1회의 진찰이라도 받은 응답율은 31.9%의 저율이며 임신초기의 진찰과 정기적 진찰에 있어서는 각각 7.6%의 저율을 보였다. 진찰을 받지 않은 응답자의 연령별분포는 41~45세군 100%로 수위이며 26~30세군 14.5%로 하위였고 이