

다.

- 2) 학력별로는 고졸군이 32. % 로 수위였으며 무학문맹자는 없었다.
- 3) 종교는 무종교군이 50.9 % 로 가장 많았으며 그 밖에 신교와 불교였다.
- 4) 현존 자녀수는 2명의 자녀를 가진 모성이 33 % 로 수위였고 평균 자녀수는 2.8명이었다.
- 5) 산전진참여부는 전혀받지 않은 모성이 42.1 % 로 가장 높았으며 정기적인 산전수진은 불과 14.5 % 에 낮은 율을 보이고 있다. 임신분만에 대한 지식원은 친지를 통한 경우가 56.3 % 로 가장 높았으며 모르는 경우가 22.8 % 로 이지역의 보건교육의 필요성을 알 수 있었다.
- 6) 분만장소는 가정분만이 82.6 % 로 수위였다.
- 7) 초유처리하는 아기에게 먹이는 모성이 65.4 % 로 수위였고 짜버리는 경우가 33.3 % 를 보였다.
- 8) 이유식의 시작시기에 관하여 반수이상의 모성이 7~8개월 이전으로 답하여 올바른 지식을 갖고 있음을 보여줬다.
- 9) 영아의 이상적인 식이는 모유단독이 77.6 % 로 수위였다.
- 10) 예방접종 실천율은 소아마비(83.5 %) 풍두(82 %)는 높은 율을 보여주었으며 홍역(29.9 %) 장티푸스(14.9 %)는 낮은 율을 보여 주었다.
- 11) 예방접종 장소는 거의 대다수가 보건소(46.5 %) 병원(50.0 %)였다.

일부 농촌지역의 모성보건실태에 관한 연구

최신의학 제18권 제4호, pp. 535~544, 1975.

이 영 자

1974년 7월 28일부터 8월 29일까지 강원도 횡성군 청일면, 갑치면에 거주하면서 예정분만을 한 657명의 가임, 유배우, 유자녀 부인을 대상으로 10명의 훈련된 검사원이 직접 가정방문을 실시하였다. 조사원이 면담 작성한 내용을 염부 및 임신손·, 가정분만환경, 산전산후 관리상태에 관하여 연구한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

A. 조사대상자의 특성

1. 연령 : 대상부인의 연령구조는 35~49세군이 70.3 % 로 대부분을 점유하였으며 평균연령은 38.6세이었다.
2. 교육정도 : 국민학교 이하의 학력군이 89.5 % 로 매우 낮은 교육수준이었다.

3. 직업 : 대상부인의 거의 모두인 97.7 % 가 농업, 가사에 종사하며 남자의 직업을 보면 역시 대부분이 (76.6 %) 직업이었다.

4. 가족의 구성 : 핵가족이 63.9 % 확대가족이 36.1 % 이었다.

B. 임신, 임신손모 및 현재 자녀수

1. 결혼상태 : 평균결혼연령은 19.3세로 16~21세에 결혼한 부인이 73.4 % 이었고 초경연령은 16~18세가 64.0 % (평균 17.1 % 세)이었다.

2. 임신경험율 : 부인의 평균임신히수는 4.99회이며 4~6회 임신경험군이 54.7 % 로 과반수를 넘고 있으며 연령이 높아질수록, 교육수준이 낮아질수록 임신횟수는 증가하였다.

3. 임신손모 : 임신 1,000당 임신손모는 80이고 정상출생은 920이었다. 구체적으로 살펴보면 인공유산이 42, 자연유산이 27, 사산이 6이었다.

4. 현존자녀수 : 평균 자녀수는 4.2명으로 이중 남아는 2.2명, 여아는 2.0명이었다. 남아수가 여아수보다 많은 경우는 46.6 %, 같은 경우는 18.7 %, 여아가 남아수보다 많은 경우는 34.7 % 이다.

5. 임신중 부작용 : 임신중 부작용 경험율은 72.7 % 이며 nausea 경험율이 가장 높았고 Headache 와 Edema 의 경험율도 30 % 를 넘고 있었다.

C. 가정분만 환경

1. 분만장소 : 거의 모두가 시집에서 분만하였고(86.0 %) 분만실을 따로 준비한 부인은 극소수이며(7.5 %) 대부분이 경제적 이유로(71.9 %) 가정분만을 하였다.

2. 분만개조인 : 의료인의 분만개조는 극소수에 불과하며(3.5 %) 단독분만이 32.5 % 이었고 비의료인의 분만개조는 64.0 % 이었다.

3. 제대절단 용구와 소독상태 : 제대절단 용구로는 가위가 59.5 % 로 가장 많고 출산아의 성별에 따라 가위나 낫을 선택하는 부인이 25.9 % 이었으며, 5.9 % 만이 제대절단 용구를 끓이거나 태워서 사용하였다.

D. 산전, 산후 관리상태

1. 산전관리 : 거의 모든 부인이(95.1 %) 산전관리를 한번도 받지 않고 있었다.

2. 산모의 분만후 식이 : 분만후 즉시 먹는 음식은 미역국이 74.4 % 로 가장 많았고 18.3 % 의 부인은 꿀을 택하고 있었다.

3. 산모의 분만후 휴식기간 : 일주일 이내에 평상의 일로 되돌아 가는 부인이 83.1 % 이며 평균 휴양일은 5.98일 이었다.