

일부지역 영아의 기질성 경향에 대한 조사

전북의대 간호전문대학 논문집 제7집, 1980.

김 영 애

본 조사는 일부지역 영아의 기질성 경향을 알아보고 양육 방법에 따른 기질상의 차이를 알아보기 위해 실시하였다.

대상은 전주지역에 거주하는 3개월에서 8개월까지의 영아 90명이며, 영아의 행동 형태를 묘사하는 95개 문항으로 된 Carey의 영아 기질검사 도구를 번안 보안한 심의 검사 도구를 이용하여 어머니에게 작성케 한후 별도 채점표를 이용하여 9개의 기질 영역에 대한 점수를 내어 평가하였다.

본 조사의 결과를 분석하여 얻은 결론은 다음과 같다.

① 영아의 영역별 평균치가 규칙성, 접근도, 적응도, 기분의 질에서 Carey의 것보다 낮게 나타나며, 심의 결과와는 거의 비슷하게 나타났다.

② 영아의 연령, 성별, 형제 서열과 기질과의 관계를 분석하여 본 결과 연령에 따라 활동 수준에서만 차이가 있었으며($p < 0.01$), 성별로 볼 때, 접근도와 기분의 질과 민감도에 유의한 차이가 나타났고($p < 0.01$), 형제서열별로 볼 때 규칙성과 주의전환도 민감도에서 유한 차이가 있어($p < 0.01$), 연령, 성별, 형제서열이 기질에 영향을 미침을 알 수 있다.

③ 수유 방법에 따른 영아의 기질은 인공 영양이나 혼합영양이 모유 영아에 비해 규칙성이 높게 나타났으며($p < 0.01$), 규칙적인 수유를 했을 때 규칙성에 기분의 질에 유의한 차이가 나타나($p < 0.01$) 수유 방법이 기질에 별 영향을 미치지 않음을 알 수 있다.

④ 욕구충족 여부에 따라 반응의 강도, 지속력, 민감도에서 차이가 있었으며($p < 0.01$), 질병 유무에 차이가 있어($p < 0.01$) 양육 방법이나 영아의 질병 유무가 기질에 영향을 미침을 알 수 있다.

일부도시 의료보호사업이용에 대한 실태조사

순천간전 논문집, Vol. 6, pp. 197~235, 1980.

서 인 선