

%가 건강상담을 받고 있으며 건강상담 장소로는 73%가 개인병원으로 대체로 개인병원 이용율이 높다.

2. 어린이의 건강상태는 최대 평점이 3.74이며 최대평점에 대한 비율은 74.74%이다. 어머니들은 애기를 위하여 좋은 습관을 위한 일상생활 지도에서 소홀한 감이 없지 않다.

3. 예방접종에 대한 지식 및 태도에 대한 최대 평점은 3.5이며 최저 평점에 대한 비율은 76.6%이다.

대상자의 86.8%가 정기적으로 주사를 마친다고 하였으며 78.6%가 정기적 예방접종 계획에 대하여 잘 알고 있다고 하였다.

4. 예방접종 실천에 대한 최대 평점은 3.23이며 최대 평점에 대한 비율은 63.6%이다. 대상자의 73.0%가 주사를 마치기 전에 의사나 보건요원에게 상의하며 주사를 마친 후 무슨 예방주사인지 확인하는 경우는 34%에 불과하다.

부작용에 대한 태도에서 최대 평점은 3.17%이며 최대 평점에 대한 비율은 53.3%이다. 대상자의 62%가 부작용은 사람에 따라 필연적으로 일어나며 부작용의 원인은 69.6%가 주사약의 변질, 67.6%가 불완전한 소독과 부정확한 주사 방법이며, 64.8%가 애기의 영양상태를 원인으로 들었으며, 77.8%가 부작용은 있을 수 있으나 예방 주사는 꼭 필요하다고 하였다.

일부 농촌 간호계획을 위한 모자건강 실태 조사

순천간전논문집, Vol. 7, pp. 247~273, 1981.

소 향 속

본 조사는 지역사회 보건간호실습을 위해서 모자보건에 관한 기초자료를 얻고자 시행된 것이다. 전남 순천시 인안동 대대 신석부락에 거주하는 230가구의 가구주 부인을 대상으로 1981년 5월 1일~6월 20일까지 조사한 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 가구주 부인의 평균연령은 41.8세이며 국졸이하의 학력이 85.7%를 차지하고 평균 결혼연령은 20.2세로 조혼의 경향이었고 35세 이후에 단산한 부인이 40.5%로서 고령임부로 인한 모자건강의 위험성을 크게 안고 있는 것으로 나타났다.

2. 평균 임신횟수 5.7회와 평균 출산횟수 4.5회와 평균 현존자녀수 4.2명이 차이를 보여줌으로서 산전후관리, 영유아보건관리의 요구가 큰 것으로 나타났다.

3. 임신소모는 출생아 1,000명당 205명이며 인공유산에 의한 임신소모율의 점유율은 72.7로서 올바른 가족계획 지식보급으로 모자보건의 손실을 막을때 임신소모율도 감소될 것으로 나타났다.

4. 23.5%에 해당하는 가구주부인이 어린이를 잃은 경험이 있었고 사인은 예방 가

능한 질병이어서 예방접종을 포함한 보건교육이 절실히 요구되는 것으로 나타났다.

5. 30~40대 부인에서 인공유산 경험율이 높은 경향이었고 인공 유산에 관한 지식 습득은 친구나 이웃이 65.5%, 인공유산의 이유는 원치않는 임신이 68.8%, 모성건강에 위험을 준다는 43.5%, 시술후 죄의식을 느낀다. 14.9%로서 인공유산에 대한 올바른 지식을 습득함으로써 모자보건의 손실을 감소시킬 수 있을 것으로 나타났다.

6. 가정분만을 97.4%, 산전관리 수진율 17.4%, 제대절단은 부소독된 가위사용이 76.1%로서 산전관리 및 분만시 소독관념의 교육적 요구가 큰 것으로 나타났다.

7. 12개월 이상 수유한 예가 68.7%, 12개월 이내에 이유한 예가 48.7%로 적기이유가 잘 이뤄지지 않았고 올바른 영유아영양법 및 이유실시에 관한 교육적 요구가 큰 것으로 나타났다.

8. 산후 조리기간이 불과 1주일 이내로 끝나는 예가 57.4% 이고 산후 합병증을 호소한 예가 46.1% 산후조리를 충분히 하지 못하는 것으로 나타났다.

9. 가족계획 실천예가 20.4%로 매우 저조하며, IUD가 46.8%, Tubal Ligation이 21.3%, Oral pills 17% 순으로 사용되며 과거 피임법 사용자의 중단이유의 52.4%가 부작용때문으로 나타나서 부작용없고 간편한 피임법 개발과 정확한 실시방법을 지도하는 것이 피임실천율을 높일 수 있을 것으로 나타났다.

일부지역 보건소 보건간호원의 업무 활동 분석

중앙의학 제40권 제6호, pp. 437~444, 1981.

여 옥 남

1980. 12. 26~12. 31 사이에 경상북도 2개시, 2개군 보건소, 진료실, 결핵실, 모자보건실, 가족계획실에서 근무하는 간호원 9명을 선정하여 그들의 6일간(44시간 2,640분) 업무활동을 활동영역별 기술수준별로 조사분석해 본 결과 다음과 같았다.

1. 활동영역별 : 시지역 간호원은 “환자간호”에 가장 많은 시간을, “방문”에 가장 많은 시간을, “관리”에 가장 적은 시간을 소비하였다.

2. 기술수준별 : 환자간호와 교육 및 행정을 포함하는 전문간호활동이 전체의 66.1%를 차지하였고 비전문 간호활동은 17.0%이었다.

3. 사업분야별 : 간호원의 활동영역을 보면 진료실 간호원은 개인환자간호활동에, 모자보건 및 가족계획요원을 방문활동에, 그리고 결핵관리간호원을 결핵환자투약 및 상담에 각각 가장 많은 시간을 소비하였다.

4. 기술수준별로 보면 특수전문간호활동에 가족계획지도원, 모자보건요원, 진료실