

간호보조원, 조산원의 지식과 기술수준으로는 경미한 질병의 치료라는 기능을 부여할 수 가 없음을 알 수 있다.

이상의 결론으로 현재 면단위 보건간호요원 즉 조산원, 간호원, 간호보조원에게 직접 분만 개조를 중심으로 한 보수교육이 요망되며 또한 이들 요원들의 기본간호교육과정의 연구가 뒤따라야 할 것으로 본다.

일부 통합보건요원의 기본보건지식조사

순천간전논문집, Vol. 8, pp. 218~234, 1982.

문 순 복

결론 및 제언

통합보건 사업내용에 관한 요원들의 지식정도를 파악하기 위하여 1982년 5월 통합 보건요원 교육에 차출된 전남·북 232명의 간호보조원을 대상으로 통합보건요원으로서의 기본지식을 내용으로 하는 설문지를 사용하여 조사한 결과는 다음과 같다.

1. 대상자의 평균 연령은 28.6세, 전체 근무기간은 평균 6.3년 이었고 각 영역별로는 모자보건 1.21년 가족계획 2.51년, 결핵 1.67년이었으며 전남·북간의 차이는 거의 없었으나 전체 요원들이 결핵업무나 모자보건업무보다 가족계획업무에 치중되어 배치된 것으로 나타났다.

2. 전체 보건지식 평균은 74.6점이었으며 영역별로는 모자보건 75. 점, 가족계획 79.3점, 결핵 77.8점, 기타 72.6점으로 지식정도 역시 가족계획이 수위로 나타났다.

3. 각 영역의 근무기간별 지식은 가족계획에서만 근무기간이 길수록 지식정도가 높은 경향을 보였으며, 모자보건과 결핵에서는 근무기간과는 무관하게 나타났다.

일부지역 보건소 이용실태에 관한 조사연구

— 결핵실과 가족계획실을 중심으로 —

월간간호, Vol. 1, No. 6, pp. 70~77, 1982.

이 경 옥