

간호보조원, 조산원의 지식과 기술수준으로는 경미한 질병의 치료라는 기능을 부여할 수 가 없음을 알 수 있다.

이상의 결론으로 현재 면단위 보건간호요원 즉 조산원, 간호원, 간호보조원에게 직접 분만 개조를 중심으로 한 보수교육이 요망되며 또한 이들 요원들의 기본간호교육과정의 연구가 뒤따라야 할 것으로 본다.

일부 통합보건요원의 기본보건지식조사

순천간전논문집, Vol. 8, pp. 218~234, 1982.

문 순 복

결론 및 제언

통합보건 사업내용에 관한 요원들의 지식정도를 파악하기 위하여 1982년 5월 통합 보건요원 교육에 차출된 전남·북 232명의 간호보조원을 대상으로 통합보건요원으로서의 기본지식을 내용으로 하는 설문지를 사용하여 조사한 결과는 다음과 같다.

1. 대상자의 평균 연령은 28.6세, 전체 근무기간은 평균 6.3년 이었고 각 영역별로는 모자보건 1.21년 가족계획 2.51년, 결핵 1.67년이었으며 전남·북간의 차이는 거의 없었으나 전체 요원들이 결핵업무나 모자보건업무보다 가족계획업무에 치중되어 배치된 것으로 나타났다.

2. 전체 보건지식 평균은 74.6점이었으며 영역별로는 모자보건 75. 점, 가족계획 79.3점, 결핵 77.8점, 기타 72.6점으로 지식정도 역시 가족계획이 수위로 나타났다.

3. 각 영역의 근무기간별 지식은 가족계획에서만 근무기간이 길수록 지식정도가 높은 경향을 보였으며, 모자보건과 결핵에서는 근무기간과는 무관하게 나타났다.

일부지역 보건소 이용실태에 관한 조사연구

— 결핵실과 가족계획실을 중심으로 —

월간간호, Vol. 1, No. 6, pp. 70~77, 1982.

이 경 옥

보건의료사업의 일부인 보건소를 중심으로 특히 결핵관리와 가족계획이 심각한 문제로 대두되고 있으며 보건소 이용에 대한 올바른 인식과 적극적 이용을 위해 본연구는 일부지역에 위치한 결핵관리실과 가족계획실의 이용실태를 1979년 1월1일부터 1981년12월31일까지 3년간에 걸쳐 기존 자료를 통하여 분석하여 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 결핵예방접종 상황에서는 B. C. G. 접종이 46.12%로 다른 예방접종에 비해 높게 나타나고 있다.

2) 연도별 결핵검사 상황에서는 객담검진은 매년 점차적으로 감소현상을 보이나 결핵균 발견은 증가현상을 보이고 있다.

에스선 검진은 매년 증가현상을 나타내고 있으나 결핵발견은 감소현상을 보이고 있다.

3) 연도별 약물투여 상황은 초치료 약물 투여에서는 전체적으로 I + E가 32.33%로 수위였고 그 다음은 INH가 28.37%로 차위였다.

재치료 약물투여는 전체적으로 E + P + R이 45.62%로 가장 높게 나타났다.

4) 결핵등록 환자 동태 증가 상황에서는 전체적으로 보면 엑스선이(84.04%) 수위로 증가현상을 보였으며 감소현상은 완치(29.44%) 중단(13.26%) 사망(2.51%) 순위로 감소현상을 보인다.

5) 가족계획 방법은 전체적으로 보면 먹는 약이(46.4%) 수위였으며 콘돔(36.25%), 루우프(8.10%) 수위며 정관불임술은 0.88%로 가장 하위로 나타났다.

지역사회 보건개발사업을 위한 지역사회 건강진단의 일 연구

전북의대부속 간호전문대학 논문집 제7권 pp. 103~109, 1982

정영숙

본 연구는 전북 전주시 변방지역인 전미동 전당리 지역사회를 대상으로 1981년 1월 12일에서 6월30일까지의 조사기간 동안 기존 자료와 면담 실시 등의 자료수집 방법에 의하여 수집된 자료를 분석하였다. 일 지역사회의 건강진단에 필요되는 지역사회 건강수준과 환경 보건에 관련되는 지표 지역사회 건강자원, 지역사회 건강과 관련되는 제반 요인을 분석하므로써 지역사회 보건사업 계획에 기초 자료를 제공하고 지역사회 건강 진단을 조사 연구한 것이다.

본 연구에서 조사된 결과를 근거로하여 다음과 같은 결론을 얻었다.