

4. 자녀수와 인공유산율은 자녀수가 증가 할수록 인공유산경험율도 증가하여 3명의 자녀를 가진 경우가 가장 높았고 4명이상이 되면 점차 감소하였다(  $p < 0.01$ ).
5. 결혼기간별 인공유산율은 결혼기간 3년이내가 가장 낮았고 3년이후부터 계속 증가하여 4~7년에서 가장 높았으며 8년이상이 되면서 약간 감소하였다(  $p < 0.01$ ).
6. 피임상태와 인공유산율은 인공유산유경험자의 피임실천율이 무경험자보다 더 높았다(  $p < 0.01$ ).
7. 임신시의 건강문제와 인공유산과의 관계에서 인공유산유경험군이 무경험군보다 부종, 고혈압등의 임신중 건강문제가 더 많았다(  $p < 0.05$ ).
8. 인공유산유경험군이 무경험군보다 분만시문제가 2배이상 높았다(  $p < 0.01$ ).
9. 인공유산유경험군의 부인과계통의 이상증상이 무경험군에 비해 월등히 많았다(  $p < 0.01$ ).

## 폐결핵 환자의 결핵관리에 대한 지식 및 실천에 관한 조사 연구

### — 보건교육 요구파악을 위한 기초조사 —

전남의대잡지, Vol. 23, No. 3, pp. 409~418, 1986.

박 인 혜 · 최 순 희 · 오 상 은

#### 결론 및 제언

1985년 3월 1일부터 6월 30일까지 K 시의 1개보건소와 C 병원 결핵실에서 221명의 결핵환자를 대상으로하여 결핵관리에 대한 지식정도과 실천정도 및 보건교육 요구를 파악하기 위한 면접 조사를 실시하여 다음의 결과를 얻었다.

#### 1. 대상자의 일반적 특성

연령은 20대가 가장 많았고, 여성보다는 남성이, 미혼보다는 기혼이 많았고, 학력으로는 고등학교학력군이, 직업으로는 농·임·수산업에 종사하는군이 다른군에 비해 많았다.

#### 2. 결핵질환과 관련된 특성

결핵이라는 진단을 받은장소는 53.0%가 보건소라 하였고, 유병기간은 4년미만군이 63.8%였으며, 치료를 중단한경험이 있었다는군이 33.9%였는데 이들의 중단이 유증 수위를 차지한것은 완치된 것으로 잘못판단한 것으로 46.3%였다.

교육을 받은 경험이 있는군은 26.2%밖에 안된것에 비해 교육받기를 원하는 군은 61.5%가 되어 교육의 필요성을 새삼 주지 하였으며, 이들이 원하는 교육내용으로는

질병의 치료, 관리, 약물예후, 예방, 원인, 전염성과 격리, 식이, 증상과 증후의 순서로 나타났다.

### 3. 일반적 특성과 지식정도 및 실천정도와의 관계

일반적 특성에서 연령은 50대가, 남성군이, 미혼군이 그리고 고등학교학력군이 다른군에 비해 지식정도나 실천정도가 모두 높게 나왔으나 통계적으로는 유의하지 않았다.

### 4. 질환과 관련된 특성과 지식정도 및 실천 정도와의 관계

질환과 관련된 특성에서 유병기간이 5~9년된군이 다른군에 비해 높은점수를 얻었으나 지식정도는 유의한 차이를 찾아볼 수 없었고 실천정도에서는 통계적으로 유의한 차이를 보였다( $F = 5.805, p < 0.01$ ).

치료중단의 경험이 있는군과 교육경험이 있는군이 각각 다른군보다 지식정도나 실천정도가 높았으나 통계적으로 유의한 차이는 아니었다.

### 5. 결핵에 대한 지식정도와 실천정도간의 상관 관계

결핵에 대한 지식정도와 실천정도의 관계를 살펴본바 지식정도가 높을수록 실천정도도 유의하게 높아짐을 볼 수 있어( $r = .3653, p < 0.001$ )상관이 있다고 할 수 있다.

이상의 결과에서 그동안 다소 경시되어진 결핵문제의 고취와 추정환자중 미 발견된 59%의 대상자를 위하여 학교에서의 보건교육과 대민교육이 강화되어야 한다고 보며, 대상자의 요구에 따른 계획된 교육이 실시되기 위해서는 타 지역에서도 대상자의 요구확인을 위한 연구가 확대 실시 되기를 제언한다.

## 보건소간호사들의 역할인식정도와 직무만족정도에 관한 조사 연구 — 계장직 간호사와 일반간호사간의 비교 —

전남대학교 논문집 제31집(의·치의·약학편)별책. 전남대학교, pp. 35~49, 1986.

박인혜 · 소향숙

보건소간호사들의 역할인식정도와 직무만족정도 그리고 이 두 변수간의 상관관계를 파악하고 계장직간호사와 일반간호사간의 역할인식정도와 직무만족정도를 비교하고저 1985년 3월 23일부터 4월 6일에 걸쳐 계장직간호사 33명과 일반간호사 32명을 대상으로 자료를 수집분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

### 1. 대상자의 일반적 특성

응답자의 평균연령은 40.5세였으며 과반수 이상이 간호고등기술학교출신이고 72.3