

8. 희망종사기간과 근무동기와는 유의한 차이(  $p < 0.01$ )를 보여 주었는데 평생종사를 희망하는 군에서 기타 종사기간의 군보다 긍정적 근무동기가 더 많았고(각 59.2%, 25.9%), 긍정적 근무동기를 가진 군에서 비긍정적 근무동기를 갖고 있는 군에 비해 평생종사를 희망하는 비율이 더 높았다(각 39.2%, 13.4%).

## 전남지역 보건소 간호사의 보건간호업무수행에 관한 조사

기독병원간호전문대학 논문집 제6집, pp. 1~14, 1988.

### 이 갑 순

#### 결 론

보건소 인력 중에서 가장 많은 비율을 차지하는 보건간호사가 그 업무를 어떻게 행하느냐에 따라 보건사업의 성패가 좌우된다고 하겠다.

본 연구는 보건소 간호사의 보건간호 업무수행정도와 이에 영향하는 요인을 알아보고자 시도되었으며, 보건간호사업 내용을 11개 영역 86개 항목으로 작성한 설문지를 통해 전남지역 보건소 간호사를 대상으로 1986년 11월 21일에 집단으로 자료수집한 151명에 대해 분석한 결과는 다음과 같다.

1. 일반적 특성에서 연령은 20~29세가 49.7%로 가장 많았고 평균연령은 30.0세였다. 간호전문대 졸업자가 63.6%, 기혼자가 60.9%, 군보건소 근무자가 72.8%였다. 근무실에서는 모자보건센터 30.5%, 진료실 20.5%, 가족계획실 17.9%의 순이었고 보건소 경력이 5년 미만인 자가 70.2%였다. 57%에서 간호사 이외의 면허나 자격을 갖고 있었고 54.3%에서 CPHN이나 기타 교육을 이수한 것으로 나타났다.

2. 영역별 업무수행정도에서는 사업계획영역(2.475), 산전관리(2.313), 산후관리(2.258), 영유아관리(2.189)의 순으로 높게 나타났고, 기타보건사업(1.436), 결핵관리(1.572), 질병관리(1.884)의 순으로 낮게 수행하는 것으로 나타났다.

전체 영역에 대한 평균 수행정도는 2.036으로 낮게 나타났다.

3. 일반적 특성에 따라 보건사업 수행정도를 조사하여 3개 이상의 영역에서 수행정도에 유의한 차이가 있는 것은 근무실과 면허 및 자격소지로 나타났다.

① 근무실에 따른 보건간호사업 수행정도를 보면, 가족계획실에서는 가족계획(4.333)과 사업계획(3.239)을 중점적으로 수행하는 것으로 나타났으며 결핵관리실에서는 결핵관리(3.723)를, 진료실에서는 질병관리(3.086)를, 모성·영유아실에서는 산전관리(3.619), 분만관리(3.554), 산후관리(3.304), 영유아관리(3.157), 사업계획

83.200)을, 모자보건센터에서는 산전관리(3.557), 분만관리(3.266), 산후관리(3.818), 영유아관리(3.270)를 중점적으로 수행하는 것으로 나타났고, 실습교육을 제외한 나머지 10개 영역에서 근무실별로 수행정도에 차이가 있었다. ( p <0.01)

② 면허 및 자격소지에 따라 보건간호 업무수행정도를 보았을 때 조산사 면허를 가진 간호사의 수행정도가 갖지 않은 간호사에 비해 산전관리, 분만관리, 산후관리, 영유아관리에서 높게 나타났으며( p <0.01), 전체 업무수행정도에서도 높게 나타났다. ( p <0.01)

이상에서 보건소 간호사의 업무수행정도에 영향을 미치는 요인은 특수보건사업 형태와 조산사 면허로 나타났다.

따라서 보건소 수준의 보건사업이 전반적인 보건사업으로 체질을 개선하여 간호인력을 효율적으로 활용할 것을 제언하며, 특수훈련을 통한 보건간호사의 자격제도를 실시하고, 기본간호 교육과정에서 내실있는 지역사회간호 실습을 강화할 것과, 보건간호 실무에 영향하는 요인의 규명을 위해 확대된 연구를 할 것을 제언한다.

## 방문 간호를 통한 암 환자의 위기증제 효과에 관한 연구

간호학회지 제19권 제1호, pp. 63~77, 1989.

김 조 자

### 결론 및 제언

본 연구는 암 진단을 받은 후 시기경과에 따라 암환자가 경험하는 위기반응과 간호문제를 조사하고 주기적인 가정방문을 통해 암환자의 질적인 삶을 증진하는 방안을 모색하고자 시도된 것으로 연구설계와 연구대상, 연구도구를 달리 하면서 3차에 걸쳐 연구를 진행하였다.

1차 연구는 암환자의 위기반응 단계와 간호문제 양상을 조사하고 이에 영향을 미치는 요인을 파악하고자 205명의 암환자를 대상으로 횡단적인 조사연구 설계를 이용하여 자료를 수집했으며 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 제시된 5개의 위기반응 단계중 1개만 선택한 대상자는 56.5% 였으며 나머지 43.5%는 2-5개의 단계를 선택하고 있어 많은 암환자들이 자신이 처한 위기상황을 단계적으로 경험하고 대처해 나가지 못하고 여러 단계를 복합적으로 지각하고 있음을 알 수 있다.

2. 위기반응 단계에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위해 1개만 선택한 환자 105명