

8. 보건진료원에 대한 면보건요원들의 의견에 있어서는 보건진료원과의 상호협조에 대한 의견에서 86.2%가 협조적으로 운영할 수 있다고 하였으며, 면주민건강관리에 보건진료원이 도움이 될 것이다에 92.4%가 답하였으며, 면보건요원의 사업수행에 보건진료원이 도움이 될 것이다에 90.7%가 답하였다.

보건진료원의 역할인식과 역할수행 빈도간의 상관연구

중앙의학 제43권 제4호, pp. 229~237, 1982.

김 선 희

1. 보건진료원에 대한 대우에 관한 만족도는 일반간호원에 대한 선행연구의 결과와 비교해 볼 때 '불만족 한다'는 경향으로 나타났다.
2. 모자보건: 1차진료, 지역사회 보건지도 및 예방업무에서의 역할인식정도는 인식 평점 척도의 분포가 3.71~4.53으로 나타났으며, 모자보건, 1차진료, 지도 및 예방 업무 순으로 역할인식정도가 높게 나타났다.
3. 역할수행빈도는 수행평점 척도의 분포가 1.35~3.57로 모자보건, 1차진료, 지도 및 예방 업무 순으로 수행빈도가 높게 나타났으나 각 업무별 인식정도에 비해 수행빈도가 낮게 나타났고 특히 지도 및 예방업무에서는 전반적으로 수행빈도가 낮게 나타나 보건진료원의 활동이 일부분야에 치중되고 있음을 나타내고 있었다.
4. 보건진료원의 역할 인식정도와 일반적 특성과의 관계에서 보건진료원이 되기전 간호활동 경력, 보건자원 이용 두 변수만이 유의한 차가 있었다. 간호활동 경력이 많을수록, 보건자원 이용도가 높을수록 역할인식정도가 높게 나타났다.
5. 보건진료원의 대우에 대한 만족도가 높을 수록, 보건자원을 이용할수록 역할 수행빈도가 높게 나타났다.
6. 역할인식정도가 높을 수록 역할수행빈도가 높게 나타났다.

보건진료원 및 보건진료요원과 보건요원의 업무활동분석 — 홍천 및 횡성지역 보건요원 대상으로 —

대한간호 제6권 제2호, pp. 43~63, 1982.

김 진 순